

$O_2^+$

Johnson R. C.

1924

Were.

Proc. Roy. Soc. A  
1924, 105, 683

39

O<sup>+</sup>  
2, M. N.



$O_2^+$

12

Frerichs R.

Z. Phys., 1926, 35, 683

О структуре отрицат. иона кислорода

Разреженная трубка  $I = 0,5 - 1,5 \text{ A}$   $V = 500 - 500 \text{ v}$

2<sup>й</sup> поряд. 6,4 м  $\Delta = 2,6 \text{ A/mm}$  спектрогр. с решеткой. Дисп. 15 мм. Р.с. - 60000

0,0  $\nu_0 = 16592,2$

Проведен французск.  
анализ. пост. не

1,0 15577,0

2,0 14584,0

0,1 17754,7

0,2 18881,5

Holland Z. wiss. Phot., 23, 342, 1925

✓  
 $O_2^+$

Ellsworth V. M., Hopfield J. J.

1927

Phys. Rev, 1927, 29, 79

Полное излучение в УФ

Высоковольтный разряд  $p = 0,02-0,03$  мм.рт.

Одномерный спектрограф с решеткой 1<sup>й</sup> пор. и  
вакуумный спектрограф с решеткой 0,5 м

| $n' \backslash n''$ | Канты  |        |       |       |       |       |       |       |       |        | *набл. впервые |  |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------|--|
|                     | 0      | 1      | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9      |                |  |
| 0                   |        |        |       |       | ОН    | 29427 | 27757 | 26104 | 29490 | 22912* |                |  |
| 1                   |        |        |       |       | ОН    | ОН    | 28611 | 26976 |       |        |                |  |
| 2                   |        |        |       | ОН    | 32853 | ОН    | 29466 | 27821 |       |        |                |  |
| 3                   |        |        | 37188 | ОН    | 33670 | ОН    | ОН    |       |       |        |                |  |
| 4                   |        | 39785  | 37978 | 36202 | ОН    |       |       |       |       |        |                |  |
| 5                   |        | 40551  | 38739 | 36953 |       |       |       |       |       |        |                |  |
| 6                   | 43126  | 41281  | 39474 | 37701 |       |       |       |       |       |        |                |  |
| 7                   | 43837* | 41991  | 40181 |       |       |       |       |       |       |        |                |  |
| 8                   | 44506* | 42668  | 40589 |       |       |       |       |       |       |        |                |  |
| 9                   | 45174* | 43326* |       |       |       |       |       |       |       |        |                |  |
| 10                  | 45789  | 43950* |       |       |       |       |       |       |       |        |                |  |

ф-ла Бурдеса:

$$v = \frac{38303}{38108} + (887n' - 13,4n'') - (1859,9n''' - 16,53n''')$$

Эта ф-ла верна, если  
данные в УФ не более процентов

1931

$O_2^+$

Stevens D.S.

Phys. Rev., 1931, 37, 1711

Французский анализ 1<sup>й</sup> отрицат.  
результат по числу ионизации ( $O_2$ )<sup>+</sup> кр. воды.

Разр. в полном катод.

2<sup>й</sup> порог. 21917. спектральная сдвиги

Провед. франз. анализ 16,0-6,17,0-7 2 $\pi$ -2 $\pi$

Миним. свт. отношения к свт. Тундас, как и

Верхн. 2 $\pi$  отношение свт. к. Миним. 2 $\pi$  свт.

Результат с дубл. расщепл = 195 см<sup>-1</sup>

$$B' = 1,043 - 0,027 \nu'$$

$$B'' = 1,583 - 0,009 \nu''$$

$$z'_e = 1,41$$

$$z''_e = 1,15$$

31.75

11931

Stevens D.S.

Phys. Rev., 1931, 38, 1292Временительный анализ первой отри-  
цательной группы окислительных ( $O_2^+$ ) полве

Получено в полве окислительных (Freichs)  $\gamma = 1,54$   
 Колеб. анализ впервые Хиллсборг и Хонгфорд. Миллер  
 Ph. R., 1928, 32, 213 численно нумерично согласно распредел. ин-  
 тенсивностей. Стабильность, это же нумерично более  
 вероятно по численности графика Коэндока  
 Времен. анализ 1-8, 0-8, 1-9, 0-9 (по эл. корф. F6, 0-6, 1-7 и 0-8)  
 Перемы верх.  $2\pi$  соот. представл. по Хиллу и Ван-Флекку

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| $B_1$ | $\gamma = 0$ | $\gamma = 1$ |
| $B_2$ | $\gamma = 0$ | $\gamma = 1$ |

|            | $\gamma' = 0$ | $\gamma' = 1$ | $\gamma'' = 8$ | $\gamma'' = 9$ |
|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| $B_1$      | 1,050         | 1,030         | 1,525          | 1,520          |
| $B_2$      | 1,047         | 1,037         | 1,550          | 1,538          |
| $B_{(av)}$ | 1,048         | 1,034         | 1,538          | 1,529          |

$O_2^+$   
 $A' = 8,2 \text{ cm}^{-1}$   
 $B' = 1,048 - 0,014 \text{ cm}^{-1}$   
 $\gamma' = 5,6 \cdot 10^{-6}$   
 $\gamma'' = 5,10 \cdot 10^{-6}$   
 $\gamma''' = 1,414$   
 $A'' = 1,95 \text{ cm}^{-1}$   
 $B'' = 1,610 - 0,009 \text{ cm}^{-1}$   
 $\gamma'' = 1,6 \cdot 10^{-6}$   
 $\gamma''' = 1,414$   
 $\gamma''' = 0,036; \gamma''' = 0,002$

1-8  
первое  
наименьшее

0,8

|          |                               |                               |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| $R_{21}$ | 28620,64 ( $\gamma'' = 1/2$ ) | 27747,31 ( $\gamma'' = 1/2$ ) |
| $R_2$    | 28607,31 ( $\gamma'' = 5/2$ ) | 27735,41 ( $\gamma'' = 5/2$ ) |
| $R_1$    | 28613,73 ( $\gamma'' = 1/2$ ) | 27740,12 ( $\gamma'' = 1/2$ ) |
| $P_1$    | 28605,92 ( $\gamma'' = 3/2$ ) | 27732,71 ( $\gamma'' = 3/2$ ) |

второе  
наименьшее

|              |                               |                               |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| $R_2$        | 28429,42 ( $\gamma'' = 3/2$ ) | 27557,92 ( $\gamma'' = 3/2$ ) |
| $P_2$        | 28415,34 ( $\gamma'' = 5/2$ ) | 27543,71 ( $\gamma'' = 5/2$ ) |
| $R_{12}$     | 28420,62 ( $\gamma'' = 3/2$ ) | 27549,43 ( $\gamma'' = 3/2$ ) |
| $O_{P_{12}}$ | 28413,22 ( $\gamma'' = 3/2$ ) | 27542,31 ( $\gamma'' = 3/2$ ) |

$2\pi_{1/2}(u) \Delta Y = p(\gamma + 1/2)$   
А-уравнение.

$2\pi_{3/2}(u) \Delta V = [p/\gamma^2 + 2q/\gamma](1/2)(\gamma + 1/2)(\gamma + 3/2)$  Stenckelberg. Ph.R., 1929, 34, 66

1,9

0,9

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 26972,33 ( $1/2$ ) | 25913,54 ( $3/2$ ) |
| 26961,61 ( $5/2$ ) | 25899,61 ( $5/2$ ) |
| 26965,72 ( $1/2$ ) | 25905,01 ( $3/2$ ) |
| 26959,11 ( $3/2$ ) | 25898,52 ( $3/2$ ) |
| 26785,04 ( $3/2$ ) | 26102,43 ( $1/2$ ) |
| 26771,64 ( $5/2$ ) | 26091,14 ( $5/2$ ) |
| 26776,74 ( $3/2$ ) | 26095,05 ( $1/2$ ) |
| 26769,71 ( $3/2$ ) | 26088,41 ( $3/2$ ) |

Mulliken R. S.

Mem.

Rev. Mod. Phys. 1932, 4, 51

52

$O_2^+$ , M. N.

Tate J. T., Smith P. T.

Men.

Phys. Rev. 1932, 39, 270

49

$O^+$   
2, 2 M. N., I. P.



$O_2^+$

8

Mulliken R.S., Stevens D.S.

1933

Phys. Rev., 1933, 44, 720

Новое значение  $O_2^+$ . Энергия диссоциации

$O_2^+$  и ионизационная потенциал  $O_2$

$D = 6,45 \pm 0,1$  эв.  $I = 12,2 \pm 0,1$  эв. для 2-го отрыва. см. прим.

Исправлена численная Elsworth'a и Koppfeld'a  
исходных - излучение Трубица

Карты: 2-е отрыва

15,0 48536  
48334  
14,0 48042  
47824  
13,0 47520  
47329  
12,0 46383  
46197

1,13 17606  
1,14 16381

11,1 44559  
44375  
0,10 21368  
21177  
1,11 20714  
20496  
0,11 19855  
19655  
0,12 18367  
18182

13 отрыва  
30 19972  
20 18878  
1,0 17751  
0,0 16589  
0,1 15574  
0,2 14581  
0,3 13606  
0,4 12669

$B'' =$   
 $= 1,592 - 0,000$

Вс - 5462 - 1

33.80

1935

 $O_2^+$ 

Borok L., Schmid R.

Phys. Rev., 1935, 48, 465Additional 1<sup>st</sup> approx. calc. none made  
B. r. approx

| $v_i \backslash v''$ | 0     | 1     | 2     | 3     | 4     |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0                    | 16589 | 15575 | 14581 | 13606 | 12669 |
| 1                    | 17751 | 16736 | 15741 |       |       |
| 2                    | 18878 | 17860 | 16871 |       |       |
| 3                    | 19972 | 18953 | 17959 | 16992 |       |
| 4                    |       |       |       | 18043 | 17097 |

(2,2) надл. Steubing  
Ann. Phys. 1910, 33, 553(2,0), (1,0), (0,0), (0,1) и (0,2) умест-  
ные парные  
(3,0), (0,3), (0,4) Mulliken,  
Stevens

Price W.C., Collins

Mem.

Phys. Rev. 1935, 48, 714

55.

$O^+$   
2, M.N., I.P.

11937

 $O_2^+$ 

Возонку Л.

Z. Phys., 1937, 104, 275

Вращательный анализ.  $^2\Pi \rightarrow ^2\Pi$ -полос  $O_2^+$ Высокоточн. разряд. Решетка с  $d = 1,2 \text{ \AA}/\text{мм}$ , 6,5 м

|                 |                  |                              |                      |
|-----------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| $B_e' = 1,0617$ | $B_e'' = 1,6722$ | $\lambda 4363,1 \text{ 0,9}$ | $\lambda 2381,0$     |
|                 |                  |                              | $2392,1 \text{ 7,1}$ |

|                       |                        |                              |  |
|-----------------------|------------------------|------------------------------|--|
| $\alpha_1' = 0,01906$ | $\alpha_1'' = 0,01984$ | $\lambda 4399,6 \text{ 0,9}$ |  |
|-----------------------|------------------------|------------------------------|--|

|                              |                                |                      |                      |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| $\alpha_2' \approx 0,000195$ | $\tau_e'' = 1,121 \text{ \AA}$ | $\lambda 4081,7$     | $\lambda 2343,0$     |
|                              |                                | $4113,8 \text{ 0,8}$ | $2353,8 \text{ 8,1}$ |

|                               |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|
| $\tau_e' = 1,406 \text{ \AA}$ |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|

По Stevens и Mulliken:

3829,5 0,7

3706,0 1,7

3602,6 0,6

3492,9 1,6

 $\lambda 3299,6$ 

3220,8 1,5

 $\lambda 2580,8$ 

2593,8 5,2

 $\lambda 2532,7$ 

2545,3 6,2

Вам табл.

вращ. анализ

и высок. разряд

$$B_v = 1.0617 - 0.01906(v + \frac{1}{2}) - 0.000195(v + \frac{1}{2})^2$$

$O_2^+$ 

b-a

Nevin T. E.

1937

Nature, 1937, 140, 1101

Вращательный анализ линии  $O_2^+$  в видим. обл.21 гр. решётка. Разряд  $O_2 + Ne$  $\lambda 5632 (1,0)$  $\lambda 6026 (0,0)$  $\lambda 6419 (0,1)$ 4 компоненты в 39 ветвях  $4\Sigma_g^- \rightarrow 4\Pi_u$ Расщепл.  $4\Pi_{1/2} - 4\Pi_{3/2}$  increasing с  $J$  во всех случаях и оч. мало в  $4\Pi_{3/2}$  и  $4\Pi_{5/2}$  сост. тонк. струк.  $4\Sigma$  совпад. с  $J$  сериями Вудро  $E = 0,146$  и  $\gamma \sim 0$ . $A = 16,9;$  $B'_e = 1,292$  $B''_e = 1,108$  $\alpha'_e = 0,027$  $\alpha''_e = 0,018$  $\tau_e = 1,271 \text{ Å}$  $\delta'_e = -6 \cdot 10^{-6}$  $\delta_e = -5 \cdot 10^{-6}$  $\tau_e = 1,316 \text{ Å}$

1938

Nevin T.E.

Phil. Trans. Roy. Soc. A, 1938, 237, 471  
Временный анализ первого отрыва

0,1 15438 изотопной системы после инициации

0,0 16026 В отрыве. светимости разряда через  $O_2$  при ион. давл.

1,0 15632

2<sup>й</sup> порог. 21 фт. резистивности  $\delta = 1,22 \text{ фт/мм}$

3550

| $\chi_\Sigma$                                                                                                                                                                   | $\chi_\Pi$                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\nu=0$<br>$B_0 = 1,2763$<br>$\Delta_0 = -5,92 \cdot 10^{-6}$                                                                                                                   | $B_0 = 1,1257$<br>$\Delta_0 = -4,76 \cdot 10^{-6}$<br>$\gamma \sim 43,8$<br>$A \sim 48,0$                                        |
| $\nu=1$<br>$B_1 = 1,2546$<br>$\Delta_1 = -6,30 \cdot 10^{-6}$                                                                                                                   | $B_1 = 1,0811$<br>$\Delta_1 = -4,75 \cdot 10^{-6}$<br>$\gamma \sim 44,4$<br>$A \sim 48,0$                                        |
| $B_e = 1,2871$<br>$\Delta_e = -5,73 \cdot 10^{-6}$<br>$\alpha_e = 0,0217$<br>$\beta_e = -0,38$<br>$\tau_e = 1,2732 \text{ \AA}$<br>$\varepsilon = 0,1487$<br>$\gamma = 0,00033$ | $B_e = 1,1046$<br>$\Delta_e = -4,76 \cdot 10^{-6}$<br>$\alpha_e = 0,0157$<br>$\beta_e$ or. mano<br>$\tau_e = 1,3743 \text{ \AA}$ |

$\chi_\Sigma$

$$f_1(k) = -\frac{3}{2}\varepsilon \left(1 - \frac{3}{2k+3}\right) + 3\gamma k$$

$$f_2(k) = +\frac{3}{2}\varepsilon \left(1 + \frac{3}{2k+3}\right) + \gamma(k-3)$$

$$f_3(k) = +\frac{3}{2}\varepsilon \left(1 - \frac{3}{2k-1}\right) - \gamma(k+4)$$

$$f_4(k) = -\frac{3}{2}\varepsilon \left(1 + \frac{3}{2k-1}\right) - 3\gamma(k+1)$$



O<sub>2</sub><sup>+</sup>

enum 5214 (<sup>! nante</sup>  
Kraus) 1940

- Budó A. et al

Zeitschr. für Pflanz. ~~116~~ 1940,

116, N 11-12. 693-700

Intensitätsverteilung in  
der Quartett-Dublett-Banden!

1940

 $O_2^+$ 

Nevin T. E.

Proc. Roy. Soc. A, 1940, 174, 371

Вращательный момент первой отрицательной системы кинорода II

Разреш в числ. He и  $O_2$  в полном катодРазреш. слия прибора ~ 200000. 2<sup>й</sup> и 3<sup>й</sup> порядки разряд

Чиселу 2,0 и 0,2

| $v/v_{max}$ | 0        | 1        | 2        |
|-------------|----------|----------|----------|
| 0           | 16666,74 | 15651,82 | 14657,67 |
| 1           | 17829,34 |          |          |
| 2           | 18957,77 |          |          |

$$v = 16587,88 + 1196,77(v' + \frac{1}{2}) - 17,09(v' + \frac{1}{2})^2 - 1035,69(v'' + \frac{1}{2}) + 10,39(v'' + \frac{1}{2})^2$$

Распредел. отсчетов (а не по Brandt'y и Рудю, [Значен] ±

$$F_1(j) = B_v [j(j+1) - \frac{3}{2} \{y_1 + 4j(j+1)\}^{\frac{1}{2}}] + \mathcal{D}_v (j - \frac{3}{2})^2 (j - \frac{1}{2})^2$$

$$F_2(j) = B_v [j(j+1) - \frac{1}{2} \{y_1 + 4j(j+1)\}^{\frac{1}{2}}] + \mathcal{D}_v (j - \frac{1}{2})^2 (j + \frac{1}{2})^2$$

$$F_3(j) = B_v [j(j+1) + \frac{1}{2} \{y_1 + 4j(j+1)\}^{\frac{1}{2}}] + \mathcal{D}_v (j + \frac{1}{2})^2 (j + \frac{3}{2})^2$$

$$F_4(j) = B_v [j(j+1) + \frac{3}{2} \{y_1 + 4j(j+1)\}^{\frac{1}{2}}] + \alpha + \beta j + \mathcal{D}_v (j + \frac{3}{2})^2 (j + \frac{5}{2})^2$$

$y_1 = Y(Y-4); Y = A/B_v; \alpha, \beta - \text{const}$

$$\Delta F_{21}(K) = 3z - 3y - 2yK$$

$$\Delta F_{34}(K) = 3z - y + 2yK$$

| $\nu$ | $3z$   | $y$     | $\Delta F_{21}$ |
|-------|--------|---------|-----------------|
| 0     | 0,4258 | -0,0005 |                 |
| 1     | 0,4333 | -0,0007 |                 |
| 2     | 0,4247 | -0,0003 |                 |
| 0     | 0,4448 | -0,0003 |                 |
| 1     | 0,4476 | -0,0001 |                 |
| 2     | 0,4265 | +0,0002 |                 |

| $\nu_2$                               | $\nu_1$              |
|---------------------------------------|----------------------|
| $B'_0 = 1,27526$                      | 1,09681              |
| $\mathcal{D}_0 = -5,91 \cdot 10^{-6}$ | -4,83 \cdot 10^{-6}  |
| $B_1 = 1,25420$                       | 1,08099              |
| $\mathcal{D}_1 = -6,07 \cdot 10^{-6}$ | -4,73 \cdot 10^{-6}  |
| $B_2 = 1,23213$                       | 1,06531              |
| $\mathcal{D}_2 = -6,28 \cdot 10^{-6}$ | -4,64 \cdot 10^{-6}  |
| $B_3 = 1,28729$                       | 1,10466              |
| $\mathcal{D}_3 = -5,81 \cdot 10^{-6}$ | 4,88 \cdot 10^{-6}   |
| $\mathcal{D}_4 = 9,02206$             | 9,01575              |
| $B_5 = -0,185 \cdot 10^{-6}$          | +0,095 \cdot 10^{-6} |
| $\mathcal{D}_6 = 1,27314$             | 1,37438              |

| $\nu''=0$        | $\nu''=1$        | $\nu''=2$        |
|------------------|------------------|------------------|
| $\alpha = -0,99$ | $\alpha = -0,66$ | $\alpha = -0,75$ |
| $\beta = +0,038$ | $\beta = +0,027$ | $\beta = +0,034$ |
| $A = -47,95$     | $A = -47,93$     | $A = -47,92$     |
| $A = -47,99$     | $A = -47,99$     | $A = -48,01$     |

$Y = -4436$   
 $A_0 = -47,97$   
 $Y_1 = -4436$   
 $A_1 = -47,96$   
 $Y_2 = -45,02$   
 $A_2 = -47,96$

$O_2^+$ 

18

Nevin T.E., Murphy T.

Proc. Roy. Irish Acad. A, 1941, 46, 169

Анализ (0,3)-кислоте 1<sup>й</sup> ступени. сист.  $O_2^+$ 

$$D = 1,25 \text{ Å/мм} \quad 17348 \text{ Å} \quad {}^4\Sigma_g^- - {}^4\Pi_u$$

$$v''=3 \quad v_0 = 13684,02 \quad B_3'' = 1,05027 \pm 0,00002$$

$$13683,95 \quad 1,04956$$

$$D_3'' = -5,04 \cdot 10^{-6}$$

$$-4,54 \cdot 10^{-6}$$

2 экз. пошт. из-за метода расчета

ВФ-279-1

1941

 $O_2, O_2^+$ 

Tanaka Y, Takamine T.

Phys. Rev, 1941, 59, ~~613~~ 771Колебательная структура  ${}^4\Sigma_g^-(O_2^+) \leftarrow {}^3\Sigma_g^-(O_2)$ 

серию Ридберга

 $\lambda 740-660 \text{ \AA}$ 

| $\lambda$           | $v_{00}$ |
|---------------------|----------|
| 732,22 $\text{\AA}$ | 0,0      |
| 725,98 $\text{\AA}$ | 1,0      |
| 720,07 $\text{\AA}$ | 2,0      |

 $J(O_2^+ b^4\Sigma_g^-) = 18,08 \pm 0,01$  $\Delta y_{1/2} = 1157$ 

волна с 1162

1127

 $\Delta y_{3/2} = 1126$ из волн.  
 $b^4\Sigma_g^-(O_2^+)$

1942

$O_2, O_2^+$

Tanaka Y., Takamine T.

Sci. Pap. Inst. phys.-chem. Res., Tokio,  
1942, 39, 437

Колесательная структура  ${}^4\Sigma_g^-(O_2^+) \leftarrow {}^3\Sigma_g^-$  серия  
Ридберга  $O_2$

3-м. вакуум. спектрограф с решеткой

$$J(O_2^+ {}^4\Sigma_g^-) = 18,079 \pm 0,004$$

$$(0,0): \nu = 1465,48 \text{ см}^{-1}; \lambda = 682,37 \text{ Å}; E = 18,079 \text{ eV}$$

$$(1,0): \nu = 1477,05 \text{ см}^{-1}; \lambda = 677,03 \text{ Å}; E = 18,222 \text{ eV}$$

$$(2,0): \nu = 1488,31 \text{ см}^{-1}; \lambda = 671,90 \text{ Å}; E = 18,360 \text{ eV}$$

~~201 421 1101~~  
71 8 50 331

$$\begin{array}{lcl}
 (0,0) & 163,802 \pm 50 \text{ cm}^{-1} & = 20,207 \text{ eV} \pm 0,01 \\
 (1,0) & 164907 & 20,343 \\
 (2,0) & 165958 & 20,473
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \omega_e = 1159 \text{ cm}^{-1} \\
 \omega_e x_e = 27 \text{ cm}^{-1}
 \end{array}$$

1943

 $O_2^+$ 

b-a

11.

Singh N. L., Lal L.

Science and Culture, 1943, 9, 89

Do. 1943



$O_2^+$

LOU 5217 | (Buicke  
Kraes)

1944

Buicko A., et al.

Phys. Z. 1944, 45,  
122 - 6.

Über die  $\Lambda$ -Verdopplung der  
47terme.



v

1948

 $O_2^+$ 

A-X

Lal L.

Phys. Rev., 1948, 73, 255

Новые данные во второй отрицательной  
или УФ системе колеб. молекулы  $O_2^+$

Получ. в в.т. спектре (кислород при кат. КМД)  
фотогр. на малом призм. спектрографе Hilger'a

| v <sup>i</sup> \ v <sup>ii</sup> | 0              | 1            | 2              | 3              | 4              | 5              | 6             |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 0                                |                |              |                |                | 12,5)<br>207   | 29393?<br>207  | 27710?<br>538 |
| 1                                |                |              |                | 33735<br>—     | 32009<br>31803 | 30303<br>084   | 28611<br>420  |
| 2                                |                | 38196<br>001 | 36365<br>182   | 34572<br>380   | 32841<br>628   | 31131<br>30938 | —<br>29254    |
| 3                                |                | 38990<br>784 | 37167<br>36954 | 35409<br>197   | 33657<br>463   | 31940<br>747   | 30259<br>—    |
| 4                                |                | 39768<br>564 | 37960<br>765   | 36182<br>35998 | 34447<br>239   | 32750<br>550   |               |
| 5                                |                | 40539<br>340 | 38732<br>551   | 36954<br>753   |                |                |               |
| 6                                | 43120<br>42900 | 41279<br>079 | 39473<br>283   | 37682<br>491   |                |                |               |
| 7                                | 43813<br>613   | 41986<br>788 | 40174<br>39982 | 38412<br>196   |                |                |               |

$O_2^+$

Франсcomb Л. М.

Phys. Rev., 79, 619 (1950)

Аномальное вращение молекул и тем-  
пература верхней атмосферы

Выводили анализ инфракрасных молекул  
8,1 единицы  $2P_u - 2P_g$  Валин с  
группы Гевенса Кингсго

$$B'_0 = 1,051 \quad \alpha = 0,023$$

$$B''_0 = 1,623 \quad \alpha = 0,015$$

1950

 $O_2^+$ 

Feast M.W.

Proc. Phys. Soc, A63, 557

новые полосы второй отрицательной  
системы  $O_2^+$ ; замечание по эмиссион-  
ным спектрам  $O_3$  и  $OII$ .

Исследование спектр безызлучающего излучения в  
ультра-ультрафиолете

В обл. 2000-7000 Å использ. средний кварцевый  
спектрограф Нилсена Е-2. В обл. 6000-10000 Å - при-  
менно-решетчатый прибор.

Рядом 2000-6000 Å распадаются. отщепления. В кристаллическом  
 агрегат. ит. полос с двойными максимумами. Распредел. ит. в  
 Полосе ит. исследована: <sup>интенсивности</sup> в соотношении с теорией  
 Pillow, (неопубликованно)

1. Johnson, 1924, Pr. Roy. Soc. A105, 583
2. Ellsworth, Karpfield, 1927, Phys. Rev, 29, 74
3. Stevens, 1931, Phys. Rev, 38, 1291
4. Mulliken, Stevens, 1933 Phys. Rev, 44, 720
5. Lal, 1948, Phys. Rev, 73, 255

Полосы отщепления и переходу  $\Lambda^2\Pi_u \rightarrow X^2\Pi_g$  с двойными рас-  
 щеплениями  $\sim 200 \text{ см}^{-1}$ . ( $z'_e = 1,41 \text{ Å}$ ;  $z''_e = 1,14 \text{ Å}$ ). Числен. по Кемпбеллу, изданные  
 в таблице.  $v = 38596 + \{898,9(v' + \frac{1}{2}) - 13,7(v' + \frac{1}{2})^2\} - \{1876,4(v'' + \frac{1}{2}) - 16,53(v'' + \frac{1}{2})^2\}$

ф-лы по кр. Jevons'a (1932) и Birge (1929), с поправками [2].

| v     | v'    |
|-------|-------|
| 39013 | 11,42 |
| 38615 | 10,42 |
| 38403 | 10,42 |
| 37333 | 8,42  |
| 37143 | 8,42  |
| 34955 | 7,52  |
| 34745 | 7,52  |
| 34040 | 6,52  |
| 33268 | 5,52  |
| 33072 | 5,52  |
| 32564 | 4,62  |
| 32367 | 4,62  |
| 32301 | 4,62  |
| 32108 | 3,72  |
| 31629 | 2,72  |
| 30991 | 1,72  |
| 30689 | 0,82  |
| 30170 | 0,52  |
| 29984 | 0,52  |
| 29811 | 0,52  |
| 28844 | 0,10  |
| 28225 | 0,10  |
| 28021 | 0,10  |
| 27367 | 0,10  |
| 27016 | 0,10  |
| 25445 | 0,10  |
| 25251 | 0,10  |
| 21002 | 0,13  |
| 20815 | 0,13  |
| 19595 | 0,14  |
| 19439 | 0,14  |

1950

Pillon M.E.

Proc. Phys. Soc., 1950, 63A, 940

Распределение интенсивности в системах  
пары  $O_2$  и  $O_2^+$

$O_2$  - сист. Шумана-Рунге и Герцберги

$O_2^+$  - 2-х отрицат. сист.

$O_2^+$   
спектр  
распред.  
интенсив.  
расчет

C.A., 1951, 1420f

Hangstrom H.D.

Wen

Rev. Mod. Phys. 1951, 23, 185

66

$O_2^+$ , c.c.n., 1.P.



1953

 $O_2^+$ 

Jnn E.C.V.

Phys. Rev, 1953, 91, 1194  
 фотоионизация молекул в вакуум. УФ.

 $O_2^+$   $12,04 \pm 0,01$ NO  $9,23 \pm 0,02$ NH<sub>3</sub>  $10,13 \pm 0,02$ SO<sub>2</sub>  $12,42 \pm 0,06$ C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>  $10,47 \pm 0,02$ 

Проведение  
 сравнение с иониза-  
 цийными потенциа-  
 лами по методу  
 электр. удара и спек-  
 трометрии

$O_2^+$

оним 5211 / (8 науке)  
Ковалес

1955

Budo A., et al  
Experiment. Techn. der  
Phys. 1955, Sonderheft  
Spektroskopie, 1-5.

über den  $4\pi$  Zustand des  
 $O_2^+$  Moleküls.

✓  
 $O_2^+$

Оттиски 3179 / в накле  
Kovacs J. 1955  
Budo A., Kovacs J.

Acta Phys. Acad. Sci. Hung., 1955, 4, 273

ЧП-состояние молекулы  $O_2^+$ . (немецк.)

Мультипл. расщепл. представл. как ср-ции  
вращат. квант. числа учитывае от  
ср-ции Ванфлека. Это объясняет возмущ-  
нием ср-ч. ЧП двумя  $^2П$ -состояниями,  
что дает совпадение с экспериментом.  
Отсюда можно вывести приближ. положение и  
мультипл. расщепл. терм.  $^2П$ .



По предполож. авторов новое  
 $^2П$ -ср-ч. лежит  $\sim 8500 \text{ см}^{-1}$  над  
 $^4П_{3/2}$  уровнем или  $\sim 1700 \text{ см}^{-1}$   
над  $^4П$ . Мультипл. расщепл.  $\sim -104 \text{ см}^{-1}$

6 120  
С. А., 1955; 11395 f

$$6^2 \pi^4 \pi X^2 \pi_g \quad T=12,37-6 \quad \Delta=18,7$$

$$6^2 \pi^3 \pi^2 a^4 \pi_u \quad T=16,17-6 \quad -11-$$

$$6^2 \pi^3 \pi^2 A^2 \pi_u \quad T=177-6 \quad -11-$$

$$6^2 \pi^3 \pi^2 2 \pi_u \quad T=17,27-6 \quad -11-$$

$$6 \pi^4 \pi^2 8^4 \Sigma_g \quad T=18,15-6 \quad \Delta=20,77-6$$

$O_2^+$

1955

5177  
Bando Kovacs

Bando A., Kovacs J.,

J. Chem. Phys., 1955, 23, 751.

О 4π состоянии молекулы  $O_2^+$

$O_2^+$

$O_2^+$

A. Budó, J. Kovacs

1955

Magyar Fys. Folyóirat 3, 67,

Учен. зап. к. казан.  $O_2^+$

LA 53

1959 2773 f.

Якименко, Л. М.

Успехи в области электрохимического получения хлора.

Хим. наука и пром-сть, т. 3, № 4, 1958, с. 424-431.

Библиогр: 42 назв.

№ 71927

IX № 5346

Всесоюз. кн. палата 23 IX 58

16-106

O<sub>2</sub><sup>+</sup>

1955  
Jauch W. Fraser P.  
Nicholls P.

Astrophys. J. 122, 55-61

Вероятности переходов  
в колеб. спектре  
Na, NO, O<sub>2</sub>, O<sub>2</sub><sup>+</sup>, OH, CO  
и CO<sup>+</sup>.





$O_2^+$   
( $D_0$ )

Bφ-187-T

1956

Watanabe K.,  
Marmo F.F.,

J. Chem. Phys., 1956, V. 25, N. 5 pp 965-971

Q<sub>2</sub><sup>+</sup>

Omniscu 3171. 1957

G. Herzberg

(70)

Mem. Soc. Roy. Sci.  
Liege, 1957, 18, 397-418

1958  
D.C. Frost, C.A. Mc Dowell

Wet.  
J. Amer. Chem. Soc.  
1958, 80, 6183

65

$O_2^+$  M.N.

$O_2^+$  (m.n.)

xī 1918

1959

Kovacs J.,

Proc. Intern. Meeting Mol.

Spectr. 4th, Bologna, 1959,

1, 251-54

10

0 +  
2

оттиски 5180 (в папке Kovacs)

1959

† 6Б95. Роль спин-спинового взаимодействия в мультиплетном расщеплении состояния  $^4\Pi$  молекулы  $O_2^+$ . Kovacs I. The role of the spin-spin interaction in the multiplet splitting of the  $^4\Pi$  state of the  $O_2^+$  molecule. «Acta phys. Acad. scient. hung.», 1959, 10, № 3, 255—258 (англ.; рез. русск.).—Показано, что спин-спиновое взаимодействие вызывает в ионе  $O_2^+$  те же самые отклонения от обычного мультиплетного расщепления состояния  $^4\Pi_u$ , что и спин-орбитальное взаимодействие, которым первоначально и объяснялись наблюдаемые отклонения. Таким образом эти отклонения можно объяснить обоими типами взаимодействий. А. Мальцев

Рассмотрение между 2 возбуждающими  
 $^2\Pi$  состояниями, т.е. между  $A^2\Pi$  и невы-  
 вестью  $^2\Pi$  состояниями около  
 5700 см<sup>-1</sup> а не 1700 см<sup>-1</sup> как  
 предполагалось

ж. 1961.6

1964

 $O_2^+$ 

New bands in the second negative system of  $O_2^+$ . J. Byrne (Univ. Coll., Dublin, Ire.). *Proc. Phys. Soc. (London)* 78(504), 1074-5(1961). In searching for new transitions of the O spectrum, an extension of the 2nd neg. system was observed. The measurements of these new bands were reported.

P. V. Hoffman

C.A. 1964. 6D. 5  
4948c

O<sub>2</sub>

1961

10 B101. Новые полосы во второй отрицательной системе кислорода. Byrne J. New bands in the second negative system of oxygen. «Proc. Phys. Soc.», 1961, 78, № 5, Part 2, 1074—1075 (англ.)

Исследован спектр  $O_2^+$  в области 400—7000 Å возбуждаемый ВЧ-разрядом в чистом кислороде. Сравнительно с известными, новых систем полос  $O_2^+$  не обнаружено. Зарегистрированные новые полосы в области 1900—7000 Å представляют продолжение 1-й отрицат. системы. Приведен анализ спектра. В свете полученных данных обсуждаются различные интерпретации спектра разряда в кислороде.  
Ю. Мазуренко

РЖФ 1962

10 B 101

$O_2^+$

Carroll P.K.

1961

Proc. Phys. Soc. 78, N504, 1074

Новые данные второго отрицательного  
состояния кислорода.

Спектр  $O_2^+$  изучен в области 400-  
7000 Å с целью обнаружения новых  
состояний. Таковых не найдено, но  
6 обнаружены под углом  $\theta$  от  
оси зрения. Указаны - в скобках -



Токиа passed over water  $O_2$ . Выведение  
соединения ( $f = 30 \text{ м.}, 2,5 \text{ А/мм}$ ). У.у. и ли-  
нейный вид. из Химического, при этом с помощью  
формулы  $\lambda 4350 \text{ \AA}$  во II порядке 2-го периода.  
Приводятся данные о том и описании воды. Опи-  
сание, что такое описание. Присоединение  $O_2^+$  или  
ион  $O^+$  при образовании молекулы  $O_2^+$ . Обнаружены  
соединения атомов кислорода в  $5 \text{ м. } 1870 \text{ \AA}$ , т.е.  
25 микрон расстояния, при этом. Описывается, что при  
мелении при этом с  с помощью формулы  
по формуле  $D_2(O_2^+)$

1961

11 В193. Возбуждение первой отрицательной системы  $O^+_2$  пучком протонов в воздухе и кислороде. Ferguson H. I. S., Nicholls R. W., Herman L. Excitation of the first negative system of  $O^+_2$  by a proton beam in air and oxygen. «Publ. Groupem. avancem. méthodes spectr.», 1961, jan-juin, 105—107 (англ.; рез. франц.)

Проведено предварительное исследование первой отрицат. системы полос  $O^+_2$  ( $b^4\Sigma_g^- - a^4\Pi_u$ ) в области 2300—7000 Å, возбуждаемой пучком протонов с энергией 40 кэВ при давлениях  $10^{-1}$  и  $10^{-3}$  мм рт. ст. Кроме указанной системы полос, наблюдается испускание  $N^+$ ,  $O^+$ ,  $N^+_2$ , а также  $NH$ ,  $OH$ ,  $HI$ . При исследованных давлениях пучок протонов резко ограничен и испускание происходит в центре пучка. Это указывает на первичное возбуждение свечения протонами с обменом зарядом по схеме:  $H^+ + O_2 (X^3\Sigma^-_g) \rightarrow H^* + O^+_2 (b^4\Sigma_g^-)$ . Были проведены аналогичные опыты с  $N_2$ ,  $H_2$ ,  $C_2H_2$  и  $H_2O$ . В последнем случае наблюдалось интенсивное испускание полосы  $OH$  у 3064 Å. Библ. 16 назв. Г. Неуймин

ф. 1962. 11 В

1961

02  
 Excitation of the first negative system of  $O_2^+$  by a proton beam in air and oxygen. L. Herman, H. I. S. Ferguson, and R. W. Nicholls (Univ. Western Ontario, London). *Can. J. Phys.* 39, 476(1961).—The excitation of the bands of the  $O_2^+$  1st neg. ( $b^4\Sigma_g^- - a^4\Pi_u$ ) system by 40-e.kv. proton beams in air and O at low pressures is reported. The resulting emission spectra were investigated at 0.1–0.001 mm., 2300–7000 Å. The leading 2 or 3 bands in each of the  $\Delta v = -2, -1$ , and 0 sequences of the  $N_2^+$  1st neg. ( $B^2\Sigma - X^2\Sigma$ ) system, and of the  $\Delta v = -1, 0$ , and  $+1$  sequences of the  $O_2^+$  1st neg. ( $b^4\Sigma_g^- - a^4\Pi_u$ ) system, are excited together with lines of N II, O II, and H I. In air, the  $O_2^+$  bands are much weaker than those of  $N_2^+$ . For example, the  $N_2^+$  (0,0) band is easily recorded in a few sec., while the  $O_2^+$  (0,0) band requires several hundred sec. Measured rotational temps. of the  $N_2^+$  bands are close to room temp., 0.1–0.01 mm. The  $O_2^+$  bands in pure O, on the other hand, are excited very strongly. About 60 sec. exposure is sufficient to record them photographically. H. H. Jaffé

C. 17. 1961. 55. 13. 12028ab

1961

$O_2^+$

Herman L., Ferguson H. J. S.,

Nicholls R. W.,

Canad. J. Phys., 1961, 39, 476 (v3)

Безызлучение / approx. current

$O_2^+$  proportional to current to by-  
type in vacuum tube.

40 кВ.  $10^{-1} - 10^{-3}$  м. р.с.с.


от 3000 - 7000 А, катодная энергия

$N^+$ ,  $O^+$ ,  $N_2^+$ ,  $O_2^+$ , сдвиги  $\Delta v = -2$

-1, 0  $N_2^+$  (B $^2\Sigma^-$  - X $^4\Sigma$ ),  $\Delta v = -1$ ,

0, +1  $O_2^+$  (B $^4\Sigma_g^-$  - a $^4\Pi_g$ ).

написи  $O_2^+$  ионного аниона  $N_2^+$  в вакууме  
и при сильном в кинетике. Криво -  
эластиче некакими



O<sub>2</sub><sup>+</sup>  
2

от тески 5178

1962

в книге Ковач

3 Д55. О роли спин-спинового взаимодействия в мультиплетном расщеплении <sup>4</sup>Π-состояния молекулы O<sub>2</sub><sup>+</sup>. Kovács I. The role of the spin-spin interaction in the multiplet splitting of the <sup>4</sup>Π state of the O<sub>2</sub><sup>+</sup> molecule. «Advances Molec. Spectrosc. Vol. 1». Oxford — London — New York — Paris, Pergamon Press, 1962, 251—254. Discuss., 254 (англ.)

См. РЖФиз, 1960, № 8, 19803.

ф. 1963. 30

$O_2^+$

omn. 5178

1962

G. Kovacs

Cheng

The role of the spin-spin interaction in the multiplet splitting of the  $^4\pi$  state of the  $O_2^+$  molecule. I. Kovacs (Polytech. Univ., Budapest, Hung.). *Proc. Intern. Meeting Mol. Spectry., 4th, Bologna, 1959* 1, 251-4 (Pub. 1962). The spectrum of  $O_2^+$  is explained by allowing for 2 perturbing effects; the spin-spin interaction and the spin-orbit interaction of two  $^2\pi$  terms. Assuming that the const. of the 1st for the  $^4\pi_u$  state is approx. equal to that in the  $^4\Sigma^-_g$  state, the hitherto unobserved  $^2\pi_u$  term is found to be  $\sim 5700 \text{ cm.}^{-1}$  from the  $A^2\pi_u$  term, instead of  $1700 \text{ cm.}^{-1}$ , as previously reported.

A. L. McClellan

C.A. 1963.59.5

4678 d

0+  
2

2 Д72. Об интерпретации аномального расстояния между компонентами мультиплета состояния  $^4\Pi$  молекулы ионизованного кислорода. Kovacs I., Weniger S. Sur l'interprétation de la séparation anormale des composantes du multiplet de l'état  $^4\Pi$  de la molécule d'oxygène ionisée. «J. phys. et radium», 1962, 23, № 6, 377—380 (франц.; рез. англ.)

Изучение вращательной структуры полос первой отрицат. системы  $^4\Sigma_q^- - ^4\Pi_u$  молекулы  $O_2^+$  показывает, что зависимость расстояний между компонентами мультиплета  $^4\Pi$  от квантового числа  $J$  не согласуется с теорией Брандта (Brandt W. H. «Phys. Rev.», 1936, 50, 778). Это расхождение объясняется спин-орбитальными и спин-спиновыми взаимодействиями. Получены ф-лы для разностей между возмущенными и невозмущенными уровнями энергии компонент мультиплета. Эти разности выражаются через константы названных выше взаимодействий и через элементы матриц преобразования энергии от случая а Гунда к случаю, промежуточному между случаями а и b Гунда. По полученным ф-лам построены кривые зависимости разностей  $\Delta F'_{ik} - \Delta F_{ik}$  от  $J+1/2$  для значений колебательного квантового числа

1962

отмечен 5184  
в нем Kovacs

ф. 1963

все  
нужно



$v''=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ . Сопоставление этих кривых с опытными данными позволяет найти численные значения констант взаимодействия для всех перечисленных значений  $v''$ .

М. Ковнер



0+  
2

Summary 5784  
of name Kovacs

1962

) Interpretation of the anomalous splitting of the multiplet components for the  $^4\Pi$  state of ionized oxygen. I. Kovacs and S. Weniger (Polytech. Univ., Budapest, Hung.). *J. Phys. Radium* 23, 377-80(1962). The multiplet splitting in the  $^4\Pi_u$  state of the  $O_2^+$  mol., which is a function of the rotational quantum no., deviates from the formulas derived by Brandt (CA 31, 2095<sup>1</sup>). It can be interpreted as a perturbation of the  $^4\Pi$  state by the  $^2\Pi$  states, taking into account the spin-spin interaction. H. Rosenwasser

C.A. 1962.57.10.

119726c

1962

14 Б91. По поводу интерпретации аномального расстояния между компонентами мультиплета состояния  $^4\Pi$  ионизованной молекулы кислорода. Kovacs I., Weniger S. Sur l'interprétation de la séparation anormale des composantes du multiplet de l'état  $^4\Pi$  de la molécule d'oxygène ionisée. «J. phys. et radium», 1962, 23, № 6, 377—380 (франц.; рез. англ.)

Наблюдаемое расстояние между компонентами мультиплета  $^4\Pi_u$  молекулы  $O_2^+$ , зависящее от вращательного квантового числа  $J$ , не согласуется с теорией Брандта (Brandt W. H. «Phys. Rev.», 1936, 50, 778). Расхождения хорошо объясняются при учете возмущения состояния  $^4\Pi_u$  состоянием  $^2\Pi_u$ , причем во внимание принимаются спин-спиновое и спин-орбитальное взаимодействия. Расчет показывает, что в согласии с экспериментом, несмотря на сильное возмущение самих термов, разности между возмущенными и невозмущенными компонентами мультиплетов весьма малы для всех значений колебательного квантового числа  $v$  от 0 до 6.

В. Дпанов-Клоков

X. 1963. 14

O<sub>2</sub> (J)

"

1962

O<sub>2</sub><sup>+</sup> (E:)

XI 2152

Namiooka T., Ogawa M., Tanaka Y.

Proc. Intern. Symp. Mol. Struct. Spectry  
Tokyo, 1962 (B208) 4 pp

6 app 3

The  $b^4\Sigma_g^- \leftarrow X^3\Sigma_g^-$  Rydberg series  
of the oxygen molecule.

W. (Φ)

CA, 1964, 61, 54, 3804 b

(1962

Wallace L.

Mem.

Astrophys. J. Suppl.  
1962, 4, 185

61

O<sub>2</sub><sup>+</sup>, m. n.

O<sub>2</sub><sup>+</sup>

1962

12 В296. Исследование спектра молекулярного иона кислорода в ближней ИК-области. Weniger S. Etude du spectre de la molécule d'oxygène ionisée dans le proche infra-rouge. «J. phys. et radium», 1962, 23, № 4, 225—237 (франц.; рез. англ.)

Изучена первая отрицат. система  $^4\Sigma_g^- - ^4\Pi_u$  молекулярного иона кислорода, возбужденного в разряде постоянного тока с полым катодом при низкой т-ре. Исследование системы простирается на фотографич. ИК-область до 8780 Å. Проанализировано несколько новых полос, принадлежащих последовательностям  $\nu' - \nu'' = -3, -4, -5$ . Уточнены спектроскопич. константы  $B_\nu''$  и  $\nu_0$  для изученного перехода в молекуле  $O_2^+$ . Ф. Ортенберг

ф. 1962. 12В

02+  
2381. Исследование спектра ионизованной молекулы кислорода в ближней инфракрасной области. Weniger S. Etude du spectre de la molécule d'oxygène ionisée dans le proche infra-rouge. «J. phys. et Radium», 1962, 23, № 4, 225—237 (франц.; рез. англ.)

Исследован спектр излучения ионизованного кислорода  $O_2^+$ , отвечающий переходу  $^4\Sigma_g - ^4\Pi_u$  (первая отрицательная система) вплоть до 8800 Å. Источником служила разрядная трубка с полым катодом, наполненная чистым кислородом при давл. 0,07—0,3 мм рт. ст. и охлаждаемая жидким азотом. Дисперсия спектрографа с решеткой, применявшегося при детальном исследовании полос, составляла 3 Å/мм. Обнаружены новые полосы, отвечающие переходам  $v' - v'' = -3, -4, -5$ . Приведены таблицы наблюдаемых линий и результаты анализа. В. Дианов-Клоков

1962

0<sup>+</sup>  
2

Near-infrared spectral study of the ionized oxygen molecule. S. Weniger (Observatoire Paris-Meudon). *J. Phys. Radium* 23, 225-37(1962). A d.c. discharge was used at low temp. to obtain the 1st neg. system  ${}^4\Sigma_g - {}^4\Pi_u$  of the ionized O mol. Some new rotational bands in the sequence  $\nu' - \nu'' = -3, -4$ , and  $-5$  were analyzed and mol. consts. detd. H. Rosenwasser

C.A. 1962.57.7

8034 f



1963

10 Д129. Электронные состояния полос испускания системы Хопфильда в кислороде. LeBlanc Francis J. Electronic states of Hopfield's oxygen emission bands. «J. Chem. Phys.», 1963, 38, № 2, 487—488 (англ.)

Выполнен спектроскопич. анализ трех полос системы Хопфильда, полученных в разряде в смеси  $\text{He} + \text{O}_2$ . Сравнение полученных и известных спектроскопич. констант  $\text{O}_2^+$  показывает, что полосы принадлежат молекуле  $\text{O}_2^+$  и соответствуют переходу между состоянием  $b^4\Sigma_g \text{O}_2^+$  и верхним состоянием предположительно обозначенным  $c^4\Sigma^-$ , расположенным на 24,56 эв выше основного состояния и имеющим  $B_v = 1,557 \text{ см}^{-1}$ .

Ф. 1963. 10А

1963

O<sub>2</sub>

Electronic states of Hopfield's oxygen emission bands. Francis J. LeBlanc (L. G. Hanscom Field, Bedford, Mass.). *J. Chem. Phys.* **38**, 487-8(1963). The Hopfield (CA 26, 3439) emission bands of O arise from a transition in the O<sub>2</sub><sup>+</sup> mol. The upper state is new, designated  $c^4\Sigma_u^-$ , assuming an allowed transition, while the lower state is the known  $b^4\Sigma_g^-$  state. The single observed vibrational level of the  $c^4\Sigma_u^-$  state lies at 24.56 e.v. above the ground state of the O<sub>2</sub> mol. The rotational const. B of the upper state vibrational level has a value of 1.557 cm.<sup>-1</sup> CA

C.A. 1963. 58. 8  
7515 be

$O_2^+$   
2

6 Б46. Электронные состояния полос испускания Гопфильда для кислорода. LeBlanc Francis J. 1963  
Electronic states of Hopfield's oxygen emission bands.  
«J. Chem. Phys.», 1963, 38, № 2, 487—488 (англ.)

Исследовано испускание полос Гопфильда от смеси He (14 мм рт. ст.) и  $O_2$  (0,6 мм рт. ст.) в капилляре, находящемся в конденсированном разряде. Дисперсия кварцевого спектрографа составляла 1,5 А/мм в области 2100 А. Проведен вращательный анализ трех полос (2123; 2170; 2218А; предположительно они отнесены как 0—4, 0—5 и 0—6 соответственно). Полосы состоят из одиночных линий  $P$ - и  $R$ -ветвей, что позволяет интерпретировать переход как  $\Sigma \rightarrow \Sigma$ . При сопоставлении полученных констант с известными для  $O_2$  и  $O_2^+$  удалось отождествить нижнее состояние полос Гопфильда с известным уровнем  $b^4\Sigma_g^-$  молекулы  $O_2^+$ . Обнаружено новое верхнее состояние этой молекулы, предположительно обозначенное  $c^4\Sigma_u^-$ . Единственный наблюдаемый колебательный уровень этого состояния расположен на 24,56 эв выше основного уровня нейтр. мо-

X. 1964.6


см. м/аб

лекулы  $O_2$ ; вращательная постоянная верхнего уровня  $B=1,557 \text{ см}^{-1}$ . Высоко расположенный верхний уровень позволяет предположить, что в разряде происходит процесс  $He^+(25) + O_2(X^3\Sigma) \rightarrow He(1S) + O_2^+(c^4\Sigma)$ , возможный вследствие того, что ионизационный потенциал He составляет 24,585 эв.

В. Днанов-Клоков



1963



Dorman F. H., Morrison J. D.

J. Chem. Phys., 1963, 39, 1206 (н. 4)

резонансы поглощения в области

I

заменяемых кислорода и азота

$$I(O_2^{2+}) = 36,3 \text{ эв}$$

$$I(N_2^{2+}) = 42,4 \pm 0,1 \text{ эв или } 43,8 \pm 0,1 \text{ эв}$$

20-6

1963

0<sup>+</sup>  
2

➤ 4 Д73. Потенциалы двукратной ионизации [молекул] кислорода и азота. Dorman F. H., Morrison J. D. Ionization potentials of doubly charged oxygen and nitrogen. «J. Chem. Phys.», 1963, 39, № 7, 1906—1907 (англ.)

Рассчитанные в работе (РЖФиз, 1962, 2В7) потенциалы двукратной ионизации двухатомных молекул хорошо совпали с эксперим. данными, за исключением кислорода. Очевидной эксперим. трудностью здесь является равенство отношения  $e/m$  для  $O_2^{2+}$  и  $O^+$ . С помощью изотопа  $O^{16}O^{17}$ , а также  $N^{14}N^{15}$  показано, что правильно измеренные значения потенциалов двукратной ионизации  $N_2$  и  $O_2$  находятся в хорошем согласии с вычисленными и составляют  $36,3 \pm 0,5$  эв для кислорода и  $42,7 \pm 0,1$  и  $43,8 \pm 0,1$  эв для двух состояний азота. Ю. Беляев

ф. 1964.48

1963

Gilmore F. R.

RAND Corp., Santa Monica, Calif.

Energy levels, partition functions and fractional electronic populations for nitrogen and oxygen atoms and ions to 25,000° K.

(see. N)

Gilmore F. R.

1963

D2+

2i

U.S. Dept. Com. Office Tech.  
Serv., AD 413,068, 40 pp.

Energy levels, partition  
functions, and fractional  
electronic populations for  
nitrogen and oxygen atoms  
and ions to 25000° K.

C.A-1964-60-8  
8744g



O<sub>2</sub><sup>+</sup>; O<sub>2</sub> (м.ч.)      XI 1930      1963

Le Blanc F. F.,  
J. Chem. Phys., 1963, 38, N2, 487-88

10

есть офин.

Nicholson A. J. C. 1963

Were.

J. Chem. Phys.  
1963, 39, 954

40

$O_2^+$ , M. N., I. P.

1963

4 Б75. Интенсивности колебаний первой отрицательной системы полос  $O_2^+$ . Rao P. S. R. Vibrational intensities of the  $O_2^+$  (first negative) bands. «Proc. Phys. Soc.», 1963, 81, № 2, 240—243 (англ.)

Полосы излучения первой отрицательной системы  $O_2^+$  ( $b^4\Sigma_g^- \rightarrow a^4\Pi_u$ ) получены в разряде переменного и постоянного тока, конденсированном разряде переменного тока и в разряднике с полым катодом. Кислород, полученный нагреванием перманганата калия, перед попаданием в разрядники пропусклся через ловушки с КОН и  $P_2O_5$ . Спектры снимались на трехпризменном спектрографе с разрешением  $50 \text{ \AA} \text{ м.м}^{-1}$  при  $\lambda 6300 \text{ \AA}$ , причем входная щель устанавливалась достаточно широкой для размытия вращательной структуры. Полученные относительные интенсивности полос для упомянутых четырех способов возбуждения показывают, что в разряднике с полым катодом существуют наиболее благоприятные условия для появления полос с малыми квантовыми колебательными числами. Расчет эффективной колебательной  $t$ -ры по методу Пиллоу для этого случая приводит к значению  $1900^\circ \text{ К}$ . Предполагается, что определение  $t$ -ры по интенсивности исследуемой системы полос в спектре свечения ночного неба привело бы к величине того же порядка.

В. Дианов-Клоков

 $O_2^+$  $b^4\Sigma_g^- \rightarrow a^4\Pi_u$ 

Спектр

X-1964-4

3920

11

1963

$N_2^+$ ;  $NO^+$ ;  $N^+$ ;  $O_2^+$ ;  $O^+$  (A.P.)

Paulson J.T., Mosher R.L.  
Proc.Nat.Acad.Sci.India, 1963,  
A33, N 4, 522-529

Production of ...

J

I-3129

$O_2^+$  (1)

1963

Beniger S.

Etude du spectre de la molécule  
d'oxygène ionisée dans le proche  
infra-rouge. "J.phys.et radium", 1962,  
23, N 4, 225-237 (франс.)

PX., 1963, 3,  
5 81

10

$O_2^+$ 

Brion C. E.

Энергия

J. Chem. Phys., 1984, 40, 2995 (X: 10)

иониз.

Ионизация кислорода "мономо-

электрон.

энергетическими" электронами.

состояния

Определены ионизационные потенциалы

 $O_2$ :  $12,20 \pm 0,05$  ( $O_2^+$ ,  $^2\Pi_g$ ),  $16,24 \pm$  $\pm 0,03$  ( $O_2^+$ ,  $^4\Pi_u$ ),  $17,12 \pm 0,04$  ( $O_2^+$ , $^2\Pi_u$ ),  $18,40 \pm 0,03$  ( $O_2^+$ ,  $^4\Sigma_g^-$ ) и $21,29 \pm 0,04$    $26$  ( $O_2^+$ , ?), атакже константы взаимодействия  $O_2^+$  всостоянии  $^2\Pi_g$ :  $0,26 \pm 0,02$  (0-1),

$0,25 \pm 0,02 (1-2) \text{ и } 0,24 \pm 0,02 (2-3) .$


$O_2^-$  ( $D_0$  (corr. noci, vi)  $\bar{X}$  1618 (1964

$D_0(0-0)$  [ $b$   $H_2O_2$ ,  $O_2^+$ ,  $O_2$ ]

Creighton J. A., Lippincott E. R.,

J. Chem. Phys., 1964, 40, N6,

1779-80





$O_2^+$

Gilmore F.R.

1964

Krushee  
noting.  
sheep

Contract AF 49(638)-700.

Potential energy curves for  
 $N_2$ ,  $NO$ ,  $O_2$  and corresponding  
ions.

(see  $N_2$ )

$O_2^+$

спектр

1964  
6 Д181. Спектры  $O_2$  при соударениях с  $H^+$ . Hughes R. H., Ng D. K. W. Spectra induced by  $H^+$  impact on  $O_2$ . «Phys. Rev.», 1964, 136, № 5A, 1222—1224 (англ.)

Исследованы спектры испускания молекул  $O_2$  при возбуждении соударениями с ионами  $H^+$  (энергия 5—130 кэВ). В спектре обнаружены серии испускания  $O_2^+$  и  $O^+$  и бальмеровская серия водорода. Определены поперечные сечения соударений ( $\sigma$ ) для полос (0,0), (0,1), (1,0), (2,0), (3,1) и (2,1) перехода  $b^4\Sigma - a^4\Pi$ . Дана оценка значений  $\sigma$  для заселения уровней  $v=0-3$  состояния  $b^4\Sigma$  иона  $O_2^+$ . Также определены величины  $\sigma$  для возбуждения некоторых линий OII.

ф. 1965. 68

1964

O<sub>2</sub><sup>+</sup>nonferrous  
ceramics  
hydrogen

Spectra induced by H<sup>+</sup> impact on O<sub>2</sub>. R. H. Hughes and D. K. W. Ng. (Univ. of Arkansas, Fayetteville). *Phys. Rev.* 136(5A), 1222-4(1964)(Eng). Spectra induced by 5- to 130-kev. H<sup>+</sup> impact on O were observed in the visible region. Principal features are O<sub>2</sub><sup>+</sup>, O<sup>+</sup>, and H Balmer emissions. Abs. cross sections were detd. for excitation of the (0,0), (0,1), (1,0), (2,0), (3,1), and (2,1) bands of the  $b^4\Sigma - a^4\Pi$  first neg. system of O<sub>2</sub><sup>+</sup>. Cross sections for populating the  $v = 0, 1, 2$ , and 3 levels of the  $b^4\Sigma$  state of O<sub>2</sub><sup>+</sup> were estd. Cross sections for exciting some O II were detd. RCPJ

C.A. 1965. 62. 2

1222g

1964

$O_2^+$

Knot H., Majon E.A.,  
Vanderslice J.T.

поиски  
кривые

J. Chem. Phys., 1964, 40, 3548 (NR)

Взаимодействие жерний, по-  
перечные сечения обмена  
зарядов и поперечные сече-  
ния диффузии для  
создае   $N^+ - N$  и  
☒  $O^+ - O$  (см.  $N_2^+$ )

O<sub>2</sub><sup>+</sup>

вып. 5212 / в числе  
Ковалес)

1964

Ковалес Т.

Acta Phys. Acad. Sci. Hung.  
1964, XVII, вып. 1-2, 67-74.

Некоторые новые  
исследования  
молекул

результаты спектроскопических  
исследований

J. W. McCowan, E. M. Clarke,  
H. P. Hanson, E. F. Stebbings

Mem.

Phys. Rev. Letters 1964, 13, 620

BP

$O^+$   
2, M. N., I. P.

1964


21 Б47. Стабильность двухатомных кислородных образований. Tuck D. G. The stabilities of diatomic oxygen species. «J. Inorg. and Nucl. Chem.», 1964, 26, № 9, 1525—1530 (англ.)

Рассмотрены следующие двухатомные образования из атомов кислорода:  $O_2^+$ ,  $O_2$ ,  $O_2^-$  и  $O_2^{2-}$ . Длины связей в этих мол. ионах соответственно равны 1,123; 1,207; 1,29 и 1,49 А. Энергии диссоциации этих же образований в том же порядке равны 149, 118, 84 и —125 ккал/моль; резкое уменьшение энергии связи вызвано увеличением антисвязывающего характера в этом ряду. Рассмотрены также геометрич. характеристики неорганич. соединений, содержащих пероксигруппы, координированные вокруг поливалентных атомов хрома и кобальта. В этих координационных соединениях связь О—О имеет длину 1,40—1,45 А. Обсуждается природа связи в таких соединениях с позиций донорно-акцепторных представлений.

С. Бацанов

X.1965.21

X



1964

The stabilities of diatomic oxygen species. D. G. Tuck (Univ. Nottingham, Engl.). *J. Inorg. Nucl. Chem.* 26(9), 1525-30 (1964). The bond lengths in the species  $O_2^+$ ,  $O_2$ ,  $O_2^-$ , and  $O_2^{2-}$  are discussed in terms of the bonding. Values are derived for  $O_2^-$  and  $O_2^{2-}$ . The significance of this information in the formulation of inorg. complexes contg. such O species is discussed.

RCJX

gamm  
Coryus

(+1/2 u.f.)

C. A. 1964 by N-7 77212





Cairns R.B., Samson J.A.R.

Kogel K.C.

Phys. Rev. 1965, 139, A 1403

209

~~1965~~  $O_2^+$  (m.x.)

$O_2$ ;  $O_2^+$  ( $\xi_i, w_i$ )  $\bar{x}$  1606 1965

Codling K., Madden R. P.,  
J. Chem. Phys., 1965, 42, N11,  
3935-38

W

PX66

$O_2^+$

Chupp

Dufay M., Druetta M., 1965  
Bidelberg M.

C.R. Acad. Sci., 260, 1123.

sur la luminescence de  
l'oxygene excitee par choc  
de particules accelerees sous  
500 KeV.

$O_2^+$

3167

клетке  
номера  
мере

Gilmore F.R.

1965

Y. Quant. Spectrosc.  
and Radiat. Transfer,  
1965, 5, 12, 369.

(Cu.  $N_2$ ) III

$O_2^+$

Fridge 82.

1965

Weissler, G. L. (1965)

(USC-Vac UV-105, AD-631432)

Fluorescence spectra of the  
molecular ion  $O_2^+$ ,  $N_2^+$   
and  $CO^+$  excited by vacuum  
ultraviolet radiation

+2

NOB-27632 STAR

11

$O_2^+$

amm. 4556

1965

(Myzophora)

Kovacs J.

Rev. Roum. chimie  
1965, 10, 1173-81

Rotational fine structure of...

(Blank Kovacs)

$O_2^+$

Nicholls R. W.

1965

(~~from~~)

Can. J. Phys., 43(7), 1390-4.

Franck-Condon factors for  
the  $O_2^+$  first and second  
negative band systems.

XI-2163

1966

10 Б77. Масс-спектрометрическое изучение фотоионизации молекул. Brehm, Burkhard. Massenspektrometrische Untersuchung der Photoionisation von Molekülen. «Z. Naturforsch.», 1966, 21a, № 3, 196—209 (нем.)

При 27° изучена зависимость относительных поперечных сечений ионизации Xe, Hg, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O, D<sub>2</sub>O, C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>, C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>, C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>, CH<sub>4</sub> и C<sub>7</sub>H<sub>16</sub> при энергиях фотонов 7,5—14,5 эв. Разрешающая способность монохроматора  $\Delta\lambda=1$  Å. Определены потенциалы ионизации (точность  $\pm 0,005$  эв) O<sub>2</sub><sup>+</sup> (12,078), H<sub>2</sub>O<sup>+</sup> (12,614), D<sub>2</sub>O<sup>+</sup> (12,637), C<sub>2</sub>H<sub>2</sub><sup>+</sup> (11,400), C<sub>2</sub>H<sub>4</sub><sup>+</sup> (10,511), C<sub>4</sub>H<sub>6</sub><sup>+</sup> (9,075), C<sub>6</sub>H<sub>6</sub><sup>+</sup> (9,246) и C<sub>7</sub>H<sub>16</sub><sup>+</sup> (9,09 ± 0,05). Рассчитаны частоты сим. вал. и деф. кол. H<sub>2</sub>O и D<sub>2</sub>O, а также сим. вал. кол. свя-

х. 1967. 10



зи  $C-C$  в  $C_2H_2$  и  $C_2H_4$ . Для соединений  $C_2H_4$ ,  $C_4H_6$ ,  $C_6H_6$  и  $C_7H_{16}$  рассчитаны потенциалы появления основных фрагментарных ионов. Показано, что в случае  $C_4H_6$  потенциалы появления фрагментарных ионов отличаются на 0,4—0,55 эв при изменении  $t$ -ры от 27 до 327°. Для метана таких различий не наблюдается. Для  $C_2H_6$  определены потенциалы ионизации при 27, 187 и 327°; показано, что с повышением  $t$ -ры потенциал ионизации бензола незначительно уменьшается.

Б. Розынов

O<sub>2</sub><sup>+</sup>(J) 7 XI 987 (1966)

Chem. and Engng News,  
1966, 44, N23; 44-46

20

(4)

$O_2^+$   
2

ХТ-165

1966

10 Г60. Ионизация кислорода электронами. Колебательные электронные уровни  $O_2^+$ . Emma V. Ionizzazione dell'ossigeno per urto elettronico. Livelli elettronici e vibrazionali dell' $O_2^+$ . «Boll. sedute Accad. Gioenia sci. natur. Catania», 1966, 8, № 10, 742—752 (итал.; рез. франц., англ., нем.)

С помощью масс-спектрометра, снабженного ионным источником Фокса, получены кривые ионизации  $O_2$  электронным ударом при энергии электронов до 21 эв. Определены энергии первых четырех электронных уровней иона  $O_2^+$  и первых трех колебательных уровней  $O_2^+(^2\pi_g)$ . Измеренное сечение ионизации  $O_2^+$  при энергии  $>4$  эв над порогом меньше, чем полученные другими авторами, но находится в лучшем согласии с рассчитанным сечением.

Резюме

09.1968 10 P

$O_2^+$

1966

19 Б118. Определение относительных вероятностей колебательных переходов для первой отрицательной системы  $O_2^+$ . Druetta M., Dufay M. Determination of  $O_2^+$  first negative system relative vibrational transition probabilities. «Prys. Letters», 1966, 23, № 3, 239—240 (англ.)

Проведен расчет г-центроидов для системы  $^4\Sigma_g^- \rightarrow ^4\Pi_u O_2^+$  и определены относительные вероятности колебательных переходов. Резюме

атмосфер.  
вероятности  
колебательных  
переходов

x. 1967. 19

1966

 $O_2^+$ Reproduced  
referred

23753z Determination of  $O_2^+$  first negative system relative vibrational transition probabilities. M. Druetta and M. Dufay (Fac. Sci., Lyons, France). *Phys. Lett.* 23(3), 239-40(1966) (Eng). A calcn. of  $O_2^+ {}^4\Sigma_g^- \rightarrow {}^4\Pi_u$  system  $r$ -centroids and a detn. of relative vibration transition probabilities are given. BGJN

C.A. 1967. 66.6

1966

0<sup>+</sup>  
2

р 6 Д215. Новые отнесения во второй отрицательной системе кислорода, Linton C. New identifications in the oxygen second negative system. «Nature» (Engl.), 1966, 212, № 5068, 1358 (англ.)

Si

С помощью фотоаграфич. техники исследована вторая отрицат. система полос кислорода, возбужденная в разряде, в области 1900—6500 Å. Обнаружен ряд новых полос и выполнено их отнесение; определены интегр. интенсивности полос. Приведено также новое отождествление для некоторых известных полос. Отмечено хорошее согласие с вычисленными значениями частот. Библ. 8.  
С. Бурейко

09. 1967. 62

1966

O<sub>2</sub>

14 Б186. Новые отнесения во второй отрицательной системе полос кислорода. Linton C. New identifications in the oxygen second negative system. «Nature» (Engl.), 1966, 212, № 5068, 1358 (англ.)

С помощью фотографич. техники исследована вторая отрицательная система полос кислорода, возбужденная в разряде, в области 1900—6500 Å. Обнаружен ряд новых полос и выполнено их отнесение; определены интегральные интенсивности полос. Приведено также новое отождествление для некоторых известных полос. Отмечено хорошее согласие с вычисленными значениями частот.

С. Бурейко

X. 1967. 14

1966

O<sub>2</sub>

42055q New identifications in the O<sub>2</sub> second negative system. C. Linton (Imp. Coll., London). *Nature* 212(5068), 1358 (1966)(Eng). The O<sub>2</sub> 2nd negative band system is a result of the transition  $A^2\Pi_u - X^2\Pi_g$ . Several bands are reported which have not been reported previously and also the reassignment of vibrational quantum nos. and wavelengths for a few known bands.

Walter Wagner

C.A. 1967-66.10



1966

 $O_2^+$ 

функции  
возбуждения  
электронный  
удар.

11 Д104. Измерение функций возбуждения полос первой отрицательной системы  $O_2^+$  электронным ударом. Nishimura Hiroyuki. Measurement of the excitation function of  $O_2^+$  first negative bands by electron impact. «J. Phys. Soc. Japan», 1966, 21, № 5, 1018—1019 (англ.)

Измерены ф-ции возбуждения полос (0,0), (1,0), (1,1), (2,1) и (5,3) 1-й отрицат. системы  $O_2^+ (^4\Sigma_g^+ \rightarrow ^4\Pi_u)$  при бомбардировке  $O_2$  электронами с энергией  $E=100-1500$  эв). Абс. величины сечений возбуждения  $\sigma_b$  определялись путем сравнения с  $\sigma_b$  полосы (0,0) 1-й отрицат. системы  $N_2^+$  ( $\lambda$  3914 Å). Найденные величины  $\sigma_b$  пропорциональны сечениям ионизации  $\sigma_u$   $O_2$ . Значения  $\sigma_b$  полос (2,1) и (1,1) составляют соответственно 0,26 и 0,14% от  $\sigma_u$ .

В. Скурат

ф. 1966. 112

Samson J. A. R.  
Cairns R. B.

Men.

J. Opt. Soc. America,  
1966, 56, 769

30.

$O_2^+$ , M.N. I.P.,  $D_0$

$O_2^+$

M 1637

1966

7 Б23. Кривые потенциальной энергии для  $O_2^+$ ,  $N_2^+$  и  $CO^+$ . Singh R an B., Rai D. K. Potential-energy curves for  $O_2^+$ ,  $N_2^+$ , and  $CO^+$ . «J. Molec. Spectrosc.», 1966, 19, № 4, 424—434 (англ.)

Методом Клейна — Ридберга — Риса построены потенциальные кривые ряда электронных состояний двухатомных ионов  $O_2^+$ ,  $N_2^+$  и  $CO^+$ . Предсказано возмущение  $A^2\Pi$ -состояния  $CO^+$ , обусловленное пересечением с основным термом  $X^2\Sigma$  при  $R \sim 1,48 \text{ \AA}$ . С точки зрения полученных результатов обсуждаются известные возмущения в спектрах  $N_2^+$ .  
Е. Никитин

X. 1967. 7

☒

M 1637

1966

0<sup>+</sup>  
.2

1 Д87. Кривые потенциальной энергии для  $O_2^+$ ,  $N_2^+$  и  $CO^+$ . Singh Ran B., Rai D. K. Potential-energy curves for  $O_2^+$ ,  $N_2^+$ , and  $CO^+$ . «J. Molec. Spectrosc.», 1966, 19, № 4, 424—434 (англ.)

Методом Ридберга — Клейна — Риса — Вандерслайка построены эксперим. кривые потенц. энергии для двухатомных молекул  $O_2^+$ ,  $N_2^+$  и  $CO^+$  в различных электронных состояниях. Показано, что для  $CO^+$  колебательные уровни состояния  $X^2\Sigma$  приводят к возмущению колебательных уровней состояния  $A^2\Pi$ . В случае молекулы  $O_2^+$  подобных возмущений не происходит. Для спектра  $N_2^+$  имеет место большое число возмущений как в  $X^2\Sigma_g^-$ , так и в  $B^2\Sigma_u$ -состояниях. В частности, возмущения в состоянии  $B^2\Sigma_u$  связаны с взаимодействием с состояниями  $C^2\Sigma_u$  или  $D^2\Pi_g$ . В. Савельев

ch. 1966. 12

7

M 1637

1966

7 Б23. Кривые потенциальной энергии для  $O_2^+$ ,  $N_2^+$  и  $CO^+$ . Singh R a n B., Rai D. K. Potential-energy curves for  $O_2^+$ ,  $N_2^+$ , and  $CO^+$ . «J. Molec. Spectrosc.», 1966, 19, № 4, 424—434 (англ.)

Методом Клейна — Ридберга — Риса построены потенциальные кривые ряда электронных состояний двухатомных ионов  $O_2^+$ ,  $N_2^+$  и  $CO^+$ . Предсказано возмущение  $A^2\Pi$ -состояния  $CO^+$ , обусловленное пересечением с основным термом  $X^2\Sigma$  при  $R \sim 1,48$  А. С точки зрения полученных результатов обсуждаются известные возмущения в спектрах  $N_2^+$ .

Е. Никитин

x. 1967. 7



M 1637

1966

Potential-energy curves for  $O_2^+$ ,  $N_2^+$ , and  $CO^+$ . Ran B. Singh and D. K. Rai (Hindu Univ., Banaras, India). *J. Mol. Spectry.* 19(4), 424-34(1966)(Eng). Exptl. potential energy curves have been constructed for the molecules  $O_2^+$ ,  $N_2^+$ , and  $CO^+$  by the Rydberg-Klein-Rees-Vanderslice method. Perturbations in the  $A^2\Pi$  state of  $CO^+$  were predicted due to the  $X^2\Sigma^+$  state and the observed perturbations in the case of  $N_2^+$  were discussed. RCKP

given nagerus. Ingu)

(+ 2um)

C.A. 1966. 65.1

46a



O<sub>2</sub><sup>+</sup>

Turner D. W.  
May A. P.

1966

J. Chem. Phys., 45, N2, 471.

Факторы фланка - Кондо-  
на в полимеризации: экс-  
периментальные измерения

с использованием молекулярной фотоспектральной спектроскопии.

(см.  $N_2^+$ )



23 Б73. Новый метод, позволяющий определить потенциал ионизации  $O_2^+$ . Упрощенная техника, позволяющая широко применять масс-спектрометрию для исследования структуры органических ионов.— New method gives ionization potential of  $O_2^+$ . «Chem. and Engng News», 1966, 44, № 23, 44, 46 (англ.)

Предлагается для определения потенциалов ионизации использовать метод разниц энергий распределения, в котором вместо получения кривых вероятности ионизации предложено получать зависимость  $\Delta I(V)$ , где  $\Delta I$  — разность двух ионных токов, из которых один получен в результате ионизации  $N$ -электронами при ускоряющем напряжении  $V$ , а другой —  $b \cdot N$ -электронами при несколько большем напряжении  $V'$ . Использование такой методики позволяет исключить значительный термич. разброс энергий электронов и позволяет, не модифицируя прибора, получать результаты, близкие к результатам, получаемым при использовании моноэнергетич. пучка электронов.

Б. В. Розынов

Х. 1967

O<sub>2</sub><sup>+</sup> (Do)

O<sub>2</sub> (Y, Do, Ae-) XI 2281 1966

Samson J.A.R., Cairns R.B.

J. Opt Soc. America, 1966, 56, 769-775  
(2cm)

Ionization potential of O<sub>2</sub>

EX-100-10000

Proc. Phys., 1966, 12 D 195-

W

φ

$O_2^+$

1987

2 Д103. Электронная структура простых двухатомных молекул. Kayama Kunifusa, Ishiguro Eiichi. Electronic structure of the simple diatomic molecules. «Progr. Theoret. Phys. Suppl.», 1967, № 40, 20—36 (англ.)

Обзор работ Котани и его группы по теории простых двухатомных молекул. Исследуются основные  $^2\Pi_g$ - и возбужденные  $^2\Pi_u$ -состояния ионизованной молекулы  $O_2^+$ . Каждое электронное состояние обладает определенной конфигурацией и может быть описано соответствующей волн. ф-цией, сконструированной по методу МО ЛКАО слейтеровского типа. Каждая конфигурация  $^2\Pi_u$ -состояний оценивается по обменному взаимодействию для  $\pi$ -электронов и по силам осцилляторов для перехода в основное состояние. Приведены матричные элементы га-

(Обзор  
работ  
Котани)

ср. 1968. 28



милтоннана для  $^2\Pi_u$ -состояний. Волн. ф-ции данных конфигураций выражаются далее через члены с волн. ф-циями МО для  $\sigma$ -электронов и волн. ф-циями валентной связи (ВС) для  $\pi$ -электронов. Вычислены статистич. веса и собств. значения энергии для трех наборов слейтеровских параметров как в МО, так и в приближении ВС. Показано, что вклад поинной структуры в первые два низшие возбужденные состояния мал, а в третье очень высок. Объясняется расхождение между эксперим. и теоретич. значением  $g$ -фактора для молекулы  $O_2$ . Авторы считают, что расхождение обязано примесью

$^1\Pi_g^+$ -состояния к основному  $^3\Pi_g^-$ -состоянию и учетом релятивистских спин-орбитального и спин-диполь-дипольного взаимодействий. Соответствующие вычисления дают полное согласие с экспериментом. Библ. 50.  
Е. П. Гордеев

$O_2^+$

Bp-248-IX 1967

Segal G. A.

$Ue^-$ ; счл.  
носі.

J. Chem. Phys.,  
1967, 47 N5


1876-77

Og<sup>+</sup>

Sprohr R., Puttkamer 8. 1947

Z. Naturforsch., 22a, n. 5,  
705.

Измерение кинетической энер-  
гии фотоземитронов и фанто-  
ры Франка-Кондона для ко-  
лебательных переходов непо-  
торых молекулярных ионов  
(см. H<sub>2</sub><sup>+</sup>) III



Zyl B.V., Dunn G.H. 1967

Phys. Rev., 163 (1), 43-5.

Dissociation of  $\text{N}_2^+$  and  
 $\text{O}_2^+$  by electron impact.

(see  $\text{N}_2^+$ )



$O_2^+$

$O_2^-$

$= 12,059 \pm 0,00126$

bruno

$12,063 \pm 0,00126$

Asundi R.K.

1969/69.

Current Sci (India),  
37, 160, 1968

J. Ch. Ph., 1969, 51, 14, 1667

Albritton G.L.  
Schneidekopf A. A.

Zare R.N.



asundi B.K.

Mem.

Current Sci (India)  
1968, 37, 160

9

$O_2^+$  m.n.,  $Do$

$O_2^+$ 

спектр  
испускания  
 $D_0$ ,  $IP$

5 D276. Изотопный сдвиг вторых отрицательных по-  
лос  $O_2^+$ . Bhale G. L., Ramakoteswara Rao P.  
Isotope shifts in the second negative bands of  $O_2^+$ . «Proc.  
Indian Acad. Sci.», 1968. A67, № 6, 350—357. (англ.)

В спектре испускания  $O_2^+$  исследована вторая отрицат.  
система ( $A^2\Pi_u - X^2\Pi_g$ ) в области 5000—1850 Å, возбуж-  
денная микроволн. разрядом при давлениях  $O_2$   
~0,1 мм рт. ст. Для измерения изотопич. сдвигов ис-  
пользовался кислород с содержанием  $O^{18}$  до 60%. На  
основании измеренных изотопич. сдвигов  $\Delta\nu(^{16}O_2^+ -$   
 $-^{16}O^{18}O^+)$  и  $\Delta\nu(^{16}O_2^+ - ^{18}O_2^+)$  для голов полос уточне-  
ны значения колебательных чисел  $\nu''$  и  $\nu'$  и получены  
новые значения некоторых постоянных для  $O_2^+$  в основ-  
ном состоянии  $X^2\Pi_g$ :  $\omega_e = 1903,85 \text{ см}^{-1}$ ,  $\chi_e\omega_e = 16,18 \text{ см}^{-1}$ ,  
 $B_e = 1,6920 \text{ см}^{-1}$ ,  $r_e = 1,1161 \text{ Å}$ . На основании исследования  
системы вблизи предела диссоциации получены значения  
энергии диссоциации  $D_0(O_2^+, \Pi_g)$  и потенциала иониза-  
ции  $IP(O_2^+, \Sigma_g^-)$ ; обсуждены методы получения этих  
величин и возможные погрешности методов. Приведены  
спектры. Библ. 11.

Резюме

ф. 1969-58

1968

48  
X-11

1968

 $O_2^+$ 

e. n.

111757w Isotope shifts in the second negative band of  $O_2^+$  [molecular oxygen positive ions]. Bhale, G. L.; Rao, P. Ramakoteswara (Spectroscopy Div., Bhabha At. Res. Centre, Trombay, India). *Proc. Indian Acad. Sci., Sect. A* 1968, 67(6), 350-7 (Eng). The 2nd neg. bands of  $O_2^+$  in the 1500-5000-A. region were photographed. By using  $^{18}O$  enriched  $O_2$ , it was found that the  $\nu''$  numbering was increased by 1 unit, while the  $\nu'$  numbering was unchanged. These results lead to the following revised rotational, and vibrational consts. in the  $X^2\pi_g$  ground state of  $O_2^+$ :  $\omega_e = 1903.85 \text{ cm.}^{-1}$ ,  $\omega_e x_e = 16.18 \text{ cm.}^{-1}$ ,  $\beta_e = 1.6920 \text{ cm.}^{-1}$ , and  $r_e = 1.1161 \text{ A.}$  Keith D. Root

C. A. 1968. 69. 26

X1-48

$O_2^+$

BQ-A 1158

1968

Empedocles P.

cum. noem.

Theor. chim. Acta 1968,  
10 (4), 331-6.

0.7  
2

12 Д295: Определение сечений возбуждения некоторых полос  $O_2^+$  методом пересекающихся пучков. Король В. И., Кишко С. М., Скубенич В. В. Визначення перерізів збудження деяких смуг  $O_2^+$  методом пересічних пучків. «Укр. фіз. ж.», 1968, 13, № 7, 1220—1222 (укр.); «Укр. фіз. ж.», 1968, 13, № 7, 1225—1226 (русск.)

Описан метод получения интенсивного молекулярного пучка  $O_2^+$ , возбуждение его спектра излучения медленными электронами и определены значения сечений возбуждения некоторых полос первой и второй отрицат. систем  $O_2^+$ , лежащих в спектральном диапазоне 5632—2890 Å. Значения сечений, полученные при концентрации молекул в пучке  $1,16 \cdot 10 \text{ см}^{-3}$  и энергии возбуждающих электронов 50 эв, лежат в пределах от  $0,268 \cdot 10^{-19}$  до  $5,36 \cdot 10^{-19} \text{ см}^2$ .

Автореферат

ф. 1968. 12 А

1968

 $O_2^+$ 

24425p Experimental evidence for high vibrational excitation in  $O_2^+$  ground state by photoelectron spectroscopy. Natalis, P.; Collin, J. E. (Univ. Liege, Liege, Belg.). *Chem. Phys. Lett.* 1968, 2(6), 414-16 (Eng). Photoelectron spectra of  $O_2$  were obtained by using 584-A. photons produced in a He discharge and 736-744-A. photons in a Ne discharge. The vibrational structure of  $O_2^+$  ( $X^2\Pi_g$ ) ground state extends from 0-4 in the 1st case to 0-20 in the 2nd. The latter result cannot be explained on the basis of the Franck-Condon principle. JDJN

список  
воп. вопр.  
келх калед.  
упробней

C.A. 1969. 70.6

X1-376

$O_2^+$

1968

9 Б114. Экспериментальное доказательство возбуждения высоких колебательных уровней основного состояния  $O_2^+$ , полученное методами фотоэлектронной спектроскопии. Natalis P., Collin J. E. Experimental evidence for high vibrational excitation in  $O_2^+$  ground state by photoelectron spectroscopy. «Chem. Phys. Letters», 1968, 2, № 6, 414—416 (англ.)

Получены спектры фотоэлектронов молек. кислорода  $O_2$  при возбуждении фотонами с длиной волны 584 А (разряд в гелии) и 736—744А (разряд в неоне). В первом случае, в согласии с данными др. авторов, наблюдается возбуждение колебательных уровней до  $V'=4$  основного состояния  $X^3\Pi_g O_2^+$ , к-рое по крайней мере качественно подчиняется правилу Франка—Кондона. Во втором случае на фотоэлектронном спектре обнаруживаются не только пики, относящиеся к колебательным

975-14  
X1-376

X-1969. 9

уровням вплоть до  $V'=20$  состояния  $X^3\Pi_g$ , но и относимые к колебаниям во втором ионном состоянии  $O_2^+(a^4\Pi_u)$ . Этот факт не удается объяснить на основе принципа Франка — Кондона, поскольку согласно современным данным о потенциальных кривых для  $O_2X^3\Sigma_g^-$  и  $O_2^+X^2\Pi_g$  вероятность переходов при  $V''=0 \rightarrow V' \geq 5$  должна быть ничтожно мала.

В. Дианов-Клоков



1968

O<sub>2</sub><sup>+</sup>

спектр

7 Д285. Применение фотоэлектронной спектроскопии для экспериментального доказательства колебательного возбуждения на высокие уровни в основном состоянии O<sub>2</sub><sup>+</sup>. Natalis P., Collin J. E. Experimental evidence for high vibrational excitation in O<sub>2</sub><sup>+</sup> ground state by photoelectron spectroscopy. «Chem. Phys. Letters», 1968, 2, № 6, 414—416 (англ.)

В области 11—17 эв изучены фотоэлектронные спектры кислорода, возбужденные гелиевым ( $\lambda=584 \text{ \AA}$ ) и неоновым ( $\lambda=736\text{—}744 \text{ \AA}$ ) разрядами. Показано, что имеет место образование возбужденного молекулярного иона O<sub>2</sub><sup>+</sup> по реакции O<sub>2</sub>(X<sup>3</sup>Σ<sub>g</sub><sup>-</sup>, v''=0)→O<sub>2</sub><sup>+</sup>(X<sup>2</sup>Π<sub>g</sub>, v'=n). Обнаружены переходы с возбужденных уровней v'=0—4 при гелиевом возбуждении и v'=0—20 при неоновом; последнее не согласуется с принципом Франка—Кондона. Предположено, что принцип Франка—Кондона не применим к фотоионизационным процессам, зависящим от энергии падающих фотонов. Библ. 6. С. Ф. Б.

376

X/1

ф. 1969. 78

1968

2 Д288. Ридберговские серии Танака — Такамина молекулы  $O_2$ . Ogawa Masaru. Tanaka — Takamine Rydberg series of  $O_2$ . «Canad. J. Phys.», 1968, 46, № 4, 312—313 (англ.)

Изучены ридберговские серии Танака — Такамина в спектре поглощения молекулы  $O_2$  в вакуумной УФ-области (600—1000 Å). Наблюдавшиеся частоты отнесены к переходам из основного  $X^3\Sigma_g^-$  в верхнее состояние  $^3\Pi_u$  молекулы. Получены значения частот членов серий  $v'=0$  до  $n=10$ ,  $v'=1$  до  $n=12$ ,  $v'=2$  до  $n=13$ ; обнаружена новая прогрессия  $v'=3$  и приведены частоты входящих в нее линий с  $n=3 \div 9$ . Найлены новые, уточненные значения сериальных пределов:  $163\,720\text{ см}^{-1}$  для  $v'=0$ ;  $164\,830\text{ см}^{-1}$  для  $v'=1$ ;  $165\,900\text{ см}^{-1}$  для  $v'=2$ . Новая серия  $v'=3$  сходится к пределу при  $166\,925 \pm \pm 10\text{ см}^{-1}$ . Значения колебательных констант  $O_2^+$  найдены равными:  $\omega_e = 1154\text{ см}^{-1}$ ;  $\omega_e x_e = 21,5\text{ см}^{-1}$ . Библ. 5.

С. Ф. Б.

спектр

(л.п.)

09. 1969. 29

$O_2^+$

Rothe R. S.

1968

McLara R. J.

U.S. At. Energy Comm.,  
CAZ-TR-165, 70 pp.

свер

(all.  $N_2$ ) III

I968



Shamir, Binenboym, Claassen

J. Amer. Chem. Soc., 90, 6223

The vibrational frequency of  
the  $\text{O}_2^+$  cation.

1968

 $O_2^+$ 

Culicij

69741j Excitation of molecular oxygen by low-energy electrons. Skubenich, V. V. (USSR). *Opt. Spektrosk.* 1968, 25(1), 169-70 (Russ). The abs. excitation cross section of bands belonging to the 1st ( $b^4\Sigma_g^- \rightarrow a^4\Pi_g$ ) and 2nd ( $A^2\Pi_g \rightarrow X^2\Pi_g$ ) neg. systems of  $O_2^+$  were measured in the energy range 20-160 ev. A max. was observed at  $\sim 80-100$  ev. G. Thiot

C.A. 1968. 69:18

Turner D. W.

Mem.

Proc. Roy Soc. A, 1968, 307, 15

22

O<sup>+</sup>  
2, cc. n., I.P.

Yoshino K., Tanaka Y. (1968)

Yoshino K.

J. Chem. Phys. 1968, 48, 4859

207

~~IP (O<sub>2</sub>)~~ O<sub>2</sub><sup>+</sup> (m.x.)



$O_2^+$

XI-8

1969

6 Б137. Аргумент в пользу изменения нумерации колебательных уровней основного состояния  $^2\pi_g$  иона  $O_2^+$ . Albritton D. L., Schmeltekopf A. L., Zare R. N. Evidence in support of the vibrational renumbering of the  $O_2^+ ^2\pi_g$  ground state. «J. Chem. Phys.», 1969, 51, № 4, 1667—1668 (англ.)

Измерены и рассчитаны относит. интенсивности ряда полос системы  $A^2\pi_u - X^2\pi_g$  иона  $O_2^+$ . Расчет проведен в предположении принятой нумерации колебат. уровней состояния  $X^2\pi_g$ , а также с увеличением этой нумерации на 1 и на 2. Наилучшее совпадение с экспериментом дает 2-й вариант расчета. Д. И. Катаев

8;

X. 1970. 6



O<sub>2</sub><sup>+</sup>  
2

XI-8

1969

94853w Evidence in support of the vibrational renumbering of the O<sub>2</sub><sup>+</sup> <sup>2</sup>Π<sub>g</sub> ground state. Albritton, D. L.; Schmeltekopf, A. L.; Zare, R. N. (ESSA Res. Lab., Boulder, Colo.). *J. Chem. Phys.* 1969, 51(4), 1667-8 (Eng). By using the Franck-Condon factors of D. L. Albritton, *et al.* (to be published), intensity arrays were calcd. for the O<sub>2</sub><sup>+</sup> A<sup>2</sup>Π<sub>u</sub>-X<sup>2</sup>Π<sub>g</sub> 2nd neg. system by using the classic vibrational numbering system of the ground state of O<sub>2</sub><sup>+</sup>, by using the numbering system proposed by R. K. Asundi (1968) which consists in the former numbering system increased by 1 unit, and the classic numbering system increased by 2 units. Comparison of calcd. intensities with measured relative intensities (excited by a 5-kv. electron beam) indicate that the Asundi numbering system is superior to either of the other 2 systems. Consequences of renumbering on literature data for O<sub>2</sub><sup>+</sup> are discussed.

FBJN

C. A. 1969. 71. 20

$O_2^+$

сискор

Asundi R. K.

Ramachandrarao Ch. V. S

Chem. Phys. Letters, 4(2),  
89.

Исправленные факторы  
Франка-Кондона для  
низкого вращательного пе-  
рехода  $O_2$  и вторая

1969

отрицательная сис-  
тема полюс  $O_2^+$

(см.  $O_2$ ) III  
вероят.  
переходов

$O_2^+$

XI-156

1969

фотоионизация

2 Б24. Фотоионизация  $\pi$ -электронов в  $O_2$ . Dixon R. N., Hull S. E. The photo-ionization of  $\pi$ -electrons from  $O_2$ . «Chem. Phys. Letters», 1969, 3, № 6, 367—370 (англ.)

Представлены результаты квантовомех. расчетов состояний  $O_2^+$ , возникающую из конфигураций  $\dots(\pi_u)^3(\pi_g)^2$ . Полученные данные объясняют отсутствие заметной ионизации  $O_2$  в  $A^2$ ,  $\Pi_g$ -состояние иона  $O_2^+$  при облучении фотонами 21,21 эв. Новое состояние в  $O_2^+$ , наблюдаемое при облучении  $O_2$  фотонами с  $\lambda=304$  А и соответствующее энергии ионизации  $\sim 23,7$  эв, отнесено к верхнему состоянию  $^2\Pi_u$  этой конфигурации. Резюме

см. также

+1

$O_2^+$



X. 1970. 2

Lindholm E.

Uese.

Arkiv fys. 1969, 40, 117

41

$O_2^+$ , ex. n., 1. P.

I969

$O_2^+$

McConkey J.W., Woolsey J.M.

J. Phys. B, 2, 529

Excitation of  $O_2^+$  bands by electron impact.

1970

 $O_2^+$ 

17 Б830. Исследование образования и реакция кластерных ионов  $O_2^+$ ,  $O_2^-$  и  $O^-$  с помощью поточной системы с послесвечением. Adams N. G., Bohme D. K., Dunkin D. B., Fehsenfeld F. C., Ferguson E. E. Flowing afterglow studies of formation and reactions of cluster ions of  $O_2^+$ ,  $O_2^-$ , and  $O^-$ . «J. Chem. Phys.», 1970, 52, № 6, 3133—3140 (англ.).

До-оценки

Исследованы р-ции типа  $\pm A + B + M \rightarrow A^\mp \cdot B + M$  и  $A^\mp \cdot B + C \rightarrow A^\mp \cdot C + B$ , где  $A^\mp = O_2^+$ ,  $O_2^-$ ,  $O$ ;  $B$ ,  $C = H_2$ ,  $N_2$ ,  $O_2$ ,  $CO_2$ ,  $N_2O$ ,  $SO_2$  и  $H_2O$  при 80, 200 и 300° K в области давл. 0,4—2 мм. Измерены константы скорости всех исследованных р-ций. Возможная ошибка составляет  $\pm 30\%$ . Приводятся оценки энергии диссоциации кластеров.

Л. Ю. Русин

X. 1970. 17



O<sub>2</sub><sup>+</sup>

1970

180y Excitation of O<sub>2</sub><sup>+</sup> first negative bands by electron impact on oxygen. Borst, Walter L.; Zipf, Edward C., Jr. (Dep. of Phys., Univ. of Pittsburgh, Pittsburgh, Pa.). *Phys. Rev. A* 1970, [3]1(5), 1410-15 (Eng). Abs. cross sections for the electron-impact excitation of the O<sub>2</sub><sup>+</sup> 1st neg. bands were measured from threshold to 400 eV and extrapolated to 1000 eV by means of a Bethe-Oppenheimer relation. The peak cross sections for the  $(n+1, n)$  and  $(n+2, n)$  sequences were  $5.30 \times 10^{-18} \text{ cm}^2 \pm 10\%$  and  $2.10 \times 10^{-18} \text{ cm}^2 \pm 10\%$  at 100 eV, resp. The cross sections for the (0, 0) and (1, 0) bands had a max. value of  $2.14 \times 10^{-18} \text{ cm}^2 \pm 15\%$  and  $4.33 \times 10^{-18} \pm 15\%$ , resp. The ratio of the total ionization cross section of O<sub>2</sub> to the excitation cross sections of the 1st neg. bands was nearly const. over the range 30-1000 eV; it had an av. value of 64 for the (1, 0) band. The lifetime of the  $\nu' = 1$  level of the  $b^4\Sigma_g^-$  state was  $1.19 \mu\text{sec} \pm 5\%$ .

RCPJ

Cherip

C.A. 1970. 73.2



$O_2 - O_{2n}^+$  ( $D_0, \Delta H^\circ, \Delta S^\circ$ )  $\bar{x} \pm 897$  1970  
 $n = 2, 3, 4, 5$

Conway D. C., Yanik G. S.,  
J. Chem. Phys., 1970, 53, No 5, 1859-  
- 66 (prev.)

Determination of the bond  
energies for the series  $O_2 - O_{2n}^+$   
through  $O_2 - O_{10}^+$  ( $O_2, O_2^+, O_4^+, O_6^+, O_8^+, O_{10}^+$ )  
J. Chem. Phys. 1970, 53, 1681-1689

$O_2^+$  (7) 11 XI 790 1970  
 $O_2(8i)$  Edqvist O., Lindholm E.,  
Selin L. E., Åström L.,

Phys. Scr., 1970, 1, n1, 25-30 (ann.)  
on the photoelectron spectrum  
of  $O_2$ .

Есть оригинал

Ри Хиш, 1970, 225191 20



1970

 $O_2^+$ 

22 Б191. Фотоэлектронный спектр  $O_2$ . Edqvist. O., Lindholm E., Selin L. E., Asbrink L. On the photoelectron spectrum of  $O_2$ . «Phys. scr.», 1970, 1, № 1, 25—30 (англ.)

В области 12—28 эв исследован фотоэлектронный спектр молек. кислорода при возбуждении линиями гелия 584 и 304 Å и измерены с высокой точностью состояния иона  $O_2^+$ . Определена энергия ионизации (17,045 эв) ранее ненаблюдавшегося  $A^2\Pi_u$ -состояния. Показано, что относит. интенсивность этого состояния хорошо согласуются с последними расчетами Диксона и Хала. Полученные результаты сопоставляются также со спектральными данными для второй отрицат. полосы системы  $A^2\Pi_u \rightarrow X^2\Pi_g$ .

О. Г. Гаркуша

фотоэлектронный  
спектр

X. 1970. 22

O<sub>2</sub>

фотоэлектронный  
спектр

ф. 1970.

112

11 Д551. О фотоэлектронном спектре O<sub>2</sub>. Edqvist O., Lindholm E., Selin L. E., Asbrink L. On the photoelectron spectrum of O<sub>2</sub>. «Phys. scr.», 1970, 1, № 1, 25—30 (англ.)

1970

Изучен фотоэлектронный спектр молекулярного кислорода в области 12—28 эв, при облучении линиями He I 584 Å и He II 304 Å. Использованный спектрометр со сферич. анализатором обладал высоким разрешением, что позволило выделить ранее не наблюдаемый уровень A<sup>2</sup>Π<sub>u</sub> с энергией ионизации 17,045 эв. Его относит. интенсивность находится в хорошем согласии с расчетной. Всего промерено 7 электронных состояний O<sub>2</sub><sup>+</sup>. В основном состоянии все колебательные уровни расщеплены на дублеты за счет спин-орбитального взаимодействия (23 мэв). В интервале энергий фотоэлектронов 25,5—28 эв, вызванных облучением линией He II 304 Å, наблюдается довольно интенсивное непрерывное поглощение, природу которого авторы не объясняют. Библ. 24. Ю. Н. Живлюк

(H)

✗

1970

 $O_2^+$ 

M. U.

J

0007074.

чек

(82167d) Photoelectron spectrum of molecular oxygen. Edqvist, O.; Lindholm, Einar; Selin, L. E.; Asbrink, L. (Phys. Dep., Roy. Inst. Technol., Stockholm, Swed.). *Phys. Scr.* 1970, 1(1), 25-30 (Eng). The photoelectron spectrum of mol. O has been studied in the 12-28-eV range with the 584- and 304-Å He lines, and the  $O_2^+$  states have been measured accurately. Due to the high resolu. of the app. it has been possible to observe the  $A^2\Pi_u$  state which has been considered as absent in photoelectron spectroscopy work. Its ionization energy is 17.045 eV. The present result is compared with spectroscopic observations of the 2nd neg. band system  $A^2\Pi_u \rightarrow X^2\Pi_g$ . The relative intensity of the  $A^2\Pi_u$  state is in good agreement with a recent calcn. by Dixon and Hull.

RCBBL

C. A. 1970. 73. 16

$O_2^+$

XI-695

1970

фотоэлектрон.  
спектр

1 9 Д337. Фотоэлектронные спектры  $O_2$ ,  $N_2$  и  $CO$ .  
Edqvist O., Lindholm E., Selin L. E., Asbrink L. The photoelectron spectra of  $O_2$ ,  $N_2$  and  $CO$ .  
«Phys. Letters», 1970, A 31, № 6, 292—293 (англ.)

В фотоэлектронном спектре кислорода наблюдается состояние  $A^2\Pi_u$  с энергией ионизации 17,045 эв. Его интенсивность составляет 1/6 от интенсивности соседнего состояния  $a^4\Pi_u$ . Установлено, что у иона азота в фотоэлектронном спектре отсутствует состояние  $C^2\Sigma_u^+$ . То же наблюдается и для соответствующего состояния  $CO^+$ . Обсуждаются правила, регулирующие появление различных уровней в фотоэлектронном спектре. Библ. 18.

А. Яковлева



Ф. 1970.92

X1-695

1970

 $O_2^+$ 

138016c Photoelectron spectra of oxygen, nitrogen, and carbon monoxide. Edqvist, O.; Lindholm, Einar; Selin, I. E.; Asbrink, L. (Phys. Dep., Roy. Inst. Technol., Stockholm, Swed.). *Phys. Lett. A* 1970, 31(6), 292-3 (Eng). The  $A^2\Pi_u$  state of  $O_2^+$  has been observed in the photoelectron spectrum of  $O_2$ . Its ionization energy is 17.045 eV. The intensity is only 1/6 of the intensity of the  $a^4\Pi_u$  state. The  $C^2\Sigma_u^+$  state of  $N_2^+$  does not appear in the photoelectron spectrum of  $N_2$  as is also the case with the corresponding state of  $CO^+$ . The rules for the appearance of ionic states in photoelectron spectroscopy are discussed.

RCTT

поисков.  
мекмп

C.A. 1970. 72. 26

(+2)

[X]

papers n.n. (C<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, N<sub>2</sub><sup>+</sup>, O<sub>2</sub>, <sup>1970</sup>  
11 13 14 O<sub>2</sub><sup>+</sup>, CO, CO<sup>+</sup>, NO, NO<sup>+</sup>)

Jain D.C., XI 1063

Int. J. Quant. Chem., 1970, 4, 579-586 (ann.)

A study of some potential energy  
functions for diatomic molecu-  
les.

Proc. X<sub>4</sub>, 1971, 11566 (P) 10

15343



02<sup>+</sup>

Линдхольм д. стрел

1970

Прог. стр. 1970.

и. н.

1, 1, 25

Осв. карт.  
у Туполева

март 1972

$O_2^+$

возбужд.;

конизация

Cade P. & et al.

1971

J. Chem. Phys., 54(8),  
3517.

(exc.  $O_2$ ) III

May 1972

$O_2^+$

спектр

7 Д336. Возбуждение состояния  $A^2\Pi_u$   $O_2^+$  при фотоионизации. Carlson R. W., Judge D. L. Photoionization excitation of the  $A^2\Pi_u$  state of  $O_2^+$ . «J. Chem. Phys.», 1971, 54, № 4, 1832—1833 (англ.)

Экспериментально подтверждено образование состояния  $A^2\Pi_u$  молекулярного иона  $O_2^+$  при фотоионизации. Для возбуждения первой отрицат. системы  $O_2^+$  (переход  $A^2\Pi_u - X^2\Pi_g$ ) использовался источник вакуумного УФ-излучения с монохроматором.; в спектре излучения в области 3200—6000 Å отождествлены канты полос системы  $A^2\Pi_u - X^2\Pi_g$ . Выделение линий ОIII  $\lambda = 702,332, 702,822, 702,899$  и  $703,850$  Å в ионизирующем излучении позволило исключить из рассмотрения образование  $O_2^+$  в состоянии  $A^2\Pi_u$  путем ассоциативной ионизации и каскадного заселения с верхних уровней. Для излучения в области 500—700 Å сечение фотоионизации кислорода в состояние  $A^2\Pi_u$  составляет  $4 \cdot 10^{-19}$  см<sup>2</sup>. Библ. 12. В. Александров

09. 1981. 20

$O_2^+$

1971

Т4 Б975. Фотоионизационное возбуждение состояния  $A^2\Pi_u$  иона  $O_2^+$ . Carlson R. W., Judge D. L. Photoionization excitation of the  $A^2\Pi_u$  state of  $O_2^+$ . «J. Chem. Phys.», 1971, 54, № 4, 1832—1833 (англ.)

В спектре флуоресценции  $O_2$  при давл. 0,05 мм под действием света  $\lambda$  703 А обнаружена 2-я отриц. система полос  $O_2$ , связанная с электронным переходом  $A^2\Pi_u \rightarrow X^2\Pi_g$  иона  $O_2^+$ . Возможность образования состояния  $A^2\Pi_u$  путем каскадных переходов или преионизации.

Спектр

х. 1971. 14

зации исключена. Сделан вывод, что  $O_2 + A^2\Pi_u$  (I) образуется в процессе прямой фотоионизации, сечение к-рого при  $\lambda$  500—700 Å по оценке составляет  $4 \cdot 10^{-19} \text{ см}^2$ . Из данных фотоэлектронной спектроскопии известно, что сумма сечений возбуждения  $O_2 + a^4\Pi_u$  (II) и  $A^2\Pi_u$  составляет  $\sim 6 \cdot 10^{-18} \text{ см}^2$ . Малая величина сечения образования I по сравнению с II не позволяет обнаружить в фотоэлектронном спектре  $O_2$  соотв. пик, к-рый к тому же перекрывается с пиком II. В. Е. Скурат

$O_2^+$

(XI-806)

1971

50117z Photoionization excitation of the  $A^2\Pi_u$  state of  $O_2^+$ .  
Carlson, R. W.; Judge, D. L. (Dep. Phys., Univ. South. California, Los Angeles, Calif.). *J. Chem. Phys.* 1971, 54(4), 1832-3 (Eng). The high-resoln. (20 Å) fluorescence spectrum produced by extreme-uv excitation (703 Å) of  $O_2$  confirms that the  $A^2\Pi_u$  state of  $O_2^+$  is formed through the photoionization process. The obsd. fluorescence spectrum (3000-6000 Å) is assigned to the 2nd neg. system of  $O_2^+$ ,  $A^2\Pi_u \rightarrow X^2\Pi_g$ . Bandhead wavelengths are shown. The cross section for production of the  $O_2^+(A^2\Pi_u)$  state by 500-700-Å radiation was  $\sim 4 \times 10^{-19} \text{ cm}^2$  which is small compared to the sum of the cross sections for excitation of the  $a^4\Pi_u$  and  $A^2\Pi_u$  states,  $\sim 6 \times 10^{-18} \text{ cm}^2$ .

(u.n.)

C.A. 1973, 78, N8

$O_2^+$  Freund R. 1971

механизм  
образ.  
ригберов 54,  $\sim 7$ , 3/25.  
ских  
состояний



$(Cu O_2) III$

$O_2^+$

Haerdel R.

1971

Chem. Phys. Lett. 1971,  
9, 16, 548-550

смерь

● (Cell.  $O_2$ ) III



$O_2^+$

XI-2645

1941

1 Д350. Фотоэлектронные спектры высокого разрешения нестабильных частиц:  $O_2(^1\Delta_g)$  и ненаблюдаемые ранее состояния  $O_2^+$ . Jonathan Neville, Morris Alan, Ross Kevin J., Smith David. High resolution vacuum ultraviolet photoelectron spectra of transient species:  $O_2(^1\Delta_g)$  and previously unobserved states of  $O_2^+$ . «J. Chem. Phys.», 1971, 54, № 11, 4954—4955 (англ.)

Исследованы фотоэлектронные спектры метастабильного кислорода  $O_2(^1\Delta_g)$ , получаемого в безэлектродном разряде. Наряду с известными полосами в спектре обнаружены две полосы, соответствующие переходам на ненаблюдавшиеся ранее состояния  $O_2^+$ , отвечающие адиабатич. потенциалам ионизации 18,81 и 17,45 эв. Эти состояния, лежащие на 7,72 и 6,35 эв, выше основного состояния  $X^2\Pi_g$ , идентифицированы, соответственно, как  $^2\Phi_u$  и  $^2\Delta_g$ . Библ. 6.

И. Дворников

90, 1972, 120

Перегрел содержит ошибку,  
кредитованно  $2\Phi_u \sim 6,35$   
и  $^2\Delta_g \sim 7,72$

$O_2^+$

1971

M.N.

(27535p) High resolution vacuum ultraviolet photoelectron spectra of transient species:  $O_2(^1\Delta_g)$  and previously unobserved states of  $O_2^+$ . Jonathan, Neville; Morris, Alan; Ross, Kevin J.; Smith, David John (Dep. Chem., Univ. Southampton, Southampton/Hants, Engl.). *J. Chem. Phys.* 1971, 54(11), 4954-5 (Eng). The photoelectron spectrum of  $O_2(^1\Delta_g)$  shows 2 bands hitherto unreported. They are tentatively assigned to the  $^2\Delta_g$  and  $^2\Phi_u$  states of  $O_2^+$ ; their energy levels are, resp., 7.72 and ~6.35 eV above the  $X^2\Pi_g$  level of  $O_2^+$ . The ionization was effected by He I 584-Å (21.21 eV) radiation. The  $O_2(^1\Delta_g)$  was produced from pure  $O_2$  by an electrodeless discharge.

C.A. 1971 454

Jonathan N., Morris A.,  
Ross K. J., Smith D.

Typewriter

J. Chem. Phys.; 1971, 54, 4954.

74

$O_2^+$ , m. n.

$O_2^+$

XI - 1529

1971

расчет  
состояний

11 Д122. Теоретический расчет состояний  $O_2^+$ , которые могут быть обнаружены в фотоэлектронном спектре  $O_2(^1\Delta_g)$ . Raftery J., Richards W. G. A theoretical calculation of the states of  $O_2^+$  accessible in the photoelectron spectrum of  $O_2(^1\Delta_g)$ . «Int. J. Mass Spectrom. and Ion Phys.», 1971, 6, № 3—4, 269—277 (англ.)

Методом Хартри—Фока для незаполненных оболочек в приближении Несбета (см. РЖФиз, 1956, № 3, 6530) исследовано электронное строение иона  $O_2^+$ , наблюдаемого в фотоэлектронном спектре метастабильного

ф. 1971. 11 Д

$O_2(^1\Delta_g)$ . Для различных состояний приведены потенц. кривые, энергетич. характеристики, потенциалы ионизации, равновесные межъядерные расстояния, колебательные частоты. Получены согласующиеся с опытом данные для известных состояний  $^2\Pi_g$ ,  $^4\Pi_u$ ,  $^2\Pi_u$  и  $^4\Sigma_g^-$  и предсказано существование пока не наблюдавшихся возбужденных состояний иона  $^2\Phi_u$ ,  $^2\Delta_g$  и, возможно, второго  $^2\Pi_u$ -состояния и оценены относит. интенсивности для  $^2\Phi_u$ - и  $^2\Pi_u$ -состояний.

В. Л. Лебедев

$O_2^+$

(X1-2875)

1971

11 B95. Колебательное и вращательное возбуждение при ионизации Пеннинга атомами  $He(2^3S_1)$ . Примеры непертикальных процессов. Richardson W. C., Setter D. W., Albritton D. L., Schmeltekopf A. L. Vibrational and rotational excitation in  $He(2^3S_1)$  penning ionization: examples of nonvertical processes. «Chem. Phys. Lett.», 1971, 12, № 2, 349—351 (англ.)

В проточных системах исследованы распределения по колебательным и вращательным состояниям двухатомных ионов  $O_2^+$ ,  $HBr^+$  и  $HCl^+$ , полученных при ионизации Пеннинга соотв-щих нейтр. молекул метастабильными атомами  $He(2^3S_1)$ . Получены спектры полос  $O_2^+$  ( $A^2\Pi_u - X^2\Pi_g$ ),  $HCl^+$  ( $A^2\Sigma^+ - X^2\Pi_i$ ) и  $HBr^+$  ( $A^2\Sigma^+ - X^2\Pi_i$ ). Сравнение заселенностей колебательных уровней возбужденных состояний, полученных при ионизации

список

X. 1972.

11

X

Пеннинга и фотоионизации молекул, демонстрирует существенное различие в зависимостях заселенностей от колебательного числа  $v$ . Поскольку фотоионизация является вертикальным процессом, это различие указывает на невертикальность процесса ионизации Пеннинга. Сравниваются спектры системы полос  $O_2^+$  ( $A^2\Pi_u - X^2\Pi_g$ ), возбужденных ионизирующими столкновениями с энергией 5 кэВ (вертикальный процесс) и полученных при ионизации Пеннинга. Отмечается сильное вращательное возбуждение  $O_2^+$  ( $A^2\Pi_u$ ) в случае ионизации Пеннинга.

А. Резников

,  $O_2$ ,  $O_3$ ,  $O_2^+$ ,  $O_2^-$  (свечения)  $\bar{\lambda}$  2778" 1971

Weisbeck R., Völkner A.,

Z. angew. Phys., 1971, 32, N4, 258-  
-265 (нем.)

Das Emissionsspektrum der stillen elektrischen Entladung in Sauerstoff von Normaldruck.

Бир Хун, 1972, 95461

10 10



$O_2^+$

XI-2736

1972

(7)

nb. elex.  
par. u

39401a Localized and delocalized 1s hole states of the  $O_2^+$  molecular ion. Bagus, Paul S.; Schaefer, Henry F., III (IBM Res. Lab., San Jose, Calif.). *J. Chem. Phys.* 1972, 56(1), 224-6 (Eng). The hole states of  $O_2^+$ , obtained by ionization of the O mol., were examd. theoretically in 3 approxns.: (1) The frozen orbital approxn., which consists of single configuration calcns. in terms of the Hartree-Fock orbitals for the neutral  $O_2$  mol.; (2) direct hole-state calcns. in which g or u inversion symmetry is imposed on each MO; (3) direct hole-state calcns. without the restriction in (2). For the  $1s^1\Sigma^-$  hole state the 3 approxns. yield the following ionization potentials: (1) 563.5; (2) 554.4; (3) 542.0 eV. The exptl. ionization potential is 543.1 eV, and it is concluded that the hole state is localized on 1 of the 2 O atoms.

C.A. 1972. 76:8

$O_2^+$

XI-2736

1942

9 Б13. Локализованные и делокализованные вакантные  $1s$ -состояния в молекулярном ионе  $O_2^+$ . Bagus Paul S., Schaefer Henry F., III. Localized and delocalized  $1s$  hole states of the  $O_2^+$  molecular ion. «J. Chem. Phys.», 1972, 56, № 1, 224—226 (англ.)

Рассчитан потенциал ионизации  $1s$ -электрона иона  $O_2^+$  в состоянии  $^4\Sigma^-$  в рамках трех приближений: по теореме Купманса (563,5 эв), как разность полных энергий конечного и начального состояния (554,4 эв), причем  $1s$ -вакансия предполагается делокализованной, а также как разность полных энергий конечного и на-

РМХ

1942, ~9

чального состояния (542,0 эв), однако в последнем случае вакансия предполагается локализованной на одном из атомов кислорода. Расчет проводился методом МО ССП с очень большим набором функций слейтеровского типа. Сравнение расчетных и эксперим. (543,1 эв) значений потенциала ионизации  $1s$ -электрона, показывает, что вакансия локализована на одном из атомов кислорода. Анализ заселенностей валентных орбит показывает, что молек. ион  $O_2^+$  с вакансией на  $K$ -уровне близок к иону  $FO^+$ .

В. И. Нефедов

$O_2^+$

1972

5 Д109. Локализованные и делокализованные состояния  $1s$ -вакансий в молекулярном ионе  $O_2^+$ . Bagus Paul S., Schaefer Henry F., III. Localized and delocalized  $1s$  hole states of the  $O_2^+$  molecular ion. «J. Chem. Phys.», 1972, 56, № 1, 224—226 (англ.)

Произведен расчет электронной структуры ионизированной молекулы  $O_2$ . Использовались три приближения: 1) приближение замороженных МО, полученных из расчета нейтральной молекулы  $O_2$ ; 2) прямой расчет иона  $O_2^+$  с наложением условия, согласно которому МО должны быть четными или нечетными относительно операции инверсии, что заранее предполагает делокализованные состояния вакансий; 3) Расчет без указанного ограничения. Сравнение расчетного и эксперим. значений потенциала ионизации  $1s$ -электронов убедительно показывает, что реализуется случай 3, то-есть что вакансия локализована на одном из атомов кислорода (центр А). При этом наблюдается перераспределение электронной плотности валентных электронов, особенно заметное в случае  $\pi$ -орбиталей. Так, заселенности МО, происходящих от МО  $1\pi_u$  и  $1\pi_g$   $O_2$ , равны соответственно: на центре А 3,44 и 0,26, на центре В 0,56 и 1,74.

В. И. Барановский

(Структ)

ор. 1972

59

XI-2736

$O_2^+$

Bhale G.L.

1972

(M.N.)

J. Mol. Spectr., 1972, 43, 171-172

- Spin-Orbit Coupling Constants
- in the  $A^2\Pi_u$  State of  $O_2^+$

Comparison  $A^2\Pi_u - X^2\Pi_g$

$A = -4.0$ ,  $Y = -3.80$  (a  $u_g + 8.2$   $Y = 7.80$   
no Stevens-y)  
cor. of ~~unseen~~

1-7 и 0-8 показаны  $A^2\Pi_u - X^2\Pi_g$ . ширина  $0,65 \text{ \AA}/\text{см}$   
300 нм 1200 см/см.

$$A_0' = -3,5 \pm 0,1$$

$$A_1' = -3,1 \pm 0,1$$

$$A_7'' = 195,4 \pm 0,1$$

$$A_8'' = 194,4 \pm 0,1.$$

$O_2^+$ 

Оттиски 3024

1972

6 Б129. Постоянная спин-орбитального взаимодействия состояния  $A^2\pi_u$  иона  $O_2^+$ . B h a l e G. L. Spin-orbit coupling constant in the  $A^2\pi_u$  state of  $O_2^+$ . «J. Mol. Spectrosc.», 1972, 43, № 1, 171—172 (англ.)

Детально исследована вращательная структура полос 1—7 и 0—8 2-й отриц. системы  $O_2^+$ . Из первых линий сателлитных ветвей, из отношения интенсивностей сателлитных и главных ветвей, а также из величины  $\Lambda$ -удвоения в полосах изотопного иона  $O^{16}O^{18+}$  сделан вывод, что верхнее состояние является обращенным. Получены значения (в  $cm^{-1}$ ):  $A_0' = -3,5 \pm 0,1$ ;  $A_1' = -3,1 \pm 0,1$ ;  $A_7'' = 195,4 \pm 0,1$ . Д. И. Катаев

м.п.

X1-3140

X. 1973. №6

Оттиск 3024

1972

 $O_2^+$ 

2 Д353. Константа спин-орбитальной связи состояния  $A^2\Pi_u$   $O_2^+$ . B h a l e G. L. Spin-orbit coupling constant in the  $A^2\Pi_u$  state of  $O_2^+$ . «J. Mol. Spectrosc.», 1972, 43, № 1, 171—172 (англ.)

Константа спин-орбитального взаимодействия  $A$  для дублетного состояния обычно находится подстановкой эксперим. величин вращательных термов в уравнение Хилла и Ван-Флека, которому соответствует два значения константы. Выбор правильного значения может быть сделан по идентификации первых вращательных линий различных ветвей или из сравнения интенсивностей линий основных полос и полос сателлитов. Оба метода были использованы для определения константы  $A$  состояния  $A^2\Pi_u$  по полосам 1—7 и 0—8 второй отрицат. системы  $O_2^+$  (переход  $A^2\Pi_u \rightarrow X^2\Pi_g$ ). Из детального анализа вращательной структуры полос следует значение  $A = -4 \text{ см}^{-1}$ , а не  $+8,2$ , как полагалось ранее. Библ. 5. В Александров.

м.и

0415-1X

Физсп-73-2



$O_2^+$

Ommeu 3024

1972

(M.H.)

1) 67963z Spin-orbit coupling constant in the  $A^2\Pi_u$  state of  $O_2^+$ . Bhale, G. L. (Spectrosc. Div., Bhabha At. Res. Cent., Trombay, India). *J. Mol. Spectrosc.* 1972, 43(1), 171-2 (Eng). The 1-7 and 0-8 bands of the  $O_2^+$  2nd neg. system were photographed at 0.65 Å/mm in the 3rd order with a 1200 lines/mm grating spectrograph. Consideration of the identification of the 1st lines in various branches and a comparison of the intensities of rotational lines in the main and satellite branches in the case of  $A^2\Pi_u-X_2\Pi_g$  (2nd neg.) bands of  $O_2^+$  shows that the spin-orbit coupling const.  $A$  in the initial  $A^2\Pi$  state is  $-4.0$  (corresponding to  $Y = -3.80$ ) and not  $8.2$  (corresponding to  $Y = 7.80$ ) as was assumed by D. S. Stevens (1931). This means that the  $A^2\Pi_u$  state of  $O_2^+$  is an inverted  $^2\Pi$  contrary to what has been assumed so far.

William Braker

Ohls - 14

C.A. 1972. 77. 10

$O_2^+$

1972  
Čársky P., Zahradník R. A.

Зд.  
суп.

"Theor. chim acta", 1972, 26,  
N2, 171-8.

• (ср  $BH_2$ , III)

$O_2^+$

1972

Danby C.J.,  
Sland H.D.

J. Mass. Spectrom and Ion  
Phys., 1972, 8, ~ 2, 153

Спектроскопия фотоэлектрон  
ионизации. II. Конструкция и  
характеристики массе-  
спектрометрического оборудо-  
вания. Сер. На об.

РЖР, 1972, ~ 70265

Киреева диссоциацию  
молекул. ионов квантового.

Доказана предиссоциация  
состояния  $B^2\Sigma_g^- O_2^+$  по схе  
ме  $O_2^+ (B^2\Sigma_g^-) \rightarrow O + (^4S) + O(^3P)$ .

$O_2^+$

Hinkley R.K.;  
et al.

1972

"Mol. Phys",

расчет. 1972, 24, N 5, 1095-102.

"Конеч. спин-орбит. взаимодей.

● (см. Ветт; III)

1972

 $O_2^+$ 

4 Б130. Эффективные сечения и функции возбуждения полос первой отрицательной системы  $O_2^+$  и некоторых мультиплетов  $O\text{I}$  и  $O\text{II}$ . Коппе В. Т., Коваль А. Г., Данилевский Н. П., Попова Л. И. «Оптика и спектроскопия», 1972, 33, № 3, 596—598

( $\sigma$ ) Измерены эффективные сечения возбуждения ( $\sigma$ ) четырех групп полос первой отрицат. системы иона  $O_2^+$  (переход  $b^4\Sigma_g^- \rightarrow a^4\Pi_u$ ), мультиплета  $O\text{I}$  (5300Å) и пяти мультиплетов  $O\text{II}$  (4650, 4591, 4415, 4185, 4072Å). Энергию электронов варьировали в пределах 60—2000 эв. Значения  $\sigma$  для  $O_2^+$  согласуются с лит. данными, вид функции возбуждения соответствует разрешенному оптич. переходу. Для  $O\text{I}$  и  $O\text{II}$   $\sigma \sim 10^{-21} \text{ см}^2$ , вид функции возбуждения соответствует запрещенному оптич. переходу.

Д. И. Катаев

Х. 1973. № 4.

$O_2$ ;  $O_2^-$ ;  $O_2^+$ ;  $O_2^{2+}$  (спектр. данные) 1972

Обзор  
Курение Р. Н. К1 3241

J. Phys. Chem. Ref. Data, 1972,  
1, N2, 423-534 (англ.)

Spectrum of molecular  
oxygen.

108



~~(см. оригинал)~~ ер, 1972, 77, N20, 132544e

1972

$O_2^+$

м. и.

ОТЧЕТ ПО НАУЧНО-ИССЛ. РАБОТЕ  
ИЗДАНИ СССР, 1972 Г.

СРОКОВЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И ВОПРОС-  
ДИНАМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ ВОЗДУХА.



AlBr, BiF, BeF, IO, P<sub>2</sub>, O<sub>2</sub><sup>+</sup>(I, E) 1972  
Rai S.B., Sharma V.N., Rai D.K. 9 13 11 15  
Can. J. Phys., 1972, 50, N5, 428-430  
(annu.)

On the validity of Fietz potential functions for diatomic molecules.

Proc Phys, 1972, 9D153

10



$O_2^+$

Sandaram, Swaminatha 1972

"Spectrosc. Mol."

1972, 21 (245), 49-51.

"Limiting rotational states..."

● (ces. CN; III)

$O_2^+$

1972

170751c Electronic spectra. Rotational line strength. The  $O_2^+$   $b^4\Sigma_g^- - a^4\pi_u$  band system. Zare, Richard N. (Dep. Chem., Columbia Univ., New York, N.Y.). *Mol. Spectrosc.: Mod. Res.* 1972, 207-21 (Eng). Edited by Rao, K. Narahari. Academic: New York, N.Y. The rotational line strengths deduced from the relative plate blackenings reported by others are compared with those calcd. numerically from the Hill-Van Vleck treatment for the  $O_2^+$  ( $a^4\Sigma_g^- - b^4\pi_u$ ) 1st neg. band system. A computer program takes into account the spin-orbit, the spin-spin, and the spin-rotation interactions, and the centrifugal distortion; only the spin-orbit interaction exerts significant influence on the magnitude of the rotational line strengths. Rotational line strength sums show good agreement between theory and expt.

Edgar S. Peck

C.A. 1972, 77, 126.

$O_2^+$

(XI-3504)

1973

12 Д500. Вращательный анализ  $A^2\Pi_u-X^2\Pi_g$  второй отрицательной системы полос  $O_2^+$ . Albrighton D. L., Harrop W. J., Schmeltekopf A. L., Zare R. N. Rotational analysis of the  $A^2\Pi_u-X^2\Pi_g$  second negative band system of  $O_2^+$ . «J. Mol. Spectrosc.», 1973, 46, № 1, 89—102 (англ.)

м.н.

Выполнен анализ существующих спектроскопич. данных для второй отрицат. системы  $O_2^+$ . Нелинейной подгонкой по методу наименьших квадратов, использующему численно диагонализированные гамильтонианы,

ф. 1973 N 12

\* 25-14743

впервые определены полные совокупности молекулярных констант состояний  $A^2\Pi_u$  и  $X^2\Pi_g$ . Кроме величин  $v_0(v', v'')$ ,  $B_v$  и  $D_v$  определены константы спин-орбитального взаимодействия  $A_v$ . Для состояния  $X^2\Pi_g$ , которое близко к случаю Гунда (a), имеет место хорошее совпадение между найденными значениями  $A_v$  и предсказанными теорией. Значения  $A_{v'}$ , полученные для состояния  $A^2\Pi_u$ , которое близко к случаю Гунда (b), отличаются от теоретических как по величине, так и по зависимости от номера колебательного уровня. Состояние  $A^2\Pi_u$  является обращенным для колебательных уровней  $v' \leq 5$  и регулярным для уровней  $v = 6-8$ . Определены коэф. разложения Дэнхема  $\Upsilon_{10}$  и  $\Upsilon_{11}$  для верхнего и нижнего состояний и константа  $\lambda$  — удвоения состояния  $X^2\Pi_g$ . Библ. 19. И. Дворников

$O_2^+$

(X1-3504)

1973

24 Б86. Анализ вращательной структуры второй отрицательной системы полос перехода  $A^2\Pi_u - X^2\Pi_g$  иона  $O_2^+$ . Albritton D. L., Harrop W. J., Schmettekopf A. L., Zare R. N. Rotational analysis of the  $A^2\Pi_u - X^2\Pi_g$  second negative band system of  $O_2^+$ . «J. Mol. Spectrosc.», 1973, 46, № 1, 89—102 (англ.)

л.п.

Из лит. данных по вращательной структуре 11 полос 2-й отриц. системы электронного перехода  $A^2\Pi_u - X^2\Pi_g$  иона  $O_2^+$  нелинейным МНК с использованием полного электронно-колебательно-вращательного гамильтониана впервые вычислены значения всех спектроскопич. постоянных  $Y_{1j}$  и молек. параметров ( $B_v, D_v, \dots$ ) для состояний A и X иона  $O_2^+$ . Полученные значения по-

XU-1473

X. 1973 N 24

стоянной спин-орбитального взаимодействия  $A_v''$  для основного состояния  $X^2\Pi_g$ , принадлежащего к случаю «а» по Гунду, согласуются с значениями, вычисленными неэмпирич. методом ССП МО ЛКАО. Для возбужденного состояния  $A^2\Pi_u$  (ближе к случаю «b» Гунда) эксперим. значения  $A_v'$  сильно отличаются от теоретических. Показано, что постоянная  $\Lambda$ -удвоения статистически значима только для состояния X, а постоянные спин-вращательного взаимодействия статистически неопределимы для обоих состояний.

М. Р. Алнев

153381k Rotational analysis of the  $A^2\Pi_u-X^2\Pi_g$  second negative band system of molecular oxygen( $1+$ ) ion. Albritton, D. L.; Harrop, W. J.; Schmeltekopf, A. L.; Zare, R. N. (Aeron. Lab., Natl. Oceanic Atmos. Adm., Boulder, Colo). *J. Mol. Spectrosc.* 1973, 46(1), 89-102 (Eng). Existing high-resoln. data for the  $O_2^+ A^2\Pi_u-X^2\Pi_g$  2nd neg. band system were analyzed by using a nonlinear least-squares fit that employs numerically diagonalized Hamiltonians. Values for the full set of mol. consts. of the  $A^2\Pi_u$  and  $X^2\Pi_g$  states were obtained for the 1st time. In addn. to values for  $\nu_0(v', v'')$ ,  $B_v$ , and  $D_v$ , the values for the spin-orbit coupling consts.  $A_v$  were detd. for both states. For the  $X^2\Pi_g$  state, which is near Hund's case (a), the agreement between these  $A_v$  values and those predicted by theory is good. However, for the  $A^2\Pi_u$  state, which is much nearer to Hund's case (b), these  $A_v$  values and theory disagree both in magnitude and in variation with vibrational level. The  $A^2\Pi_u$  state is an inverted state for vibrational levels  $v' \leq 5$  and is a regular state for levels  $v' = 6-8$  (the upper limit of present high-resoln. data).  $\Lambda$ -doubling parameters were detd. for the  $X^2\Pi_g$  state, the only state where  $\Lambda$ -doubling is statistically significant. Spin-rotation interaction is not statistically significant for either state. Dunham  $Y_{10}$  and  $Y_{11}$  expansion coeffs. were detd. for each state. Theor.  $D_v$  values are used to improve the  $B_v$  values in the redn. of the data.

1973

153381k  
X<sup>2</sup>Π<sub>g</sub>-A<sup>2</sup>Π<sub>u</sub>

C.A. 1973. 2P. N24



$O_2^+$

1973

нам.

применя

возд. осн

Clere M.

Nucl Sci. Abstr.

1973, 27(2), 2385.

(св.  $N_2$ ; III)

$O_2^+$

1973

8 Б97. Усреднение по времени и разложение первой полосы фотоэлектронного спектра  $O_2$  на отдельные компоненты. Dromey R. G., Morrison J. D., Peel J. B. Time-averaged and deconvoluted photoelectron spectrum of the first band of  $O_2$ . «Chem. Phys. Lett.», 1973, 23, № 1, 30—33 (англ.)

М.И. Изучена 1-я полоса фотоэлектронного спектра  $O_2$  на фотоэлектронном спектрометре с цилиндрич. электростатич. анализатором, связанном с ЭВМ, позволяющей производить усредненную по времени съемку спектра. Спектр снимался в течение двух часов. Каждая из трех полос, отвечающих различным колебательным состояниям 1-й электронной полосы  $O_2$ , была разложена на отдельные компоненты спин-орбитального расщепления. Для определения функции аппаратурного искажения использована линия  $He^2P_{3/2}$ . Полученная величина спин-орбитального расщепления для основного состояния  $O_2^+$  (25 мэв) хорошо согласуется с данными молек. спектроскопии.

В. И. Нефедов

Х. 1974 N 8



(41)

$O_2$  (спин-орб.)

1973

O<sub>2</sub><sup>+</sup>

129412w Translational energy spectrum of molecular oxygen(-) ions formed by 4 keV molecular oxygen(+) ions impacting on argon. Fehsenfeld, F. C.; Appell, J.; Fournier, P.; Durup, J. (Lab. Collisions Ioniques, Univ. Paris-Sud, Orsay, Fr.). *J. Phys. B* 1973, 6(9), L268-71 (Eng). The translational energy spectrum of O<sub>2</sub><sup>-</sup> arising from single and double collision double charge transfer between 4 keV O<sub>2</sub><sup>+</sup> ions and Ar atoms was recorded. The incident O<sub>2</sub><sup>+</sup> ions are either in the ground  $\tilde{x}^2\Pi_g$  state or in the metastable  $\tilde{a}^4\Pi_u$  state. The single-collision double charge transfer is obsd. only from metastable O<sub>2</sub><sup>+</sup> ions, ground state O<sub>2</sub><sup>+</sup> leading to autodetaching levels of O<sub>2</sub><sup>-</sup>. This result gives evidence on the validity of Franck-Condon principle for mol. transitions occurring in double charge transfer processes.

CA1973

79, 22



⊕

O<sub>2</sub><sup>-</sup>

⊗

1973

 $O_2^+$ 

1 Д337. Автоионизация и фотоэлектронные спектры кислорода. Kinsinger James A., Taylor James W. Autoionization and the photoelectron spectra of oxygen. «Int. J. Mass Spectrom. and Ion Phys.», 1973, 11, № 5, 461—474 (англ.)

По фотоэлектронным спектрам в области 800—850 Å исследована ридбергова серия кислорода, сходящаяся к состоянию  $a^4\Pi_u O_2^+$ . Полученные данные сопоставлены с результатами теоретич. работы Смита (см. РЖФиз, 1971, 4Д323). Показано, что в условиях автоионизации приближение Смита дает удовлетворительное совпадение рассчитанных и измеренных интенсивностей максимумов фотоэлектронного спектра. Сопоставление экспериментальных и теоретически рассчитанных спектров показало, что принятую ранее нумерацию колебательных уровней автоионизованного ридбергова состояния следует уменьшить на 1. Библи. 35. И. Дворников

фотоэл.  
спектры

h558-1x

Ф. 1974 № 1

$O_2^+$

V.T. Koppe et. al.

I973

Opt. and Spectros. 33, 326 (I973)

Effective cross section and and excitation  
functions of the bands of the first negative  
system of  $O_2^+$

$O_2^+$

1973

Richardson W.C., Setser D.W.

1973

"J. Chem. Phys.", 1973, 58, № 5, 1809-1825.

(cm.  $H_2^+$ , III)

*список  
наим*

40219.7557

TE, Ph, Ch

 $O_2^+$ 

We: WeXe

40892 Zc

1973

1798

Tanaka Ken-ichiro, Tanaka Ikuzo.

Photoelectron spectra from some autoionizing states of  $O_2$  near the ionization threshold. "J. Chem. Phys.", 1973, 59, N9, 5042-5049

(англ.) 0047 ББК

030 032 040

ВИНИТИ

40508.6004  
TE, Ch

$O_2^+$  40892

02

1974

2112

Ajello J.M., Huntress W.T., Lane A.L.,  
LeBreton P.R., Williamson A.D.

Formation of  $HO_2^+$  by reaction of metasta-  
ble  $O_2^+$  ions with  $H_2$ .

"J. Chem. Phys.", 1974, 60, N4, 1211-1213  
(англ.)

0106 0001 1

086 087 = 0 500 8

ВИНИТИ



41203.8761  
Ch, TC

40892 12

1974

$O_2^+$

\* 4-7392

Ajello Joseph M., Pang Kevin D.,  
Monahan Kevin M.  
Formation of  $O_3^+$  by the reaction of  
metastable  $O_2^+$  ions with  $O_2$ .

"J. Chem. Phys.", 1974, 61, N 8, 3152-3154

(англ.)

0,247 пик

226 231

2 39

ВИНИТИ

$O_2^+$

Блинкова В. Т., 1974.

и.п.  
потенц.  
кривые

Изв. высш. учебн. завед.  
Физика,  
1974, № 11, 43-47

● (см. № 2; III)

Работы Л. И., посвященные  
( $N_2, N_2^+, CO, CO^+, O_2, O_2^+$ )

~~XI~~ 4503 1577

Блинкова В. В.

11, 13, 14-6

Изв. Всес. ун-д. заведений. Физик, 1944,  
№ 11, 43-47.

Сравнительное изучение популяционного  
и трехпараметрического функций по-  
тенциальной энергии двухатомной моле-  
кулы.

Док. Акад., 1945, 9654.

10

10

40708.7315  
Ph, Ch, TC, MGU

$O_2^+$

42529

OL

1974  
2183

Carbonneau R., Marmet P.

Electroionization spectrum of  $O_2$ .

"Phys. Rev. A: Gen. Phys.", 1974, 9, N 5,  
1898-1901

(англ.)

(см.  $O_2$ ; III)  
011000

$O_2^+$

Harris H.H.,

1974

Crowley M.G. et. al.

"Chem Phys Lett" 1974, 29,  
N4, 540-546 (ann)

Id. com.



(cu  $O_2$ ; III)

x. 1975. N11

ЖУ - 7958

1974

 $O_2^+$  $O_2$  $E_i; \bar{E}_e$ 

11 B129. Фотоэлектронная спектроскопия промежуточных соединений в вакуумном ультрафиолете. Часть II. Использование фазочувствительного детектирования для наблюдения электронных состояний  $O_2^+$ . Jonathan Neville, Morris A., Okuda M., Ross K. J., Smith D. J. Vacuum ultraviolet photoelectron spectroscopy of transient species. Part 2. The use of phase-sensitive detection for investigating the electronic states of  $O_2^+$ . «J. Chem. Soc. Faraday Trans.», 1974, Part 2, 70, № 11, 1810—1817 (англ.)

Исследованы He-I-фотоэлектронные спектры кислорода в состояниях  $^3\Sigma_g^-$  и  $^1\Delta_g$ . Описана и обсуждена техника фазочувствительного детектирования, усиливающего

ЖУ - 4374

ЖУ - 18



⊕



ж. 1975. N 11

го относительную интенсивность сигналов от промежуточ. соединений, находящихся в газоразрядной смеси. На основании расчетов молекулы  $O_2$  с открытой оболочкой ограниченным методом ССП в приближении ЧПДП с учетом конфигурац. взаимодействия два доп. новые состояния  $O_2^+$ , наблюдающиеся в спектре  $O_2(^1\Delta_g)$  по сравнению со спектром  $O_2(^3\Sigma_g^-)$ , идентифицированы как  $^2\Delta_g$  и  $^2\Phi_u$ . Энергии состояний  $^2\Phi_u$  и  $^2\Delta_g$  превышают энергию ионного состояния  $X^2\Pi_g$  на 6,59 и 7,72 эв соотв. Описана процедура, позволившая определять длины связей этих двух состояний и состояния  $^2\Sigma_g^-$  при помощи сравнения наблюдаемых и рассчитанных по Франку-Кондону интенсивностей полос. Эти длины связей составляют 1,40; 1,33 и 1,30 А для состояний  $^2\Phi_u$ ,  $^2\Delta_g$ ,  $^2\Sigma_g^-$  соответственно. Спектр, возбужденный излучением He-II, обнаруживает еще одно состояние  $O_2^+$ , к-рое предположительно идентифицировано как  $^2\Delta_u$ . Сообщ. I см. Faraday Disc. Chem. Soc., 1972, 54, 48. Резюме

$O_2^+$

ЖУ-7958

1974

5 Д509. Фотоэлектронная спектроскопия промежуточных соединений при возбуждении в вакуумной УФ-области. Ч. 2. Использование фазового детектирования для исследования электронных состояний  $O_2^+$ .

Jonathan Neville, Morris A., Okuda M., Ross K. J., Smith D. J. Vacuum ultraviolet photoelectron spectroscopy of transient species. Part 2. The use of phase-sensitive detection for investigating the electronic states of  $O_2^+$ . «J. Chem. Soc. Faraday Trans.», 1974, Part 2, 70, № 11, 1810—1817 (англ.)

Получены фотоэлектронные спектры  $O_2(^3\Sigma_g^-)$  и  $O_2(^1\Delta_g)$  при возбуждении излучением HeI. Подробно

фото-  
эл.  
спектры  
( $\epsilon_i$ )

ф. 1975. №5

⊕  $O_2(\epsilon_i)$   
⊗

ЖУ-7958



рассмотрен метод фазового детектора, используемого для усиления относит. сигналов промежуточных продуктов микроволнового модулированного разряда в кислороде. Найдены два новых состояния  $O_2^+$ , присутствующие в спектре  $O_2(^1\Delta_g)$ . На основании расчетов методом ЧПДП ССП с учетом конфигурац. взаимодействия найденные состояния идентифицированы как  $^2\Delta_g$  и  $^2\Phi_u$ . Определены энергии этих состояний и длины связей, полученные сравнением наблюдаемых интенсивностей полос с результатами франк-кондоновских расчетов. Интерпретированы также состояния  $O_2^+$ , полученные при возбуждении излучением HeII, а также методом ЭСХА. Библ. 22.

Т. Н. Т.

44-7958

1974

 $O_2^+$  $He II$ 

(M.N.)

131732f Vacuum ultraviolet photoelectron spectroscopy of transient species. 2. Phase-sensitive detection for investigating the electronic states of dioxygen( $1+$ ). Jonathan, Neville; Morris, A.; Okuda, M.; Ross, K. J.; Smith, D. J. (Dep. Chem., Univ. Southampton, Southampton, Engl.). *J. Chem. Soc., Faraday Trans. 2* 1974, 70(11), 1810-17 (Eng). The 2 new states of  $O_2^+$  present in the  $O_2(1\Delta_g)$  vacuum-He I photoelectron spectrum which were absent in the  $O_2(3\Sigma_g^-)$  spectrum, both spectra being obtained by a phase-sensitive detection technique, were assigned to  $2\Delta_g$  and  $2\Phi_u$  with the aid of open shell INDO-SCF calcs. The energies and bond lengths of the 2 states were calcd., the latter by comparison of obsd. band intensities with those detd. by Franck-Condon calcn. The bond length of  $2\Sigma_g^-$  also detd. The new state obsd. in the He II spectrum was tentatively assigned to  $2\Delta_u$  and higher states of  $O_2^+$  which were detected in ESCA studies were also assigned.

(+1)



C.A. 1975. 82. N20

41-4374

$O_2^+$

XI-5286 \* 8305-4;

1974

нреруеос.

103552d Dissociative ionization in oxygen. Loch, R.; Schopman, J. (Dep. Chim. Gen., Chim. Phys. Sart Tilman, Liege, Belg.). *Int. J. Mass Spectrom. Ion Phys.* 1974, 15(4), 361-78 (Eng). Dissociative ionization in  $O_2$  was examd. by means of a retarding potential lens combined with a quadrupole mass spectrometer. This particular arrangement made possible detailed anal. of the  $O^+$  ions kinetic energy distribution and the measurement of threshold energies of  $O^+$  ions with known kinetic energy. These two types of information bring new exptl. evidence, besides direct dissociative ionization of  $O_2$ , for predissocn. of the  $B^2\Sigma_g^-$  state, the  $2\Pi_u$  state and the  $c^4\Sigma_u^-$  state of  $O_2^+$ . A new predissocn. of the  $O_2^+(^2\Delta_g)$  state was found. At low ion-energy the predissocn. of the  $2\Pi_u$  state or an autoionizing predissocn. is obsd.

(see Table  $O_2$ , III)

C. A. 1975, 82 n 16

1974

O<sub>2</sub><sup>+</sup>

1 Д187. Применение нового потенциала для вычисления интенсивности полос двухатомных молекул. Mirajkar S. M. Application of a new potential to the calculation of band intensities of diatomic molecules. «Indian J. Phys.», 1974, 48, № 12, 1057—1063 (англ.)

Исследовано общее решение радиального уравнения Шрёдингера для двухатомной молекулы с потенц. ф-цией вида

$$U = -D_e - \frac{A}{r} - \frac{Ar_e}{r^2} + \frac{3A}{\alpha r_e^2} \exp[-\alpha(r-r_e)].$$

Выполнено численное интегрирование уравнения Шрёдингера для состояний  $A^2\Pi_u$  и  $X^2\Pi_g$  иона  $O_2^+$  и вычислены интегралы перекрывания колебательных волн. ф-ций для 144 переходов с  $v', v'' \leq 11$  системы полос  $A^2\Pi_u - X^2\Pi_g$   $O_2^+$ . Для переходов с  $v', v'' \leq 6$  полученные значения интегралов перекрывания удовлетворительно описывают эксперим. данные.

М. Р. Алиев

(71)

2хат.

молеку.

X

Ф 1976 N 1

O<sub>2</sub><sup>+</sup> (I)

XI 4223

1974

Samson J. A. R.,  
Petrovsky V. E.,

Phys. Rev. A: Gen. Phys., 1974, 9, N6,  
2449-2452 (encl.)

Continuum ionization transition  
probabilities of atomic oxygen.

Pre Pvs, 1974, 11D289

10 (P)

$O_2^+$

XI-4305

1974

( $\sigma_0$ )

97479w Observation of predissociations in the oxygen molecular ion by low-energy electron impact. Schopman, J.; Loch, R. (Dep. Chim. Gen. Chim. Phys., Inst. Chim., Liege, Belg.). *Chem. Phys. Lett.* 1974, 26(4), 596-600 (Eng). The kinetic energy distribution of the 0.0-1.3 eV  $O_2^+$  ions formed by dissociative ionization of  $O_2$  was carefully examd. In the peak at 600 meV, fine structure was obsd. and was interpreted by predissocn. The high-energy side of the peak was ascribed to the predissocn. of the  $^2\Delta_g$ ,  $B^2\Sigma_g^-$  and the  $C^4\Sigma_u^-$  states of  $O_2^+$ . The low-energy side of the peak was presumably due to the predissocn. of the  $b^4\Sigma_g^-$  state or the  $^2\Pi_u$  state of  $O_2^+$  or to autoionizing predissocn.

C.A. 1974. 81. N 16

X1-4805

1974

O<sub>2</sub><sup>+</sup>

71 D260. Наблюдение преддиссоциационных состояний молекулярного иона кислорода, полученного при электронном ударе низкой энергии. Schorman J., Loch R. The observation of predissociations in the oxygen molecular ion by low-energy electron impact. «Chem. Phys. Lett.», 1974, 26, № 4, 596—600 (англ.).

малая  
энергия.

С помощью квадрупольного масс-спектрометра с источником ионов типа Нира и системой тормозящих потенциалов изучено распределение по кинетич. энергии (КЭ) в диапазоне КЭ 0—1,3 эВ осколочных ионов O<sup>+</sup>, полученных при облучении электронами O<sub>2</sub> с энергией ~25 эВ. Обнаружена тонкая структура пика при КЭ ~600 мэВ, которая, по-видимому, связана с преддиссоциацией состояний иона O<sub>2</sub><sup>+2Δ<sub>g</sub></sup>, B<sup>2Σ<sub>g</sub><sup>-</sup></sup>, C<sup>4Σ<sup>-</sup></sup> (край пика, соответствующий большим энергиям) и b<sup>4Σ<sub>g</sub><sup>-</sup></sup> или <sup>2Φ<sub>u</sub></sup> или преддиссоциации с автоионизацией (край, соответствующий низким энергиям). В. Ю. О.

Ф. 1375 N1

☒ (+1) м.с

41126.7920  
TC

96201

02

1974

$O_2^+$

\* 4-7351

Stockdale J.A.D., Delmceanu Liliana.

Vibrational structure in kinetic energy spectra of  $O_2^+$  ions from electron impact dissociative ionization of  $O_2$ : predissociation of the  $B^2\Sigma_g^-$  state of  $O_2^+$ .

"Chem. Phys. Lett.", 1974, 28, N 4,  
588-589 (англ.)

0243 пик

226 226 - 2 35

ВИНИТИ



40906.1879

TC, Ch

0.2<sup>+</sup>

40892

OK

1974

4-6067

West W. P., Cook T. B., Dunning F. B.,  
Rundel R. D., Stebbing R. F. Chemionization of  $O_2$  molecules by helium metastable atoms.

"J. Chem. Phys.", 1974, 60, N 12, 5126-5127  
(англ.)

0 135 133 1

152 156

1 7 8

ВИНИТИ

param u. n. (CH, NH<sup>+</sup>, OH, FH<sup>+</sup>, CF, 11975  
NO, O<sub>2</sub><sup>+</sup>, BeH, BH<sup>+</sup>, BeF, BO, CN, CO<sup>+</sup>,  
N<sub>2</sub><sup>+</sup>, C<sub>2</sub>, BH, NH, OH<sup>+</sup>, C<sub>2</sub>) IX-5750

Abegg P.W.,

mol. phys, 1975, 30, 12, 575-596 (corr.)

Ab initio calculation of spin-orbit  
coupling constants for gaussian  
lobe and gaussian-type wave func-  
tion.

Pu Xu, 1976, 3542


10

20

51003.7583

Ch, Ph, TC, MGU

40892



1975

3358

Ajello Joseph M. A photoionization study of the formation of  $CO_2^+$  by reaction of excited  $O_2^+$  ions with CO. "J. Chem. Phys.", 1975, 63, N 5, 1863-1867 (англ.)

0458 дмк

445 446

ВИНИТИ

$^{16}\text{O } ^{18}\text{O}^+$

Bernstein R.B. et al. 1975

Comments At. Mol. Phys.,  
1975, 5(1), 27-31.

(pi)

(all  $\text{ND}^+$ ) III

$O_2^+$

1975

Блинова В. Т. и др.

расчет  
колебаний  
энергии

Томск 1975, 13 с, библиогр  
6 назв. (Рукопись деп. в ВИНТИ  
2 июня, 1975г, № 1560-75 деп)

(см №2; III)

$K_2, K_2^+, O_2, O_2^+, CO, CO_2^+$  1975  
(кв. мех. расчет) XI-4759

Блинкова В.Т., Топова Т.Н.  
Изв. высш. учебн. заведений.  
Сер. Физика, 1975, 18(7), 158.

Расчеты колебательной  
энергии  $2^1\pi_u$  молекул.

С.А. 1975.83 и 22.183715+

Ю



50703.7561

Ch, Ph, MGU, TC

41125

 $O_2^+$ XI-442B?

1975

4123

Čársky P., Kuhn J., Zahradnik R. Semiempirical all-valence-electron MO calculations on the electronic spectra of linear radicals with degenerate ground states. "J. Mol. Spectrosc.", 1975, 55, N 1-3, 120-130

(англ.) (см. СН; III)

377 378

0393

0401

пик

ВИНИТИ

50721.4242  
TC, Ch, Pn, MGU

$O_2^+$  ( $^{29864}Do, Fe, We$ )

1975

xy-9476

Dyke J. M., Golob L., Jonathan Neville,  
Morris A. Vacuum ultraviolet photoelec-  
tron spectroscopy of transient species.  
Part 5. The  $S_2(^3\Sigma_g^-)$  molecule.

"J. Chem. Soc. Faraday Trans.", 1975,

71, N 5, Part 2, 1026-1036

0413 ВИИ  
(АНГЛ.)

U 405

ВИНИТИ

379 382



50627.2437

Ch, Ph, TC, MGU

$O_2^+$

40892

фотоионизация  
Кривые

1975

ж-9248

Dehmer P.M., Chupka W.A.

High resolution study of photoionization  
processes in  $O_2$ . "J. Chem. Phys.",  
1975, 62, N 11, 4525-4534

0396 пик

(англ.)

370 374

ВИНИТИ

CO, N<sub>2</sub>, NO, C<sub>2</sub>, CO<sup>+</sup>, N<sub>2</sub><sup>+</sup>, O<sub>2</sub><sup>+</sup> 1975

NO<sup>+</sup>, O<sub>2</sub> (nomencl. Krubul). XI-4513

Finlan J., Simons G.,

J. Mol. Spectrosc., 1975, 57 (1),

1-13

11, 13, 14

Capabilities and limitations of  
an analytic potential expansion  
for diatomic molecules.

C.A. 1975, 83 n10. 85246w

10



51123.3416

Ch, Ph, TC

O<sub>2</sub><sup>+</sup>

41125

(поиски  
Кривые)

1975

3570

Finlan J. Michael, Simons Gary. Capabili-  
ties and limitations of an analytic poten-  
tial expansion for diatomic molecules.

~~Journal of Chemical Physics~~ "J. Mol.  
Spectrosc.", 1975, 57, N 1, 1-13 (англ.) (ан. CO; III)

0517

430 481

509

ВИНИТИ

#13-8999

1975

$O_2^+$

( $\epsilon_i$ )

19 Б154. Колебательная структура в фотоэлектронном спектре  $O_2^{+2}\Sigma_g^-(\sigma_g 2s)$ . Gardner J. L., Samson James A. R. Vibrational structure in the photoelectron spectrum of  $O_2^{+2}\Sigma_g^-(\sigma_g 2s)$ . «Chem. Phys. Lett.», 1975, 32, № 2, 315—316 (англ.)

С использованием аппаратуры, аналогичной описанной ранее авторами (J. Electron. Spectr., 1973, 2, 259), но с увеличенной разрешающей способностью, исследована колебательная структура фотоэлектронного спектра молекулы кислорода выше ее энергии ионизации. Обнаружены два уровня, разделенные энергией 0,071 эВ, к-рые отнесены к конечному состоянию  $O_2^{+2}\Sigma_g^-(\sigma_g 2s)$ .  
А. Зембеков

X1-4392

x 1975 N 19

$O_2^+$

X45-8999

1975

opomoz.

✓ 18593u Vibrational structure in the photoelectron spectrum of molecular oxygen( $^+2\Sigma_g^-(\sigma_g 2s)$ ). Gardner, J. L.; Samson, James A. R. (Behlen Lab. Phys., Univ. Nebraska, Lincoln, Nebr.). *Chem. Phys. Lett.* 1975, 32(2), 315-16 (Eng). Discrete vibrational structure was obsd. in the photoelectron spectrum of O at an ionization potential of 40.33 eV. Two levels, attributed to the  $O_2^+2\Sigma_g^-(\sigma_g 2s)$  final state, were detected with a vibrational spacing of 0.071 eV.

X1-4392

C.A. 1975. 83 N2

$O_2^+$

XU-8999

1975

10 Д402. Колебательная структура в фотоэлектронном спектре  $O_2^{+2}\Sigma_g^-(\sigma_g 2s)$ . Gardner J. L., Samson James A. R. Vibrational structure in the photoelectron spectrum of  $O_2^{+2}\Sigma_g^-(\sigma_g 2s)$ . «Chem. Phys. Lett.», 1975, 32, № 2, 315—316 (англ.)

В He(I) (304 Å) фотоэлектронном спектре молекулярного кислорода в области низких значений энергии электронов обнаружена дискретная структура. Два максимума, соответствующие потенциалам ионизации 40,33 и 40,40 эв, приписаны колебательным уровням состояния  $O_2^{+2}\Sigma_g^-(\sigma_g 2s)$ . И. Дворников

фотоэлектрон-  
спектр  
г. касеб.  
1 уровень

Ф. 1975 № 10

XI-4392

ЖЗ-9230

1975

$O_2^+$

10 Д401. Фотоионная и фотоэлектронная спектроскопия кислорода. Gardner J. L.; Samson James A. R. Photoion and photoelectron spectroscopy of oxygen. «J. Chem. Phys.», 1975, 62, № 11, 4460—4463 (англ.)

Измерены распределения энергии фотоионов и фотоэлектронов, образующихся при облучении молекулярного кислорода излучением в области до 304 Å, выделяемым монохроматором из свечения разряда в гелии и неоне. Приведены подробные описания спектров, полученных при разрешении 150 мэв для ионов и 45 мэв для электронов. В результате сопоставления и анализа фотоэлектронных и фотоионных спектров получены уточненные значения энергии диссоциации для состояний  $^2\Pi_u$ ,  $s^4\Sigma_u^-$ , и  $^4\Sigma_g^-$  молекулярного иона кислорода. Рассмотрены возможные варианты интерпретации структуры спектров в области более высоких энергий. В. А.

97546  
X1-1X

ф. 1975  
N 10

\*4-9230

1975

 $O_2^+$  $O_2$ 

фотоспектр.

19 B151. Фотоионная и фотоэлектронная спектроскопия кислорода. Gardner J. L., Samson James A. R. Photoion and photoelectron spectroscopy of oxygen. «J. Chem. Phys.», 1975, 62, № 11, 4460—4463 (англ.)

Измерено распределение кинетич. энергии фотоионов и фотоэлектронов  $O_2$  при ионизации монохроматич. УФ-излучением с переменной  $\lambda$  вплоть до 304Å. Путем сопоставления энергий и интенсивностей в ионных и электронных спектрах при каждой длине установлено, что уровни  $2\pi_u$  (III),  $s^4\Sigma_u^-$  и  $4\Sigma_g(\sigma_g 2s)$  соответствуют пределам диссоциации иона  $O_2^+$ . Дана интерпретация всех остальных пиков фотоионного спектра. Резюме

4576

X1-

(+1)



x 1975 N 19



$O_2^+$

1975

Lindinger W., et al

negativen.  
wand. J. Chem. Phys.,  
1975, 19, 62, 3517-3522.

•  $(\text{per } H_3^+; \text{III})$

51203.8834  
Ch, Ph, TC, Gph,  
MGU

40892  
 $O_2^+$  (пер.  
сечен.)  
иониз.

1975  
3486

Märk\_T.D.

Cross section for single and double ionization of  $N_2$  and  $O_2$  molecules by electron

impact from threshold up to 170 eV.

"J.Chem.Phys.", 1975, 63, N 9, 3731-3736

(англ.) (ср.  $N_2^+$ , 14)  
0500 пик

480 486

ВИНИТИ

$O_2^+$

\* 45 - 10025

1975

XI - 5291

homolog.  
p-yus

75719w Application of a new potential to the calculation of band intensities of diatomic molecules. Mirajkar, S. M. (Coll. Satara, India). *Indian J. Phys.* 1975, 48(12), 1033 (Eng). The potential function suggested by Mirajkar and the overlap integral method of Wu (1952) were used to calculate the intensities of the 2nd neg. bands of  $O_2^+$ . The results of these calculations are compared with exptl. ones and possible reasons for the discrepancies between the 2 are discussed.

E. O. Forster

75719w Determination of the densities and molar volumes of molten tetra-n-alkyl

C.A. 1975. 82. N26

+13-9269

1975

 $O_2^+$ 

22 Б126. Вращательный анализ эмиссионной системы Хопфилда  $O_2^+$  Ogawa H. S., Ogawa M. Rotational analysis of the Hopfield emission system of  $O_2^+$ . «J. Mol. Spectrosc.», 1975, 55, № 1—3, 56—65 (англ.)

Выполнен вращательный анализ системы Хопфилда в спектре излучения радикала  $O_2^+$  в области длин волн от 1900 до 2400 Å для полос 0—0, 0—1, 0—2, 0—3, 0—4, 0—5 и 0—6. В спектре наблюдали спиновое расщепление вращательных линий. Определены вращательные постоянные для верхнего состояния  $c^4\Sigma_u^-: B_0 = 1,5615 \text{ см}^{-1}$ ,  $D_0 = 6,7 \cdot 10^{-6} \text{ см}^{-1}$  и для нижнего состояния  $b^4\Sigma_g^-$  с  $v=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ . Измерены положения голов полос. Определены молек. постоянные для состояния  $b^4\Sigma_g^-: B_e = 1,2875 \pm 0,0005 \text{ см}^{-1}$ ,  $\alpha_e = 0,0225 \pm 0,0005 \text{ см}^{-1}$ ,  $\omega_e = 1197,8 \text{ см}^{-1}$ ,  $\omega_e x_e = 17,3 \text{ см}^{-1}$ . Для разности между расщеплением верхнего и нижнего состояния, связанным со спин-спиновым взаимодействием, получено значение  $0,87 \text{ см}^{-1}$ . Полученные результаты хорошо согласуются с лит. данными С. Н. Мунзин

(м.п.)

4644-1X

X. 1975 v22

$O_2^+$

#4 -9269

1975

( $J, n$ )

177614x Rotational analysis of the Hopfield emission system of molecular oxygen(+) ion. Ogawa, H. S.; Ogawa, M. (Dep. Phys., Univ. California, Los Angeles, Calif.). *J. Mol. Spectrosc.* 1975, 55(1-3), 56-65 (Eng). The spectrum of the Hopfield emission bands of  $O_2^+$ ,  $c^4\Sigma_u^- - b^4\Sigma_g^-$  was reinvestigated with improved resolution. Spin splitting of the rotational lines was obsd. for the 1st time, and the difference between the upper- and lower-state splittings due to spin-spin interaction was  $3c'' - 3c' = 0.87 \text{ cm}^{-1}$ . A rotational anal. was made for 7 bands, 4 of which (0-0, 0-1, 0-2, and 0-3) are new. The rotational const. for the upper state  $c^4\Sigma_u^-$  are  $B_0 = 1.5615 \text{ cm}^{-1}$  and  $D_0 = 6.7 \times 10^{-6} \text{ cm}^{-1}$ . For the lower state  $b^4\Sigma_g^-$ , the rotational const.  $B_v$  and  $D_v$  are obtained for  $v = 0-6$  and the vibrational const. are  $\omega_e = 1197.8 \text{ cm}^{-1}$  and  $\omega_e x_e = 17.3 \text{ cm}^{-1}$ .

Om XI-4494

C.A. 1975. 82. N26

\*43-9202

1975

X1-4403

 $O_2^+$  $(\tilde{u}, n)$ 

18216y Variation of the spin-orbit coupling in molecular oxygen(+) ion. Rastery, J.; Richards, W. G. (Phys. Chem. Lab., Oxford, Engl.). *J. Chem. Phys.* 1975, 62(8), 3184-7 (Eng). Anal. of the  $A^2\Pi_u-X^2\Pi_g$  band system of  $O_2^+$  shows that the spin-orbit coupling consts. for both states vary markedly with vibrational quantum no.; in addn., the sign of that for certain levels of the  $A^2\Pi_u$  state is uncertain. This is adequately explained for the  $X^2\Pi_g$  state on the basis of a variation of the electronic expectation value of the spin-orbit coupling with internuclear distance, the major variation coming not from the variation of the contributions of the 4 configurations in the wavefunction, but from variation with internuclear distance of the form of the  $1\pi_g$  orbital. For the  $A^2\Pi_u$  state, it was not possible to obtain quant. agreement, since the coupling const. in this case is a small no., the difference between 2 large quantities. However, it seems clear that in this case the variation was mainly due to variation in the contributions of the various configurations.

E.A. 1975.83 N2

1975

$O_2^+$

9202

потенц.  
кривые  
М.Н.

Х 1975 N 19

19 Б29. О вариации спин-орбитального взаимодействия в  $O_2^+$ . Raftery J., Richards W. G. On the variation of the spin-orbit coupling in  $O_2^+$ . «J. Chem. Phys.», 1975, 62, № 8, 3184—3187 (англ.)

Рассчитаны потенциальные кривые и константы спин-орбитального взаимодействия состояний  $X^2\Pi_g$  и  $A^4\Pi_u$  иона  $O_2^+$ . Использован ограниченный метод ССП с базисом стейтеровских функций (11  $\sigma$ - и 6  $\pi$ -функций на каждом ядре). Найдено, что константа спин-орбитального взаимодействия  $A_v$  в состоянии  $X^2\Pi_g$  уменьшается с увеличением колебат. квантового числа  $v$  и очень чувствительна к изменению  $1\pi_g$ -орбитали при вариации межъядерного расстояния. Для  $A_v$  состояния  $A^4\Pi_u$  наблюдается та же зависимость от  $v$ , а изменение ее при вариации межъядерного расстояния зависит, в основном, от характера вкладов в волновую функцию различных вырожденных по энергии конфигураций. Рассчитанные значения констант спин-орбитального взаимодействия количественно согласуются с эксперим. значениями, за исключением случая  $A^2\Pi_u$ . А. Дементьев

4403

XI

$O_2^+$

X3-9202

1975

10 Д162. К изменению спин-орбитальной связи в  $O_2^+$ . Raftery J., Richards W. G. On the variation of the spin-orbit coupling in  $O_2^+$ . «J. Chem. Phys.», 1975, 62, № 8, 3184—3187 (англ.)

С целью выяснения зависимости константы спин-орбитальной связи  $A_v$  от колебательного квантового числа  $v$  в ионе  $O_2^+$  рассчитаны величины  $A_v$  для трех электронных состояний:  $X^2\Pi_g$ ,  $a^4\Pi_u$  и  $A^2\Pi_u$ . Расчеты проводились неэмпирическим ССП МО ЛКАО методом в базисе 22 $\sigma$ - и 12 $\pi$ -ф-ций с оптимизацией базисных экспонент. Во всех трех состояниях учитывалось наложение четырех конфигураций. В случае первых двух состояний получено хорошее согласие (в пределах 10%) с эксперим. значениями  $A_v$  для всех колебательных чисел, и зависимость  $A_v$  от  $v$  объясняется здесь изменением вида 1 $\pi_g$ -орбитали с изменением межатомного расстояния. Для  $A^2\Pi_u$ -состояния эксперим. данные неоднозначны. Результаты расчетов имеют в этом случае более низкую точность, т. к. являются малыми разностями двух больших чисел. Сравнение эксперим. данных с расчетными позволяет сделать вывод, что за зависимость  $A_v$  от  $v$  в последнем случае ответственно в основном изме-

мин.

ф. 1975  
N 10

4403

X1-



нение вкладов различных конфигураций в данное состояние с изменением  $\nu$ . Подчеркивается необходимость более точного расчета константы спин-орбитальной связи для  $A^2\Pi$ -состояния.

Е. П. Смирнов

Оде  
(по)

XI-4504

1975

$O_2$ ,  $O_2^+$  (свекл, мол. наст.)

Ogawa M., Yamawaki K.R., Hashizume A.,  
Tanaka Y.

J. Mol. Spectrosc., 1975, 55, N1-3, 425-429

10

свекл 9-к

60413.8554

Ch, Ph, TC, MGU

 $O_2^+$  35247  
(min)

1975

\* 4-12605

Ogawa Masaru. Rotational analysis  
of the absorption spectrum of heavy  
oxygen ( $^{18}O_2$ ) in the region 1200-1285 Å.

"Can. J. Phys.", 1975, 53, N 24, 2703-2711

(англ., рез. франц.)

0599 ммк

569 572

ВИНИТИ

O<sub>2</sub><sup>+</sup>

Оммуер А-2948

1975

Раггер А.А.

(и.п; До  
Т, с.и.нос)

В сб. "Культурный  
мат" 1975, № 2, 3-61,  
и, Амстердам.

(сч №2; III)

X4-11186

1975

O<sub>2</sub>

84: 37132e Ionization potential of molecular oxygen. Samson, James A. R.; Gardner, J. L. (Behlen Lab. Phys., Univ. Nebraska, Lincoln, Nebr.). *Can. J. Phys.* 1975, 53(19), 1948-52 (Eng). The ionization potential of O<sub>2</sub> was measured by the technique of high resolu. photoelectron spectroscopy taking into account the influence of rotational structure on the shape of the vibrational bands. A value of  $12.071 \pm 0.001$  eV ( $1027.1 \pm 0.1$  Å) was found for the ionization potential. This value leads to a dissocn. energy of  $D_0(\text{O}_2^+ \text{X}^2\Pi_g) = 6.661 \pm 0.001$  eV. A lowering of the ionization potential caused by a branch head when  $\Delta N = -2$  gave an appearance potential for ionization of  $12.068 \pm 0.001$  eV ( $1027.4 \pm 0.1$  Å).

(y)

P.A. 1976. 84. N6

1977, Q<sup>+</sup>, 2

IX - 5452

Sannigrahi A.B., Mohammad S.N.,  
Indian J. Pure and Appl. Phys., 1975, 13,  
n12, 811-815 (cont.)

... extended direct  
... first-  
... dynamics

Prep, 1977, 30110

10 (P)

$O_2^+$

1975

Tal I.

ном.  
молекулы

"Mol. Phys" 1975, 30,  
N2, 629-27 (англ)

(см He<sub>2</sub>; III)

Витмеев 3402

1975

$O_2^+$

VO

тонкая  
структ

(2 Д132.) Тонкая структура  $^4\Pi$ -состояний двухатомных молекул. Veseth L. Fine structure of  $^4\Pi$  states in diatomic molecules. «Phys. scr.», 1975, 12, № 3, 125—128 (англ.)

Тонкая структура  $^4\Pi$ -состояния двухатомной молекулы определена путем численной диагонализации матрицы возмущения 4-го порядка. Соседние электронные состояния учтены во 2-м порядке теории возмущений с помощью преобразования Ван-Флека. Центробежное искажение также учтено в матричных элементах. Результаты расчетов применены для получения термов  $a^4\Pi_u$ -состояния  $O_2^+$  и  $B^4\Pi$ -состояния VO. Некоторое расхождение рассчитанных величин с экспериментальными для VO объясняется тем, что во 2-м порядке теории возмущений не учтены близлежащие колебательные уровни состояния  $^4\Sigma$ .

И. В. Лебедь

р 1976 N2

(+) м.с

(+)

⊗



$O_2^+$ 

Этмиса 3402

1975

3 Б45. Тонкая структура состояний  $^4\Pi$  двухатомных молекул. Veseth L. Fine structure of  $^4\Pi$  states in diatomic molecules. «Phys. scr.», 1975, 12, № 3, 125—128 (англ.).

VO

Проведено уточнение и пересмотр теории тонкой структуры состояний  $^4\Pi$  двухатомных молекул. Основное внимание уделено построению ур-ний, удобных для численного решения. Предложенный подход основан на численной диагонализации матрицы возмущений для четырех  $^4\Pi$  подуровней. При этом описании в общем случае используется только квантовое число  $\Omega$  и оно может быть применено как к чистым случаям Гунда (a), (b), (c), (e), так и к промежут. случаям. Для расчета структуры состояний  $^4\Pi$  используется также базис, характерный для случая Гунда (a), что позволяет существенно уменьшить число используемых параметров. Взаимодействие состояния  $^4\Pi$  с другими элек-

тонкая  
структ.

x 1976 N3

⊕

⊗

тронными состояниями учтено в рамках теории преобразований Ван—Флека с точностью до второго порядка. Развитая модель применена к расчету  $a^4\Pi_u$  состояния  $O_2^+$ . Получено отличное согласие теор. значений с эксперим. для четырех нижних колебательных уровней и для значений  $J$  вплоть до  $\approx 40$ . Обнаружено, что матричные элементы оператора спин-спинового взаимодействия, отвечающие изменениям квантовых чисел  $\Delta\Lambda = -\Delta\Sigma = \pm 2$  вносят существенный вклад в величину  $\Lambda$ -удвоения. Проведен также теор. расчет  $B^4\Pi$ -состояния молекулы  $VO$ . При этом учтены все параметры для случая Гунда (с), а взаимодействие с состояниями  $^4\Sigma$  и  $^2\Sigma$  учтено с точностью до второго и третьего порядков, соотв. Для  $^4\Pi_{1/2}$  подуровня обнаружено систем. различие между эксперим. и теор. значениями. Предположено, что это расхождение может быть объяснено взаимодействием с возбужденным колебательным уровнем состояния  $X^4\Sigma^-$ . Б. И. Жилинский

$O_2^+$

Оммуел 3402

1975

VO

84:9100z Fine structure of  $4\pi$  states in diatomic molecules. Veseth, L. (Inst. Phys., Univ. Oslo, Oslo, Norway). *Phys. Scr.* 1975, 12(3), 125-8 (Eng). The fine structure theory of  $4\pi$  states in diat. mols. is reconsidered from the point of view of exact numerical diagonalization of the 4-by-4 perturbation matrix. The interaction with other electronic states is accounted for through a 2nd order Van Vleck transformation. Centrifugal distortion corrections are also added to the matrix elements, and a new spin-spin matrix element of the type  $\Delta\Lambda = -\Delta\Sigma = \pm 2$  is in particular found to contribute to the  $\Lambda$ -doubling. The theoretical results are applied to the  $a^4\Pi_u$  state in  $O_2^+$  and the  $B^4\Pi$  state in VO.

теорет.  
результ.

точка  
структ.



С.А. 1976 84 N2

O<sub>2</sub><sup>+</sup>

1976

Arce F., et al.

An. quim. Real. soc.

esp. fis. y quim., 1976,  
72, № 6, 505-8.

(расчет  
сум. иост.)



(см. Li<sub>2</sub>, III)