

$\text{Ge}_2\text{H}_6$

$Si_2H_6^+$ ,  $Ge_2H_6^+$ ,  $Sn_2H_6^+$ ,  $Ge_3H_8^+$  (2)

~~2221~~

(ΔH)

2619-IV-ТХВ

Горохов Л.Н.

Потенциалы ионизации молекул дисилана,  $Si_2H_6$ ,  
дигермана,  $Ge_2H_6$  и дистаннана,  $Sn_2H_6$ , а  
также молекулы тригермана,  $Ge_3H_8$ , 3 с.

$\text{Ge}_2\text{H}_6$  ( $\rho, \mu$ )  $T_m, T_b, \Delta H_v$  ~~1971~~

3575-IV TKB

Шушкеев С.В.

Температуры тавелеев и ке-  
реев и теппота и епареев  
дигермана, 3с.

$Ce_2H_6$  (х, м)  
(Тм, Тв, ΔVН)

~~2577~~

3575-IV-ТХВ

Перлов В.С.

Температуры плавления и кипения и теплота  
испарения дигермана, 2 с.

$\text{Ce}_2\text{H}_6$  (2)  
(Д/Н)

~~1574~~

3575-IV-ТХВ

Сияние Э.В.

Этальния образования  $\text{Ce}_2\text{H}_6$  1г/3 с.

Ge<sub>2</sub>H<sub>6</sub>

BQ-7581-IV

1939

Ge<sub>3</sub>H<sub>8</sub>

H. J. Emelius

T<sub>m</sub>, T<sub>b</sub>, ΔH<sub>b</sub>

E. R. Gardner

pp 657-74

1960

Van der Kelen G.P., Van den Vondel D.F.

Bull. Soc. chim. Belg. 1960 69, 504

Mass-spectrom.  $\text{GeK}_2$  u.  $\text{Ge}_2\text{K}_6$

u.  $\text{GeK}_4$

$\text{Ge}_2\text{H}_6$

$\Delta H_f$

Gunn S.R., Green L.G. 1961  
J. Phys. Chem.,  
65, 779.

Теплоты образования  
некоторых нестабильных  
газобразных гидридов.

(см.  $\text{PH}_x$ ) I

М 685

Генн (р, ДИ, Тв) 1963

Девятов Г. Г., Жуков И. А.

Ж. Неоран. ДИ, 1963, 8, 265-8.

Давление на поверхности пермане

1963

<sup>24</sup>Ge<sub>2</sub>H<sub>6</sub> Saalfeld F.E. Svec R.Y.

Inorgan. Chem. 1963 2, 50

Ное-центры логичны изрядно  
II, некоторые: все же изрядно  
элементов группы IVB и VB.

$H_3Ge-GeH_3$  ( $Ge_2H_6$ ) Saalfeld F. &., 1966  
Svec H. J.

D. J. Phys. Chem., 70, N6, 1753.

Масс-спектры летучих  
изридов. IV. Силил-герман.

(sil. Si Ge  $H_6$ ) I