

CCly

CCL₄

Bp-2250-VII 1922.

Latimer W. M.

Temp; & Hm

"J. Am. Chem. Soc"

1922, 44, 90-97.

V-7351

1926

Bodenstein, *M.*, Gunther, *P.*, and
Hoffmeister *F.*
1. Angew. Chem. 37, 875 (1926)

$\text{CCl}_4; r, \Delta H_f^\circ$

Circ. 500

n



LC56 gp/x

CCL₄

Bq - 3476 - VII 1926.

Bond P.A.

Beach H.T.

Tm, Tb.

"F. Am. Chem. Soc."
1926, 48, 348-56.

СССР

Боденштейн М., Гунтер Р / 1926

Вопфмейстер Ф.

~~2~~
З. angew. Chem. 1926, ~~35~~, 825

Термодинамическое исследование
результатов реакций. I.

Термодинамическое исследование
существования СССР.

$$\Delta H = 25430 \pm 350 \text{ ккал (моль)}$$

CCl_4

Bunther P. 1926
Bodenstein M, ~~Guthrie P~~, ~~Haffner~~

Trans. Am. Electrochem. Soc.

1926, 227 49 (непереведено)

Температура сгорания CCl_4

показ $25,430 \pm 0,350$ мм для

температура сгорания $\text{CCl}_4 + 2\text{H}_2 = \text{C} + 4\text{HCl} + 62,570 \pm 0,35$

температура и сжатия

сжатия $\text{C} + \text{Cl}_2$ необходимо

и H_2

1926

C.A. 1926 - 2610

температурах от 150 до 500° сина,
 водородом, не динет расчит. Термодина-
 мическую равновесие ^{either, about} ~~свойства~~
 равновесия $C + 2Cl_2 \rightarrow CCl_4$

По Таблице $\Delta H = 18300 \text{ ккал}$ ($p = \text{const}$)
 $CCl_4 + O_2 + 2H_2 = CO_2 + 4HCl + 2276 \text{ ккал}$

Ostwald (1906) решил $\Delta H = 17800 \text{ ккал/мол}$

Бертело и Мейерзон (Ann. chim. Phys 1853, 28, 132)

$\Delta H = 47000 \text{ ккал}$, но реакция $CH_4 + H_2O + aq =$
 $= CO_2 + 4HCl aq + 58800$

Ccl₄

BQ-8384-IV

1926

J. H. Mathews

ΔH₆

pp 562-576

Bob- 1153-IV

1929

Ccl_4

SKAHL, Meier H.F.

I_2

J. of the American Chem. Soc.
1929, 51, N12, 3517-3519

IV- 8174

CCl_4 (1, Hf^0)

CH_3I (Tb, Hb)

Kolosowski^s and Mehenine^{g, y.l.}
1. Bull.soc.chim.France 49, 1931,
1461

Be, 

СССР

Клюсовский И. А., Метелин ¹⁹³¹ И. Е.

И. О. Х. 1931, 616, 1

Определение выгоревших
скрытых теплох и их
пироксенов. 1.

Теплох
и их
исгоревших

Содержание в

В административные и их
определение теплох и их
пироксенов в выгоревших. Для
исследования измерения была
использована теплох и их

с. А. 1932-2036

Воздух при нескольких температурах.

Солнечная и радиация Море и Море $\pm 0,5^\circ$

t q λ
Сред 26,02 59,7 64,7

визуальный контроль
 q - температура воздуха в воздухе

λ - визуальный контроль температуры

7624 - IV

1931-32

Hf(CCl₄, SiCl₄, SnCl₄, TiCl₄)

Datta A.K., Saha M.N.

Bull. Acad. Sci. United Provinces

Agra Oudh., India, 1, 19-25,
(1931-32)

"The absorption spectra ...

M

ВФ-1140-IV

1933

СЛ₄

Колосовский Н.А. Удовенко В.В.

Ср

Сопр. ренд. 1933, 197,
519-20

Bop-9315-IV

1933

CC₄

Yost D.M., Blair C.

S^o
298

J. Am. Chem. Soc., 1933, 55,
2610-11

C.A. 1933, 3389

Boo-1142-IV

1933

Coly

Nieuwenhuis W. E.

Im

Z. f. Elektr. Bd. 1933, 39,
N^o 9, 727-782.

CCl₄

| 130-1152- IV | 1933

(T_m, T_{tr})

Skau E.L.

J. Phys. Chem., 1933,
37, 609-14

1934

СССР

1

Kolozovskii N, Aiman A

Bull. Soc. chim. [5], 2, 877-80, (1934)

Определение скорости взрывания
темно испарения и гидратов

Темно
испарения

Даны данные по скорости
темно испарения, взрывания
и гидрат, 14 опытов. и гидратов

C.A. 1934 - 71332

Cl_4

Johnston H. L., Long E. A.

 Tb_2 J. Am. Chem. Soc. 1934, 56,
31-35 ΔH_m

Bop - 1139 - IV

1934

Ccl₄

Colosovskii N.A. Udovenkov V.

Cp

J. Gen. Chem. (U.S.S.R.) 1934,
4, 1027-3

CCl_4

Bp-2385-VII

1934.

Nasu N

(ΔHm)

" Bull. Chem. Soc. Japan"
1934, 9, 198-205.

Bp - 1150 - IV

1934

CChy

Sameshima Y.
Hizamatsu J.

Tr

Bull. Chem. Soc. Japan,
1934, 9, 260-262

Bcb-9191-IV

1934

Ccl₄

Verstraete O.K.

Tm

Stm

Bull. Soc. chim. Belges, 1934,
43, 513-44

Bz

StBz

CCh₄

Deffet L.

Tm

Bulletin de la Société Chimique
de Belgique, 44; 12, 41-67 (1935)

sHm

Bd-1123-IV

1936

C_{Cl₄}

Danköbler G.

C_p

Z. physik. Chem. 1936, B31,
439-53.

C_v

ВФ-9391-IV

1936

С С₄

В. А. Куреев, А. А. Свободова.

Т_м

Ж. физ. хим., 1936,
6, № 1, 64-70

Д_м

CCl_4

Phipps H.E., Reedy J.H.

 I_2 J. Phys. Chem., 1936, 40, 89

Bp-1170-IV

1936

Cl₄

Zmaczynski A.

T₆

Roczniki Chem. 1936, 16,
486-501

C. H. 1937, 33554

CC₄

Roth W.A., Böger E.

1922

Ber 1932, ~~70~~ 70, 48

к термостату Бюга

$\Delta H_{(s)} \text{CCl}_4(\text{fus}) = -17,4$

B99-9023-IV

1937

Stull D.R.

CCl_4

I_2

ΔH_m

J. Am. Chem. Soc. 1937, 59, 2726

Bφ-8694-IV

1938

Ccl₄

Radulescu D., Alexa M.

P

Bull. Soc. chim. Romania,
1938, 20A, 89-113

Bep - 4741 - IV | 1939.

ccl4

Michel J.

(T_m)

"Bull. Soc. chim. Belg.",
1939, 48, 105-157.

Methods and.

Bop-9156-IV

1940

Ccl₄

Turkevich A., Smyth C.P.

Tu

Tb

J. Amer. chem. soc. 1940,
62, 2468-74

Tt₂

БФ - 9378 IV

1941

ССЧ

Меданов А. К.

Ср

ас. Общей жизни, 1941,
11, №, 471-482

CCh

Cip-pa

BPP-8246-IV [1941

Gister M.W., Sutton L.G.

Trans. Faraday Soc.,
1941, 37, 343, 406

Селу

Pitzer, Kenneth S.
 U. S. Chem. Soc. 1941, 2413, 63

Диски

Теплоёмкости изобразных
 предельных углеводородов, дисце-
 риминыальные величины для
 n-пентана и 2,2-диметилбутана
 Теплоёмкость и теплоёмкость
 испарения определены в
 калориях на моль.

CCl_4 $\Delta H_{\text{испарения}} 349,8^\circ\text{K} = \underline{7170 \pm 20 \text{ ккал}}$

Byrdice Mathews M. Am. Chem. Soc. 1940,
2988, 62 . измерено 7161 ккал/моль

CCLy

BP-7969-IV [1944

(Cp)

Hicks J. F. G.,
Hoolley J. G.,
Stephenson C. C.

J. Am. Chem. Soc.
1944, 66, 1064

B92-8328-1V

1945

CC4

MacLeod D.B.

Trans. Faraday Soc., 1945, 41,
122-126

Hv

Bp-1038-IV

1948

CF₃OF

Kellogg K.B., Cady Y.H.

Tb

P

J. Amer. Chem. Soc., 1948, 70,
3986-90

ΔH_v

CCl₄

Bd- 922-u

1949

Staveley L.A.K., Gupta A.K.

Tr

ΔH_2

Trans. Far. Soc., 1949, 45,
50-61

ΔH_m

T_m

CCl_4

1951

И.К.
сверх
показ.

100-1300 cm^{-1}

Madigan J., Cleveland F.

J. Chem. Phys. 19, 119-23.

Инфракрасный спектр
и растен фермодин. в-в
 CCl_4 и гр.

Область of 400 to 3500 cm^{-1}

Растен метод. р. и. и. of 298, 16 to 1000

Bop-1229-IV

1952

CCL₄

Thomas D. Y., Staveley L.A.K.

J. Chem. Soc. (London),
1952, 4569-4577

Tm

2
CCL₂
nas
Pawman

1952

Welsh, Thomas
Love

Canad. J. Phys. 30, 577.

1114

1953

CCl₄, SiCl₄, SnCl₄, CH₄, Cl₂, Br₂, I₂ (ΔH_v)

Atoji M., Lipscomb W.H.

J. Chem. Phys., 1953, 21, N 9, 1480-1486
(Ann.)

Infractions of randomly disordered molecules.

PX, 1954, N 16, 37405

CCl₄

comb. sp. r.

CCL₄

BQ - 4296 - IV

1953.

Barker F. A.
Brown J.
Smith F.

Tb; P; ΔH mix

"Disc. Par. Soc"

1953, 142-150.

Телс, Питцер
Gelles, Pitzer

1953

CF_4 , CCl_4 ,
 CBr_4 и др.

JACS, 1953, 75, N21, 5259-
- 5267

Термод.
гр = 4 мм

Термод. гр = 4 мм
законопроект водных
метана

X-54-20-
-44396



(298 - 1500°K)

	ρ^*	$M-M_0$	C_p	S
CF_4	52,27	3043	14,61	62,48
CCl_4	60,15	4111	19,92	73,94
CBr_4	69,19	4872	21,80	85,53
CH_3F	45,12	2,421	8,94	53,24

и др.

Всего 39 соединений.

ССе₄

ССе₃

Результ

Разуев М.А., Васильев Н.С., 1953

Уч. хиз., 1953, 22, 36

Свободно-радикальные реакции
гетероциклического характера

Обзор со 105 ссылок относительно
но свойств и реакции радикала
ССе₃

С.А. 1854-431ав

ССе₄, IV-1161

СХСЗ,
СН₂СН₂
...

Тензор
состояния

Smith L., Bjellerup L., Kroore S.,
Westermarck H.,
Acta chem. scand., 1953, 7, №1, 65
Тензор состояния органических
соединений хлора, определение
метода "кварцевой ватки".

Детальный разбор метода и
его применение для определения
Анстр. Хирсверманса. Вещество

Температура содержания в кал/г

	кал/г	кал/мл
C_{60}	567,5	87304

$C_{11}C_{60}$	547,7
----------------	-------

$C_{11}C_{62}$	1701,4
----------------	--------

$C_{12}C_{66}$	734,4
----------------	-------

$C_{12}H_{12}C_{65}$	1017,7
----------------------	--------

.....

CCL₄

Bp - 1111-IV

1954.

Adcock D.S.

Ms. Glashan M.L.

ΔHmix.

"Proc. Roy. Soc." A.

1954, 226, 266-82.

ВОР-1112-IV

1954

Албрайт, Джеймс
Albright L.F. и др.

СССР

ЖАСЗ, 1954, 76, N23, 6017-19

Термод.
ф-ции

Термод. ф-ции хлордиформатов
(100 - 1000°K)

X-56-3-6354

ССУ

Беннингга, Скот

1955

Benninga H., Scott R. L.

J. Ch. Ph., 1955, 23, 1911

Internal pressure ССУ
мембры - 7° и 70°

CCl₄

Богданов, Алексей Кириллович / 1955
Bogdanov A., Kleist H.G. Киевск. о.
Ж. Электрохим., 1955, 59, № 5, 460-462

p(am)

Скорость окисления эти-
лового спирта, четырёх-
хлористого углерода и мо-
лекул двуокиси азота.

Х-56-22-74422.

ВФ-1125-IV

Датлор (Дамлон ?) | 1955

ССУ

Дунлор А.К.

ЖАС, 1955, 77, № 7, 20 16

Температ.
плавления

Точка плавления
тетрагидрохлоркислотного уксуса

$-22,75 \pm 0,03$

или

$250,41 \pm 0,03^{\circ}\text{K}$

Камфороид

X-57-3-7461

Забриса

-22,782

-22,782

-22,793(-22,796)

Ср. 22.788

$\Delta +0,036$

$-22,75 \pm 0,03$

Автор — $22,75 \pm 0,03$

Тимирязев,
Марти — 22,95

Скалу — 22,85

Джонстон,
Понч — 22,87

Дегре — 22,95

Стан — 22,79

Гута — 22,96

ВФ-27-IV.

1956

Слу

Морозов И.С., Глотковский Д.Д.

Т₁

ж. черган. химии, 1956, 1,
№11, 2601-2605

ВФ-56-IV

1956

Сл.ч

Зиневьев А.А., Рословский В.Я.

Im

Ж. неорг. химии, 1956, 1,
№ 11, 2596-600

Its

CCl_3Cl

Bp-5351-III

1957

Alec H. Schen

Ann Rev. Phys. Chem.
1957, 8, 439.

(70)

Cell BrD

1957

CCl₄, CCl₂

SO₂, SO

CS₂, CS

paraffin

DM_f

Blanchard L.P. Le Goff P.

Can. J. Chem. 35, 89

☒

Харрисон ВФ-1132-IV

Harrison, Moelwyn-Hughes E.A., 1957

Proc. Roy. Soc. 239, N1217, 230

CCl₄

CCl₃H

Тензорность неосознаваема

Ср(мид) CCl₄, CCl₃H, и С.г.

1957

Neigelauer C.A.

Dis. Abstr., 1957, 17, 147D

Синтез новых термостойких

полимеров с галогенсодержащими

остатками в основной цепи

(CF₄, CF₃H, C₂F₂H₂, CCl₃F, CCl₄, C₂F₄,
C₂F₂H₂, CCl₃F, COF₂ и др.)Успешно синтезированы
CCl₄ с помощью катализатора

Перевод изобретения XV-33

2000. internat. symposium Cl_2 . ~~off~~ Polymeres
C, $AgCl_2$ u. HCl . Weiss

$$\Delta H_{25}^{\circ} \text{CCl}_4(l) = -32,3 \text{ kcal/mol}$$

$$\Delta H_{25} \text{ CCl}_3\text{F(l)} = -66,2$$

1957

СССР

СиСт₂

получение

Шостакровский М. Ф. Жогкин и др.

Изв. прикл. химии, 1957,
ЗД, № 9, 1401-1402.

Получение тетрехлористого кремния из тетрехлористого углерода.

X-58-7-20862

1958

Обученьникова Н. С.

SF₆
(CSe₄)

Эксперим. и теор. изв.,
1958, 34, No 2, 519-521.

Притяжение медленных
электронов к молекулам
SF₆ и CSe₄

X- 18-58-59854

СССР

Гордону.

1958

Gordon John S.

J. Chem. Phys., 1958, 29,

N 4, 889-890

Термодинамические
функции температуры
и энергии и ро-
дикала.

X-59-9-30374.

Ccl₄

Bop - 1098-III | 1958

Clempitt B.H., German D.E.

(ΔH_v)

1958, 62, p 438-40.

CCl_4
 CHCl_3

Apr

Mo

Kazuhito Kusano

[1958]

Nippon Kagaku Zasshi, 1958, 78, 614

Прибор для прямого определения
теплоты парообразования. Теплота
парообразования некоторых органи-
ческих растворителей

при 30° $\text{CCl}_4 = 50,82 \pm 0,03$ ккал/г.
 $\text{CHCl}_3 = 64,49 \pm 0,03$ ккал/г.

CA-53-3786 4

BQ-1133-IV

1959

CChy

Heldenbrand D.L.,
McDonald R. A.

ΔH_v , p,

J. Phys. Chem., 1959,

S, T₆

63, ~9, 1521.

PM X, 1960, 56201

CCL₄

BQ-1146 - VII

1958

Sackmann #

Kloos G.

Sm; T_{tr}

"Z. phys Chem" (DDR)
1958, 209, 15-6, 319-25

B90 - 1146 - IV

1959

CCl_4

Post B.

Ti_2

Acta crystallogr.,
1959, 12, 349

СССР(2)

Троянбуз В.Ф., 1961

Авторской диссер-
тацией на соискание
ученой степени К.Х.Н.,
Москва, 1961.

Кр, ДФН;

BOP-729-II (IV)

1961

 CCl_4

Fox R.E., Curran R.K.

 SF_6 J. Chem. Phys., 1961, 34, 1595

ионизация

ионизационные процессы в

Диссоциация

 CCl_4 и SF_6 , начавшиеся при ко-
манде электронного пучка

$$D(\text{CCl}_3-\text{Cl}) = 3,30 \pm 0,07 \text{ эВ}$$

2 ион

см. $(\text{CCl}_4)^{\text{III}}$ 

СССР

Маслов П.Т.


1961

1070

М. Физ. хим.

(об.)

1961, 35, № 7, 1551-57.



Kung W., Canjar L.V. ¹⁹⁶²

~~CCCC~~

Vapor pressure of silicon
tetrachloride - carbon tet-
rachloride mixtures.

Patm.

J. Chem. Eng. Data 7, 351-2
(1962)

C.A. 1962. 57. 8

9232 g.

СССР

1962
Байбурз В.Ф., Медведев В.А.

Сб. тр. Гос. ин-та прикл. химии, 1962, вып. 49, 84.

Определение теплового
разования мембранных
фторхлорзамещенных
металлов на методиках
ва в сферической боссе.

X. 1964. 45363

CCLy

1962

Long D.A.,
Chan J.Y.H.

Trans. Faraday Soc.,

58, 2328.

Root mean square ampli-
tudes of vibration in some
Group IV tetrahalides.

II Calcu-lation of nor-
neol coordinate trans-

formations and force constants.



CCl₄

Miller G.H.

1962

Accurate calculation of
P_{atm}: very low vapor pressures:
ice, benzene and carbon
tetrachloride.

J. Chem. Eng. Data 7, 353/1962

C.A. 1962. 57. 8

9232h.

8563 - IV

1962

$S_{\text{mix}}, H_{\text{mix}}$ (CCl_4 , CH_3OH , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)

Otterstedt J.E.A., Missen R.W.
Trans. Faraday Soc., 1962, 58, N 5,
879-889
Thermodynamic properties of ...

(M) W

CCh₄

Pool R.A.H., Saville J.,
Herrington J.M., Shields B.D.C.
Staveley L.A.K.

T₁₀

Trans. Faraday Soc. 1962, 58,
1692-704

$C_{64}-C_5H_{12}$

1962

Э. Ф. Westman, Jr и др.

ср
6-300°K

БТТ, 1962, N5, стр 66.

СССР

Вар-2386-VII

1962

Заварушкая Т.Д.
Федорова Н.И.

(ТВ)

Тр. Всес. научно-иссл.
Ассамблеи. Мат. ии-та"
1962, (48), 152-60.

1963

CC-4

Edwards D. G.

p

Contract W-4405-eng-48.151p.

The vapor pressures of 30 inorganic liquids between one atmosphere and the critical point.

(cur. N₂) I

NSA. 1964. 18.3

1963

CCl_4

Kollar Gy., Proszk Z.

ΔH_v
(c.u. Kr.)

Magy. Kém. Folyóirat 69(6),
278.

Calculation of heat of vaporization of elements and covalent compounds by means of ΔH_v - ΔH_f constants.

(c.u. Kr.)

C.A. 1963. 59.9

9402 Bc

1963

CCl₄

19 Б226. Плотность, вязкость и поверхностное натяжение четыреххлористого углерода и четыреххлористого олова. Пугачевич П. П., Нисельсон Л. А., Соколова Т. Д., Ануров Н. С. «Ж. неорганической химии», 1963, 8, № 4, 791—796

Измерена температурная зависимость плотности (ρ), вязкости (η) и поверхностного натяжения (σ) четыреххлористых углерода и олова. Используемые в работе CCl₄ и SnCl₄ тщательно очищались ректификацией на эффективной колонке. Плотность определялась в запаянных кварцевых пикнометрах в диапазоне т-р, превышающих нормальную т-ру кипения исследуемых жидкостей. Измеренная плотность удовлетворительно описывается выражениями: $\rho_{\text{CCl}_4} \text{ (г/см}^3\text{)} = 1,6287 - 0,001763t - 0,00000209t^2$ и $\rho_{\text{SnCl}_4} \text{ (г/см}^3\text{)} = 2,2789 - 0,0025437t - 0,00000081t^2$. Вязкость хлоридов определялась в видоизмененном вискозиметре Мартина (Martin L., Bull. Soc. Chim. Belg., 1925, 34, 81). Измеренная вязкость описывается выражениями: $\eta_{\text{CCl}_4} \text{ (спуаз)} = 1,3458 - 0,022493t + 0,0002222t^2 - 0,000000946t^3$ и $\eta_{\text{SnCl}_4} \text{ (спуаз)} = 1,0917 - 0,01241t + 0,00007712t^2 - 0,000000193t^3$. Поверхностное натяжение хлоридов измерялось методом максим. давления

ρ ,
2

+1

X

См.
моб.

X. 1963. 19

в газовом пузырьке (Cantor M., Ann. Phys., 1892, 47, 399). Измеренное поверхностное натяжение описывается выражениями: $\sigma_{\text{CCl}_4} (\text{дин} / \text{см}) = 29,21 - 0,1259t$ и $\sigma_{\text{SnCl}_4} (\text{дин} / \text{см}) = 29,92 - 0,1134t$. Уравнения, связывающие ρ , η и σ с t -рой, найдены методом наименьших квадратов. Полученные данные удовлетворительно совпадают с литературными. Д. Костромичева

Бой
ЧСПЯ

1963

C H C l₃, C C l₄

P

Enthalpy-concentration diagram of the system carbon tetrachloride-chloroform. Jaime Wisniak and Eurenio Ossa (Univ. Catolica Chile, Santiago). *J. Chem. Eng. Data* 8(3), 296(1963). Vapor-liquid equil. for the system CCl₄-CHCl₃ are detd. at 760 mm. with a conventional Othmer still (Barker, *et al.*, CA 48, 6799i). An enthalpy-concn. diagram was constructed from exptl. and published data. The vapor pressure of CHCl₃ at 50-75° was detd. by a modified isoteniscope method. The exptl. results fit the equation $\log P = 6.418 - [859.3/(181.9 + t)]$ with a relative error <0.5%. A similar equation was published for CCl₄ (cf. Barker, *op. cit.*): $\log P = 6.859 - [1197/(222.1 + t)]$. The calcd. activity coeffs. (1.00 ± 0.01) indicate that in spite of the dipole moment, the behavior of CHCl₃ in CCl₄-CHCl₃ solns. is near ideal. GRJN

C.A. 1963.59.11

12249 c

СССР

1964

9 Б566. Энтропия и молекулярное движение в конденсированной фазе тетраэдных молекул. Chihara

Hideaki, Shinoda Takako. Entropy and molecular motion in the condensed phases of tetrahedral molecules «Bull. Chem. Soc. Japan», 1964, 37, № 1, 125—131 (англ.)

Сравнение энтропий сублимации в тройной точке CCl_4 , CMe_4 и CF_4 с энтропией этого процесса в тв. инертных газах показало, что при соотв-ей тройной точке в случае конденсированной фазы этих в-в их молекулы находятся в состоянии заторможенного вращения. Потенциальный барьер для этого заторможенного вращения составляет

То
масс.
струк.

X. 1966. 9

+2



для CCl_4 2,4, для CMe_4 1,3 и для CF_4 1 ккал/моль. Величина потенциального барьера этих в-в пропорциональна t -ре фазового перехода в тв. фазе. Предлагаемая модель структуры жидк. CCl_4 для расчета его энтропии парообразования основана на предположении, что он состоит из кристаллических зародышей, содержащих большое кол-во молекул. Вычисленная по предложенной ф-ле величина энтропии парообразования жидк. CCl_4 дает совпадение с экспериментом с точностью 3%, если принять ср. число молекул в зародыше равным 13. Л. Стрельцов

CCl₄

1964

Heats of mixing of CCl₄ with dioxane. I. R. McKinnon and A. G. Williamson (Univ. Otago, Dunedin, N.Z.). Australian J. Chem. 17(12), 1374-8(1964)(Eng). The heats of mixing CCl₄ with dioxane were measured at 25, 35, and 45°. The neg. values of the heat of mixing and its pos. temp. coeff. suggest a strong specific attractive interaction between CCl₄ and dioxane.

E. V. Jones

C.A. 1965. 62. 4

3465cd

CCl_4

Davis D. S.

1964

$p(\text{at})$

Chem. and Process Engng,
1964, 45, N10, 587.

Давление пара хлориро-
ванных углеводородов.

(см. CH_3Cl)

CCl₄

1964

Structure and properties of liquid carbon tetrachloride. I.
Woon-Kie Paik and Seihun Chang (Seoul Natl. Univ., Korea).
Daehan Hwahak Hwoejee 8(1), 30-2(1964)(in English). Pa-
rameters, E_s , a , θ , and V_s , in the partition function based on the
structure theory of liquids developed by Eyring, *et al.* (E. and
Hirschfelder, *CA* 31, 4174²) are detd. for CCl₄ by employing
Chang's triple point conditions. From the obtained partition
function, mol. vol., vapor pressure, crit. point, entropy of vapor-
ization, and surface tension are calcd. Tong Hyuk Ahn

C.A. 1964.61.8

8914c

CCL4.

Westrum G.F., Jr. 1964

BTT, N 7, comp. 67.

ΔHm.


CCL4

Westrum G.F., Jr.

1964

5TT, N7, comp. 67.

Δ Hm.



Литература и.и. и др.

1965

М.И.Х., 10, N10, 2372

p

Равновесие жидкость-пар
в системах SiHCl_3 —
— Ccl_4 , TiCl_4 , BCl_3 .

(Ccl. SiHCl_3) I

СССР

ВФ-М1705-IV

1966

3 Б572. Взаимодействие хлорида галлия с тетрахлоридами углерода, кремния, германия и титана. Федоров П. И., Недев С. К. «Ж. неорганической химии», 1966, 11, № 10, 2413—2415

полиморф.
превращения

Методом термич. анализа изучены бинарные системы GaCl_3 с тетрахлоридами C, Si, Ge и Ti. Все они относятся к системам с простой эвтектикой. Эвтектика в системе $\text{GaCl}_3\text{—CCl}_4$ отвечает ~92 мол.% CCl_4 и -24° . Обнаружено полиморфное превращение CCl_4 при $-42,5^\circ$. Эвтектика в системе $\text{GaCl}_3\text{—SiCl}_4$ имеет вырожденный тип и плавится при т-ре $\sim -63^\circ$. Эвтектика в системе $\text{GaCl}_3\text{—GeCl}_4$ лежит при ~93 мол.% GeCl_4 и -54° . В системе $\text{GaCl}_3\text{—TiCl}_4$ эвтектика лежит при ~90 мол.% TiCl_4 и -25° . Сделано предположение о существовании хлорида галлия в форме Ga_2Cl_6 . Реферат авторов

Х. 1967. 3

CCl_4

Gallant R. W.

1966

Hydrocarbon Process. and
Petrol. Refiner, 45, n 3, 161.

fluorescence spectra of
hydrogen, C. S. Chlorinated
methane.

(see. CH_3Cl)

CCl_4

Knappwost A.,
Schmidt W., Vogt H.

1946

Ber. Bunsenges. phys. Chem.,
70, n 9-10, 1135.

Равновесия растворимости
 FeCl_3 в CCl_4 в докритической
и закритической областях
(см. FeCl_3)

CCl₄

В90 - М 1628 - IV

1966

10 Б741. Термодинамические свойства CCl₄. Se-shadri D. N., Viswanath D. S., Kulkarni N. R. Thermodynamic properties of carbon tetrachloride. «J. Indian Inst. Sci.», 1966, 48, № 2—3, 65—80 (англ.)

Используя имеющиеся в литературе термодинамические данные по CCl₄, а также уравнения состояния Мартина и Хоу (Martin J. J. and Hou V. C. AIChE Journal, 1955, 1, 142), авторы вычислили молярный объем V , энтропию и энтальпию CCl₄ в интервале t -р 280—750° К и давл. до 200 атм. Полученные данные представлены в виде таблиц и графиков. Р. Шаповалова

Х. 1967. 10

1967

30782y Demonstration and characterization of polymorphic forms with differential thermal analysis. Gray, Allan P. (Perkin-Elmer Corp., Norwalk, Conn.). *Instrum. News* 1967, 17(3), 12-13 (Eng). From *CZ* 1967, (45), Abstr. No. 1844. To study phase transitions, a differential calorimeter was used which automatically records temp. intervals. The use of the instrument is demonstrated with CCl_4 , which is monoclinic at $< -47.7^\circ$ and has a rhombohedral configuration between -47.7° and -22.75° .
MFCR

C.A. 1968. 69.8

CCl_4

16 Б938. Фазовые отношения четыреххлористого углерода при температуре плавления. Kotake Kaya-ko, Nakamura Nobuo, Chihara Hideaki. On the phase relations of carbon tetrachloride below its melting point. «Bull. Chem. Soc. Japan», 1967, 40, № 4, 1018 (англ.)

Ранее отмечалось (РЖХим, 1967, 16Б727), что ромбоэдрич. форма CCl_4 (I) ниже точки плавл. более стабильна, чем гранецентрир. кубич. форма (II). Результаты ДТА показывают, что при кристаллизации II превращается в I. Точка плавл. II, равная $3,86 \pm 0,15^\circ$ ниже, чем для I. Аналогичное поведение наблюдается и для тв. р-ров, что подтверждает большую стабильность I. Графически представлены кривые охлаждения ДТА для чистого CCl_4 , а также диаграммы плавл. и замерзания в системе CCl_4 — трет-бутильйодид. Отмечается, что решетка II более тв. р-ритель для трет-бутильйодида, чем решетка I.

Т. Лестева

T_m

х. 1968. 16

1967

ДТХ - 0158 - 069

СССР

Распорогцев Ю. П., 1967
Ганчев Ю. А.

Изв. ВУЗ. Химия и тех.
№ 1, 79-82.

Исследование теплоёмкост-
ных излучательных свойств
борнате - $\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$

CCl_4

C_p

2-300°K

Chihara H.,
Nakamura M.
Itake T.

BIT, 1968, 11, 24 стр.

1968

CCLy

Cp

[Bp-6219-VI] 1968
Dexter A. R.
Matheson A. J.


Trans. Far. Soc., 64(10),
2632.

(W. Ne) I

CCl₄; (CH₃)₂S; (C₂H₅)₂O (ΔH_{mix})¹⁹⁶⁸

Gray D.F., Watson J.D.,
Williamson A.G., XIV-1320
Austral J. Chem., 1968, 21, N2,
379-383

1968
225850



1968

C₂Cl₄


13 Б815. Полиморфизм кристаллических соединений метилхлорметана. Rudman Reuben, Post Ben. Polymorphism of the crystalline methylchloromethane compounds. «Molec. Crystals», 1968, 5, № 1, 95—110 (англ.)

Методами рентгеноструктурного анализа получены данные о различных кристаллич. модификациях соединений $(\text{CH}_3)_n\text{CCl}_{4-n}$, где $n=0,1,2,3,4$, т. е. CCl_4 , метилхлороформа, 2,2-дихлорпропана, трет-бутилхлорида и неопентана, высокот-ные формы к-рых являются ротационно-кристаллич. Применена съемка методами Вейссенберга и порошка при низких т-рах. Монокристаллы выращены в тонкостенных капиллярах (диам. 0,1—0,3 мм) непосредственно на гониометрич. головке при охлаждении струей

крист.

структура

X. 1969. 13



хол. воздуха. Расшифрована структура трет-бутилхлорида, стабильная между -54 и -90° . Определены кристаллич. системы и элементарные ячейки ряда модификаций этой группы в-в. Рассчитаны объемы, приходящиеся на 1 молекулу и сопоставлены с имеющимися данными о вращении молекул и отдельных групп в структуре. Сделано заключение, что высокот-рные модификации изученных в-в являются динамически разупорядоченными.

Ю. Мнюх

1968

CCl₄

(XIV)
Bq-8320-XIV

Scipioni A. et al.

Chim. e ind., 50 (10),
1082.

ΔH
Kp

(sol. CCl₃F) $\bar{I}$

СДЧ (ТДЧ)

14 XII 2434

1968

Войтович Б.А., Зваровская Е.В.,

Укр. Хим. Ж., 1968, 34(9), 972-3.

Методический анализ смеси бета-
мид уксуса - бета-мид глицерина и
глицерин уксуса - бета-мид глицерина

Е.В. Зваровская
Б.А. Войтович

В.У. Ор

СД, 1968, 70, 18, 32026

1968

CCl₄C_v

117122y Determination of the heat capacity of the internal degrees of freedom of a liquid on the basis of calorimetric data. Zakharov, A. A. (USSR). *Uch. Zap. Mosk. Obl. Pedagog. Inst.* 1968, 165(7), 227-32 (Russ). The following contributions to the total heat capacity were proposed: $C_v = C_1 + C_2 + C_3 + C_4$, where C_1 , C_2 , C_3 , and C_4 are the heat capacities of intermol. vibrations, translational and rotation-vibrational movements of atoms, and the inner degrees of freedom, resp. The values of C_1 , C_2 , C_3 , and C_4 are given for PhCl, PhMe, and CCl₄ at 0-80°. L. Kuca

+2

C.A. 1969. 71. 24



196

CCl₄

111

Захаров А. А.

Научн. тр. Всес. заочн.
 университет. ин-т.
 вост. 6. 326.

ср

7699-669

О межлоённости и из-
 кои ртутни и CCl₄.

(см. Кд) I

СССР

ВФ-6697-VI

1968

Захаров А.А.

(Сv) - Научные труды Всесоюзного
Заочного машиностр. ин-та.
1968, № 6. 326-30

СССР

1969

8 Б1042. Энтальпия испарения и ее температурная зависимость для тетрахлорметана, этилбензола и хлорбензола. Bittrich Hans-Joachim, Kind Rudolf. Die Verdampfungsenthalpie von Tetrachlormethan Athylbenzol und Chlorbenzol und ihre Temperaturabhängigkeiten. «Wiss. Z. Techn. Hochschule Chem. Leuna-Merseburg», 1969, 11, № 3, 222—224 (нем.)

В циркуляционном приборе определены энтальпии испарения тетрахлорметана (I), этилбензола (II) и хлорбензола (III) при трех т-рах и экстраполированы к т-ре 298°K , при к-рой $\Delta H_{\text{исп}}$. I 31,72, II 43,60, и III 44,40 кДж/моль. Приведены различные методы расчета т-рной зависимости энтальпии испарения.

Е. Мирошниченко

 $\Delta H_{\text{исп}}$

+2

X. 1970. 8



CCl₄ ΔH_v

36586w Vaporization enthalpies of tetrachloromethane, ethylbenzene, and chlorobenzene and their temperature dependences. Bittrich, Hans J.; Kind, Rudolf *Wiss. Z. Tech. Hochsch. Chem. Leuna-Merseburg* 1969, 11(3), 222-4 (Ger). The vaporization enthalpies were detd. for tetrachloromethane, ethylbenzene, and chlorobenzene, at 3 different temps., in a circulation app. The exptl. ΔH^{LV} values were compared with literature data. The temp. variation of ΔH was calcd. by various methods. The temp. dependence of the vaporization enthalpy was detd. from: (1) the change with temp. of the molar heats of the liq. and vapor phase; (2) vapor pressure data according to the Clausius-Clapeyron equation; (3) the Clausius-Clapeyron equation, by taking into consideration the real gas behavior and the pressure-temp. data according to the Dupré-Rankine equation; (4) the Haggmacher method. The best concordance between the calcd. and detd. temp. dependence of ΔH^{LV} was found with the calcn. with c_p data. The soly. parameter was calcd. from the vaporization enthalpies extrapolated to 25° and the molar vol. For tetrachloromethane, chlorobenzene, and ethylbenzene, the soly. parameters are 17.36, 20.25, and 18.28 J^{0.5}/mole^{0.5}-cm^{3/2}.
A. Aboul-Seoud

1969

C.A. 1970. 72.8

+2



CCl₄

16P-813-XIV

1969

Beath L. A., et al.

(Annex)

J. Chem. Thermodyn. 1969,
1, N 1, 51-7.

1968

CCl₄ ΔH_f

G, S

(26137) Thermodynamics of the telomerization of ethylene with carbon tetrachloride. Beer, A. A. (USSR). *Inform. Soobshch. Gos. Nauch.-Issled. Proekt. Inst. Azoln. Prom. Prod. Org. Sin.* 1969, No. 1(Pt. 1), 51-7 (Russ). Std. heat of formation, coeffs. of the heat capacity equations, and the entropy of the reactants, $\text{CCl}_4(\text{g})$, $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$, and the products, $\text{Cl}(\text{CH}_2)_2\text{CCl}_3(\text{g})$, $\text{Cl}(\text{CH}_2)_4\text{CCl}_3(\text{g})$, and $\text{Cl}(\text{CH}_2)_6\text{CCl}_3(\text{g})$, are calcd. by the method of summed substituent group correction (M. Kh. Karapet'yants, 1953) and by using the heat of formation of CH_4 . Temp. dependence of the heat of reaction, free energy, and the $\log K$, where K is the equil. const., for the reactions are presented graphically. By considering the heat of condensation of CCl_4 and tetrachloroalkanes, and the heat of soln. of C_2H_4 in CCl_4 the heat of formation of $\text{Cl}(\text{CH}_2)_2\text{CCl}_3$, $\text{Cl}(\text{CH}_2)_4\text{CCl}_3$, and $\text{Cl}(\text{CH}_2)_6\text{CCl}_3$ in soln. at 1 atm and 298°K is -22.34, -44.02, and -65.26 kcal/mole, resp.

+ 2) C_2H_4

C-H-Cl

C.A. 1971. 45.4



91113.7205
Ch, Ex-Ch

СССР

8 (4Hv)
4 504

1969

ВФ-84-XIV

Bittrich Hans-Joachim, Kind Rudolf.

Die Verdampfungsenthalpie von Tetrachlor-
methan Äthylbenzol und Chlorbenzol und ihre
Temperaturabhängigkeiten. "Wiss. Z. Techn.
Hochschule Chem. Leuna-Merseburg", 1969,
11, N 3, 222-224 (нем.)

КОПИЯ

1181 1189

1191

1202 ПИ

ВИНИТИ

CCl₄


Campbell N. N.
Chatterjee R. M.

1969

Canad. J. Chem., 47(20),
3893

p

крит. наст.



1969

CCl_4

Chihara H. et al.

C_p 2-50°K

BIT, 1969, N 12, стр. 27

C Cl₄

C_p

C.A. 1969. 71. 20

Bp - 122 - XIV

1969

95702h Heat capacity at constant volume of carbon tetrachloride. Dass, Narsingh; Mitra, S. K. (Univ. Roorkee, Roorkee, India). *J. Phys. Soc. Jap.* 1969, 27(1), 254 (Eng). The heat capacity of CCl₄ has been computed as a function of vol. at various temps. The results obtained are better than those of D. Harrison and E. A. Moelwyn-Hughes (1957), in the sense that they are free from uncertain parameters. M. Natarajan

C_{Cl_4}

ВФ-122-XIV

1969

12 E182. Теплоемкость при постоянном объеме четыреххлористого углерода. Dass Narsingh, Mitra S. K. Heat capacity at constant volume of carbon tetrachloride. «J. Phys. Soc. Japan», 1969, 27, № 1, 254 (англ.)

C_v

С помощью литературных данных рассчитаны значения C_v для CCl_4 в зависимости от т-ры и уд. объема. Установлено, что C_v при постоянной т-ре увеличивается с уменьшением v . При постоянном v C_v увеличивается с ростом т-ры в противоположность тому, что имеет место для воды.

Л. П. Филиппов

ф. 1969. 12

CCl₄

ВФ - 122 - XIV

1969

5 Б1010. Теплоемкость четыреххлористого углерода при постоянном объеме. Eass Narsingh, Mitra S. K. Heat capacity at constant volume of carbon tetrachloride. «J. Phys. Soc. Japan», 1969, 27, № 1, 254 (англ.)

Рассчитана теплоемкость CCl₄ в функции объема при различных т-рах по ур-нию, приведенному в работе (N. Dass, N. G. Varshneya, J. Phys. Soc. Japan, 1968, 25, 1452) для определения теплоемкости воды с использованием значения объема, теплоемкости при постоянном объеме, коэф. теплового расширения и изотермической сжимаемости. Установлено, что в отличие от воды, теплоемкость CCl₄ увеличивается: при постоянной т-ре с увеличением изотермич. сжатия и при постоянном объеме с ростом т-ры. Рассчитанные данные сравниваются с данными, полученными другими методами. Л. Окунь

X. 1970. 5

Bp -114-XIV

1969

CCl_4

Hee Andrew T.
Sinke Gerard C.

$\Delta H_{\text{exp}}^\circ$

J. Chem. Thermodyn.,

ΔH_{298}°
(paren)

1969, 1, ~6, 50%

$(\text{Ccl. C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2)^{\overline{1}}$


1989

CCl₄фазовые
переходы

1 Б817. Величина скачков плотности при фазовых переходах в четыреххлористом углероде. Кожин В. М. «Кристаллография», 1969, 14, № 4, 732—734

Волюмометрическим методом измерена т-рная зависимость плотности CCl₄, начиная от 173° К и до т-ры кипения. Определены скачки увеличения плотности при переходах из жидкого состояния в твердое ($I \rightleftharpoons I'$) и при фазовом переходе в твердом состоянии ($I' \rightleftharpoons II$) равные соотв. 4,1 и 5,1%. В кач-ве стандартной жидкости использовался этанол, для к-рого предварительно была определена т-рная зависимость изменения плотности в интервале т-р 183—343° К. Автореферат

X. 1970. 1



1969

6768q Heat of mixing in the system acetic acid-carbon tetrachloride. II. Liszi, Janos (Veszpremi Vegyip. Egyet., Veszprem, Hung.). Magy. Kem. Foly. 1969, 75(10), 447-51 (Hung). The heat of mixing of the title system was calcd. theoretically, taking into account the chem. and phys. mol. interactions between monomeric and dimeric HOAc and CCl₄. Calcd. and exptl. heat of mixing data agree well. The exptl. heat of mixing data exhibit a max. value of 57.8 cal/mole at 0.4070 mole fraction CCl₄.
 G. Auslaender

ΔH_{mix}

C.A. 1970, 72.2

C - Gal

1969

Теплота
смешения

CH₃COOH -
- CCl₄

12 Б1193. Теплота смешения в системе уксусная кислота — четыреххлористый углерод. I. Liszi János.

Az ecetsav — szén-tetraklorid-elegy elegyítési entalpiaváltozása. I. «Magyar kém. folyóirat», 1969, 75, № 10, 443—446 (венг.; рез. англ.)

Исследовано волюмометрич. поведение системы уксусная к-та (I) — четыреххлористый углерод (II). Найдено, что мол. объем I в смеси уменьшается. Жидк. фаза рассматривается в предположении квазикристаллич. структуры. Смесь I—II при 20° может быть моделирована гранецентрированной кубич. решеткой. Резюме.

X. 1970. 12

C - Gal

1969

 $\text{C}_2\text{H}_3\text{COOH} +$ $\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}_4$

12 Б1194. Теплота смешения в системе уксусная кислота — четыреххлористый углерод. II. Liszi János. Az ecetsav — szén-tetraklorid-elegy elegyítési entalpiaváltozása. II. «Magyar kém. folyóirat», 1969, 75, № 10, 447—451 (венг.; рез. англ.)

Номинально двойная система уксусная к-та — четыреххлористый углерод (I) трактуется как реальная тройная смесь $A-A_2-B$. Компонентами реальной смеси являются мономерная уксусная к-та (II), димерная уксусная к-та (III) и I. Для компонентов реальной смеси определены средние энергии молек. взаимодействия и энергии взаимного обмена. Теплота смешения была вычислена с учетом того, что как смещение хим. равновесия, так и межмолек. энергии вносят вклад в ее значение. Поэтому были приняты во внимание следующие

II смеше-
ний

X. 1970. 12

частные процессы: разделение II и III; диссоциация III в кол-ве, соотв-щем константе равновесия, отнесенной к чистой уксусной к-те; образование III в кол-ве, соотв-щем константе равновесия, выраженной с помощью фактических мольных долей; смешение I, II и III. Теплота смешения при 20° была также определена экспериментально с целью проверки расчетных величин. Со-
общ. I см. пред. реф. Резюме

$\text{CCl}_4 (\Delta H_f)$ [BQ-XIV 1819] 1969
Zord A., Pritchard H. O.,
J. Chem. Thermodyn., 1969, 1, N°5, 495-
- 8 (abbr.)

Thermodynamics of the reac-
tion between carbon dioxide
and carbon tetrachloride.

M.

(2)

CA, 1970, 43, N18, 92317S

1969

CCl₄ (2)C_p

(64935g) Calculation of the heat capacities of gaseous substances from tensimetric measurement data. Polyachenok, O. G. (Beloruss, Tekhnol. Inst. im. Kirova, Minsk, USSR). *Zh. Fiz. Khim.* 1969, 43(6), 1419-22 (Russ). An expression is derived for calcg. the av. heat capacity of gases by using accurate satn. vapor pressures and condensate heat capacities. $\Delta C_p = \Delta C' + \Delta H/T$ and C_p (gaseous) = $\Delta C' + \Delta C_p$ (condensed) + $\Delta H/T$ where ΔC_p is the change in heat capacity during vaporization, $\Delta C' = 1.726 \times 0.580 \times a$ with a being an expt. detd. const., ΔH is the heat of vaporization, T is temp., C_p (gaseous) is gas heat capacity at a fixed pressure, and ΔC_p (condensed) is the heat capacity of the condensate at a fixed pressure. Calcd. heat capacities of gaseous Hg and CCl₄ are in good agreement with expt. data.

M. Simmer

C.A. 1969. 71. 14



1968

СССР

Weir C. Z. и др.

J. Chem. Phys., 50(5),
2089.

Струнгуца

(Chem C₆H₆) I

СССР (Ср)

14

XIV 2466

1969

Захаров А. А.

6 а 8 я

Чёрные Золоты, Моск. Вд. Педагогич.
Ун-та, 1968, 165(7), 227-32.

Определение температурности внут-
ренних степеней свободы терм.
костной на основании кинетич.

Б (СР) 5 б

риширование для
СН, 1969, 4, 124, 117-124.

Аргон (Ar)

6 14

VI 6697

1969

CCU (Cv)

СССР (Ср)
Захаров А.А.

6

Научные труды Вессоюзного
Заочного Научноисследоват. ин-та
1968, № 6, 326-30.

Немелкокость жидкой ртуте
и четыреххлористого углерода.

53

19

OR, 1969, 74, NY, 64910e

1970

CCl₄

ΔH_{mix}

under

measured

(134495f) Thermodynamic study of the bromine-carbon tetrachloride system. II. Measurement of the excess values of enthalpy and volume of mixtures. Barthel, Charles (Fac. Sci., Ecole Super. Brass., Malt. Biochim. Appl., Nancy, Fr.). *Bull. Soc. Chim. Fr.* 1970, (7), 2488-91 (Fr). The excess mixing enthalpy (H^e), detd. by adiabatic calorimetry, for the Br₂-CCl₄ system at 22.85° was pos. for all Br₂ mole fractions (x): $H^e = x(1 - x)(731.4 + 282.1x)$ cal/mole, with a max. of $H^e = 219.5$ cal/mole for $x = 0.540$. The exptl. H^e 's agreed very well with those calcd. from 2 free-energy-of-mixing isotherms detd. at -0.42 and 19.90° (B., 1970). The partial excess enthalpies (h^e , in cal/mole) of CCl₄ and Br₂, resp., are: $h_1 = x^2(449.3 + 564.2x)$, $h_2 = (1 - x)^2(731.4 + 564.2x)$. The excess mixing vols. (V^e), detd. by pycnometry at 20°, were pos. for all x : $V^e = x(1 - x)(1.86 + 0.97x - 1.06x^2)$ cm³/mole, with a max. of $V^e = 0.52$ cm³/mole.
DWJF

(+1)

⊠

C. A. 1970 43.26

1970

CCl₄

ΔH_{mix}

refr.

meas

(134495f) Thermodynamic study of the bromine-carbon tetrachloride system. II. Measurement of the excess values of enthalpy and volume of mixtures. Barthel, Charles (Fac. Sci., Ecole Super. Brass., Malt. Biochim. Appl., Nancy, Fr.). *Bull. Soc. Chim. Fr.* 1970, (7), 2488-91 (Fr). The excess mixing enthalpy (H^e), detd. by adiabatic calorimetry, for the Br₂-CCl₄ system at 22.85° was pos. for all Br₂ mole fractions (x): $H^e = x(1 - x)(731.4 + 282.1x)$ cal/mole, with a max. of $H^e = 219.5$ cal/mole for $x = 0.540$. The exptl. H^e 's agreed very well with those calcd. from 2 free-energy-of-mixing isotherms detd. at -0.42 and 19.90° (B., 1970). The partial excess enthalpies (h^e , in cal/mole) of CCl₄ and Br₂, resp., are: $h_1 = x^2(449.3 + 564.2x)$, $h_2 = (1 - x)^2(731.4 + 564.2x)$. The excess mixing vols. (V^e), detd. by pycnometry at 20°, were pos. for all x : $V^e = x(1 - x)(1.86 + 0.97x - 1.06x^2)$ cm³/mole, with a max. of $V^e = 0.52$ cm³/mole.
DWJF

(H)

⊠

C. A. 1970 43.26

1970

CCL₄

Chihara H. и гр.

БТТ, N 13, стр. 22.

C_s, 2-500K

CCL₄

Chang & T.

1970

Westcum & F.


J. Phys. Chem., 74 (12),
2528

Cp

[coll. C(CH₃)₄]I

C - Gal

1970



17 Б680. Энтальпия смешения четыреххлористого углерода с бензолом при 288,15 и 318,15° К. Ewing M. B., Marsh K. N., Stokes R. H., Tomlins R. P. Enthalpies of mixing of carbon tetrachloride + benzene at 288,15 and 318,15° К. «J. Chem. Thermodyn.», 1970, 2, № 2, 297—298 (англ.)

Калориметрически определены энтальпии смешения CCl_4 с C_6H_6 при 288,15° и 318,15° К во всем диапазоне концентраций. Результаты табулированы. С. Бык

ΔH
смешения

X. 1970. 17

Ccl₄

p

Bp - 1618 - XIV

Hlavatý K.

1930

Collect. Czech. Chem.
Commun, 35 (10), 2878

($\text{Cu} \cdot \text{CS}_2$) I

CCl₄

Liszi y.

1970

Acta chim. Acad.
scient. hung., 63(4),
363.

4 H₂SO₄

(sol. CH₃COOH)

Bp-133-XIV

CCl₄

Liszi Y.

1970

Acta chem. Acad.
scient. hung.,
63(4), 371

ΔH ~~several~~

(sol. CH₃COOH)

CCL₄

Bp-337-XIV 1970

Horvath A. L.

(Ter, Per, Ver) Brit. Chem. Eng.
1970, 15, 1555.

СССР (р-р)

ВФ - 356 - XIV

1970

9 Б1202. Избыточные свободные энтальпии и избыточные энтропии смешения для смесей уксусная кислота — четыреххлористый углерод. Liszi J. The excess free enthalpy and excess entropy of mixing of acetic acid-carbon tetrachloride mixture. «Acta chim. Acad. sci. hung.», 1970, 66, № 1, 47—53 (англ., рез. рус.)

Проведена колич. обработка результатов, полученных в ранних работах автора. Расчет изменения избыточной свободной энтальпии (G^E) и избыточной энтропии (S^E) при смешении CH_3COOH (А) и CCl_4 (В) во всем интервале составов (т-ра 20°) проведен в предположении, что указанная система фактически является регулярной

 ΔH_{ad}

X. 1971. 9

+1



трехкомпонентной смесью типа $A - A_2 - B$, где A_2 — димер CH_3COOH . Показано, что G^E можно рассматривать как сумму двух слагаемых — $G_{асс}^E$ и $G_{реал}^E$, где $G_{асс}^E$ — вклад в G^E , соотв-щий образованию A_2 и $G_{реал}^E$ — реальный вклад в G^E в результате образования трехкомпонентной смеси. Найдено, что по величине оба эти вклада имеют одинаковый порядок. Значения G^E , $G_{асс}^E$, $G_{реал}^E$ и TS^E табулированы и представлены графически.

А. С. С.

$\text{CH}_3\text{COOH} \cdot (\text{CCl}_4)$

Ratkovics F.

1970

Magy. Kem. Foly.,

1970, 76, 4, 190.

ΔH_{mix}

ρ

 $(\text{cm. cm}_3\text{COOH})^{-1}$

CCl₄

1971

15 Б576. Теплоемкость твердого четыреххлористого углерода от 3 до 50° К. Atake Тоогу, Chihara Hideaki. Heat capacity of solid carbon tetrachloride from 3 to 50° К. «J. Chem. Thermodyn.», 1971, 3, № 1, 51—60 (англ.)

В адиабатич. калориметре измерена теплоемкость C_p тв. CCl_4 от 3 до 50° К. Коммерческий CCl_4 с чистотой >99,0 мол. % очищался фракционной дистилляцией над $CaCl_2$ в течение 2 дней, примеси газов в CCl_4 вымораживались. Табулированы величины C_p CCl_4 в интервале 3—50° К; отклонения табличных величин от сглаженной кривой находятся в пределах 1% при $T=5-10^\circ$ К и 0,1% при $T=30-40^\circ$ К. Графич. интегрированием зависимости $C_p/T-T$ получена S_{298}^0 CCl_4 (газ.) = $74,2 \pm 0,3$ э. е. Т-ра Дебая при 0° К оказалась равной $(100,3 \pm 2,7)^\circ$ К. Обсужден частотный спектр колебаний молекул CCl_4 .

П. М. Чукуров

 C_p Θ_D

X. 1971.15

V
555 - XIX
B9p - 1055 - XIX

ca. 4

1974

9 E589. Теплоемкость твердого тетрахлорида углерода в области температур 3—50° К. Atake Тоогу, Chihara Hideaki. Heat capacity of solid carbon tetrachloride from 3 to 50 K. «J. Chem. Thermodyn.», 1971, 3, № 1, 51—60 (англ.)

Ep

B99-1055-XIV

Sp. 1971.98

CCl₄ (neb)

1971

91948g Heat capacity of solid carbon tetrachloride from 3 to 50°K. Atake, Tooru; Chihara, Hideaki (Fac. Sci., Osaka Univ., Osaka, Japan). *J. Chem. Thermodyn.* 1971, 3(1), 51-60 (Eng). The heat capacity of solid CCl₄ was measured at 3-50°K. The results compare favorably with previous measurements >20°K. The std. entropy for the gas was revised to (74.2 ± 0.3) cal/mole-degree in comparison with the spectroscopic entropy of 74.03 cal/mole-degree at 25°C. From the anal. of low temp. heat capacities, the Debye temp., at 0°K was derived as $(100.3 \pm 2.7)^\circ\text{K}$. The av. mol. librational waveno., in the Einstein approxn. was 40 cm^{-1} in agreement with the predictions from other expts. However, it is suggested that the librational spectrum has a distribution of frequencies towards lower frequencies. Approx. values of the pos. moments of the frequency spectrum were estd. RCSM

11X-5505-068

C. S. 1971. 74. 18

1971

CCh₄Derivation of internally
consistent equations for(ΔG)explicit relations of the ther-
modynamic properties of gases
to temperature and pressure

Antonow D.A.

Dokl. Akad. Nauk SSSR 1971, 1,
3-5 (Russ)C.A. 1974. 80. N26[see NH₃; T]

CCl₄(T_B)

(C_p, T_{tr}

ΔH_{tr})

XIV-2715

1971

01003j Heat capacity of solid carbon tetrachloride. Bagatskii, M. I.; Manzhelii, V. G. (Fiz.-Tekh. Inst. Nizk. Temp., Kharkov, USSR). *Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.)* 1971, 16(7), 1088-94 (Russ). The heat capacity, C_p , of solid CCl_4 was detd. at 2-20 and 200-230°K in an adiabatic calorimeter described previously (Bagatskii, et al., 1968). The dependence of the temp. of the calorimeter on time, t , was detd. for the evaluation of the phase transition temp., T_{tran} . For $T_{\text{tran}} = \pm 3^\circ\text{K}$, $dT/dt = 5 \times 10^{-3}$ degree/min. At 225.28-225.36°K, it was const. at 7×10^{-3} degree/min for 18 hr. The av. $T_{\text{tran}} = 225.32^\circ\text{K}$. The heat effect at 224.94-226.99°K was 1134 cal/mole. Expt. C_p agreed with that calcd. by $\Sigma C = C_T + C_{rl} + C_{int}$, where C_T , C_{rl} , and C_{int} are the heat capacities of lattice translational vibrations, mol. rotation, and intramol. vibrations, resp. The agreement is not as good as for CF_4 and the difference increased above 45°K. To eliminate the difference, the excessive mol. enthalpies and entropies must be taken into account.

C.A. 1971. 45. 14

ССl₄

XIV-2415

1971

Ср

12 Е1124. Теплоемкость твердого CCl₄. Багаць-
кий М. І., Манжелін В. Г. «Теплоемність твердого
CCl₄. «Укр. фіз. ж.», 1971, 16, № 7, 1087—1093 (укр.;
рез. англ., рус.); «Укр. фіз. ж.», 1971, 16, № 7, 1088—
1094 (рус.; рез. англ.)

Определена теплоемкость твердого CCl₄ в интервалах
т-р 2—20° К и 200—230° К. Разделены вклады в тепло-
емкость CCl₄, обусловленные трансляционными колеба-
ниями кристаллич. решетки, внутримолекулярными ко-

Ф. 1971. 128

лебаниями, либрациями молекул и процессами ориентационного разупорядочения. Проанализирован вклад, обусловленный процессами ориентационного разупорядочения ($\Delta C_{ор}$), обсуждены возможные способы его аналитич. описания, предложена интерпретация обнаруженных особенностей температурной зависимости $\Delta C_{ор}(T)$. Полученные результаты сопоставлены с аналогичными данными для твердого CF_4 . Показана неправомерность описания ориентированного разупорядочения в твердых

CF_4 и CCl_4 лишь на основании данных о фазовых превращениях в кристаллич. состоянии. Библи. 17.

CCl₄

XIV - 2415

1971

Sp) 23 Б790. — Теплоемкость твердого CCl₄. Багацький М. І., Манжелій В. Г. Теплоємність твердого CCl₄. «Укр. фіз. ж.», 1971, 16, № 7, 1087—1093 (укр.; рез. англ., рус.); «Укр. фіз. ж.», 1971, 16, № 7, 1088—1094 (рус.; рез. англ.)

Определена теплоемкость тв. CCl₄ в интервалах т-р 2—20° К и 200—230° К. Разделены вклады в теплоемкость CCl₄, обусловленные трансляц. колебаниями крист. решетки, внутримол. колебаниями, либрациями молекул и процессами ориентац. разупорядочения. Проанализирован



X. 1971. 23

вклад, обусловленные процессами ориентац. разупорядочения (ΔC_{op}), обсуждены возможные способы его аналитич. описания, предложена интерпретация обнаруженных особенностей т-рной зависимости $\Delta C_{op}(T)$. Полученные результаты сопоставлены с аналогичными данными для тв. CF_4 . Показана неправомерность описания ориентац. разупорядочения в тв. CF_4 и CCl_4 лишь на основании данных о фазовых превращениях в крист. состоянии.

Резюме

Ccl₄

P[?]

¹⁹⁴¹
Gammenga H.R., et al
Fortschrittsber.

Kolloide und Polym.,

1941, 55, Suppl., 118



(Ccl₄ H₂O) I

1971

СССР

7 Б257. Спектры комбинационного рассеяния твердого CCl_4 и изотопически обогащенного C^{35}Cl_4 . Шуг-вель Н. F. The Raman spectrum of solid CCl_4 and isotopically enriched C^{35}Cl_4 . «Spectrochim. acta», 1971, A27, № 11, 2375—2383 (англ.)

крист.
стр-ра

Измерены спектры КР тв. CCl_4 и C^{35}Cl_4 с высоким разрешением при т-рах 4—80, 100, 200° К. Линия КР, относящаяся к вал. кол. $\nu_1(A_1)$ расщепляется на пять компонент, соотв-щих пяти изотопным производным CCl_4 : C^{37}Cl_4 , $\text{C}^{35}\text{Cl}^{37}\text{Cl}_3$, $\text{C}^{35}\text{Cl}_2^{37}\text{Cl}_2$, $\text{C}^{35}\text{Cl}_3^{37}\text{Cl}$, C^{35}Cl_4 . Спектр поликрист. пленки C^{35}Cl_4 в области вырожденных колебаний $\nu_2(e)$ и $\nu_4(f_2)$ показывает, что расщепление, наблюдающееся для этих полос в естественном CCl_4 , обусловлено крист. эффектами, а не изотопич. расщеплением. Наблюдаемый спектр согласуется с моноклинной крист. структурой тв. CCl_4 , к-рая является устойчивой формой при т-ре ниже 225° К. А. П. Курбакова

X. 1972. X

CCl₄ (XIV)
Bp-4630-XIV

$T_m; \Delta H_{tr}$

X. 1973.
N 4.

4 B817. Четыреххлористый углерод. Определение энтальпии перехода четыреххлористого углерода из метастабильной кубической гранецентрированной модификации в устойчивую ромбоэдрическую модификацию. Arentsen J. G., Miltenburg J. C. van. Carbon tetrachloride. Determination of the enthalpy of transition from metastable face-centered cubic carbon tetrachloride to the stable rhombohedral modification. «J. Chem. Thermodyn.», 1972, 4, № 5, 789—791 (англ.)

Калориметрическим методом (адиабатич. условия), путем измерения теплоемкости стабильной ($C_p^{ст}$) и метастабильной ($C_p^м$) модификаций CCl₄ (I) и энтальпии плавления стабильной ($\Delta H_{ст}$) и метастабильной (ΔH_m) модификаций I определена энтальпия перехода (ΔH_n) из метастабильной кубич. гранецентрированной модификации I в стабильную ромбоэдрич. модификацию. Т. п. л. стабильной и метастабильной (T_m) модификаций I равны 250,28 и 245,70° К соотв. $C_p^{ст}$ и $C_p^м$ меняются от 124,0 до 131,8 и от 120,2 до 131,4 дж/°К·моль при изменении т-ры от 243,16 до 256,10 и от 243,40 до 253,74° К соотв., при этом $\Delta H_{ст}$ и ΔH_m равны 2558 и 1848 дж/моль соотв. Величина ΔH_n зависит от изменяющейся т-ры перехода (T_n) и вычисляется по ур-нию: $\Delta H_n = 685 + (T_m - T_n)(C_p^{ст} - C_p^м)$ дж/моль. С. С. Плоткин

1972

оттиски 4843

1972

CCl₄

Boublik T., Aim R.

(p)

Collect. Czech. Chem.

Commun., 1972, 37, N 11,
3513-3521.

Cell CS₂; I.

Ccl₄

Geller, Z.I;

Ponomareva, O.P.

Porichanskii, E.G.

1972

(Cr)

"Izv. Vyssh. Ucheb. Zaved.,
Pribarosiz." 1972, 15, №6,
113-116.

(coll. H₂O, (Cr), I)

CCl_4

1972

Gohly, Emil.

Verfahrenstechnik. (Mainz)

1972, (10), 368,

.....

$\text{Cp}^+; \text{H}-\text{H}_2^0$

● $[\text{Cu}(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{O}^+; \bar{1})$

CCL₄

A. S. Rodgers, R. C. Wilhoit,
B. J. Zwolinski

1972

100

(T. g. p)
(4 Hr^o)

Nat. Bureau of Standards -
- office of stand. reference
data

1972, 31-41

(owner)

1973

ccly

Тер. мод.
ев-ба

Dorfmüller, Thomas
Ber. Bunsenges. Phys. Chem.
1973, 77, N5, 317-25.

(cur. Ar; I)

1973

CCU

3 E112. Дебаевская температура в неассоциированной жидкости. Ког S. K., Miss, Agarwal Asha, Prasad Rajendra. Debye temperature in non-associated liquid. «Acustica», 1973, 29, № 4, 240—241 (англ.)
На основе предположения о том, что жидкое состояние ближе к твердому, чем к газообразному, определены т-ры Дебая для четыреххлористого углерода и толуола как ф-ции т-ры. Как и следовало ожидать, т-ры Дебая этих в-в падают с ростом т-ры. А. Антанович

Q₂

Р.М.Ф. 1974.3Е.

CCl₄

(T₁₂)

X. 1974
N 6

26 Б761. Доказательства фазовых переходов в четырёххлористом углероде чисто квадрупольным резонансом хлора. Murata Shigeo, Fujita Kazuyoshi, Suhara Masahiko. Chlorine pure quadrupole resonance in carbon tetrachloride evidence for phase transitions. «Chem. Lett.», 1973, № 10, 1067—1070 (англ.)

Исследована температурная зависимость частот ЯКР (^{35}Cl) в четырёххлористом углероде в диапазоне температур 77—110° К. Обнаружено три фазовых перехода в области температур 77—90° К (А), 90—100° К (В) и 90—110° К (С). В области А спектр ЯКР состоит из 15 близко расположенных линий; средн. температурный коэф. —11,8 кгц/°К. Для области В средн. температурный коэф. 16 линий —12,0 кгц/°К. В области С спектр состоит из 15 линий при 92—102° К и 14 линий при 106—110° К; средн. температурный коэф. —6,2 кгц/°К. По теории Байера получены след. частоты крут. кол.: 40; 40 и 55 см⁻¹ для фаз А, В, С соотв. Поскольку различия в температурных коэф. для каждой из линий малы, предположено, что наблюдае-

мые фазовые переходы обусловлены небольшим изменением крист. структуры.

В. П. Казаков

1973

1125-521
XIV-114

XIV-5211

1973

CCl₄(T_{tr})

141207k Chlorine pure quadrupole resonance in carbon tetrachloride. Evidence for phase transitions. Murata, Shigeo; Fujita, Kazuyoshi; Suhara, Masahiko (Fac. Sci., Kanazawa Univ., Kanazawa, Japan). *Chem. Lett.* 1973, (10), 1067-70 (Eng). The temp. dependence of ³⁵Cl pure NQR frequency in CCl₄ at 77-110°K exhibited discontinuous behavior attributable to phase transitions. The vibrational-rotational frequency of phases present at 77-90, 90-100, and 90-110°K were detd. as 40, 40, and 55 cm⁻¹, resp. The H. S. Gutowsky and D. W. McCall anal. (1960) does not give the correct result because of their failure to find the phase transitions.

CA1973

79 N24

#4-2587

1973

CCl₄

6 Б666. Термохимия бромирования четыреххлористого углерода и теплота образования четыреххлористого углерода. Mendenhall G. D., Golden D. M., Benson S. W. Thermochemistry of the bromination of carbon tetrachloride and the heat of formation of carbon tetrachloride. «J. Phys. Chem.», 1973, 77, № 22, 2707—2709 (англ.)

С помощью спектрального и хроматографич. анализов для константы равновесия р-ции $\text{Br}_2 + \text{CCl}_4 \rightleftharpoons \text{BrCl} + \text{CBrCl}_3$ (1) при $559 \pm 1^\circ \text{K}$ получено $K_p = 0,0046 \pm 0,001$, откуда $\Delta G_{559}^\circ = 5,98 \pm 0,3$, $\Delta H_{298}^\circ = 8,84 \pm 0,3$ и $\Delta G_{298}^\circ = 7,15 \pm 0,3$ ккал/моль. С использованием лит. данных для р-ции $\text{Br}_2 + \text{CHCl}_3 \rightleftharpoons \text{HBr} + \text{CBrCl}_3$ (2) для разности теплот образования CCl_4 и CHCl_3 получено $2,27 \pm 0,3$ ккал/моль при 298°K . Вместе с калориметрич. значением ΔH° (обр., CHCl_3) $= -24,66 \pm 0,3$ ккал это дало ΔH° (обр., CCl_4) $= -22,4 \pm 0,4$ ккал, что хорошо согласуется с лит. значением $-22,9 \pm 0,3$ ккал, полученным калориметрически. Значение ΔH (обр., CCl_4) сопоставляется с др. лит. данными. Данные для р-ций (1) и (2)

ΔH; ΔG

CBrCl₃
CHCl₃

+2

☒

х. 1974
№6

использованы для расчета энтальпий диссоциации (DH_{298}°) связей $\text{CCl}_3\text{—Cl}$, $\text{CCl}_3\text{—H}$ и $\text{CCl}_3\text{—Br}$, составивших, соотв., $70,4 \pm 1$, $95,8 \pm 1$ и $55,7 \pm 1$ ккал/моль.

А. Гүзей

1973

CCl₄ (gas) ΔH_f° Do (CCl₃-Cl)

150106j Thermochemistry of the bromination of carbon tetrachloride and the heat of formation of carbon tetrachloride. Mendenhall, G. D.; Golden, D. M.; Benson, S. W. (Dep. Thermochem. Chem. Kinet., Stanford Res. Inst., Menlo Park, Calif.). *J. Phys. Chem.* 1973, 77(22), 2707-9 (Eng). At 560°K the equil. const. for the reaction $\text{Br}_2 + \text{CCl}_4 \rightleftharpoons \text{BrCl} + \text{CBrCl}_3$ was detd. as 0.0046 ± 0.001 by combined optical and chromatog. techniques. From this result and literature data the heat of formation difference $\Delta H_f^\circ(\text{CCl}_4, \text{g}) - \Delta H_f^\circ(\text{CHCl}_3, \text{g}) = 2.27 \pm 0.3$ kcal/mole was calcd. at 298°, independent of calorimetry. Based on $\Delta H_f^\circ(\text{CHCl}_3, \text{g}) = -24.66 \pm 0.3$ kcal/mole, $\Delta H_f^\circ(\text{CCl}_4, \text{g}) = -22.4 \pm 0.4$ kcal/mole was obtained, a higher value than obtained from many earlier studies. The CCl₃-Cl bond strength is estd. as 70.4 ± 1 kcal/mole.

C. A.

1973, N26, 79

XIV-5411

1973.

CCl_4

Nagashima Makoto;
et al.

(ΔH_f)

"Bull. Chem. Soc. Jap."
1973, 46, N11, 3348-52.

(crs. CS_2 ; I)

CCl₄

✓ 7 E467. Кристаллическая и молекулярная структура CCl₄ III полиморфной модификации высокого давления при давлении 10 кбар. Piermarini G. J., Braun A. B. Crystal and molecular structure of CCl₄ III: a high pressure polymorph at 10 kbar. «J. Chem. Phys.», 1973, 58, № 5, 1974—1982 (англ.)

1973

В бериллиевой камере высокого давления с алмазными наковальнями при давлении порядка 10 кбар определены кристаллич. и молекулярная структура фазы CCl₄ III, которая кристаллизуется в моноклинную решетку с параметрами ячейки $a=9,079\pm0,012$ Å, $b=5,764\pm\pm0,003$ Å, $c=9,201\pm0,004$ Å, $\beta=104,29\pm0,05^\circ$ и четырьмя молекулами в ячейке. На основе анализа данных ИК-спектров установлено, что молекула CCl₄ обладает тетраэдрич. симметрией, фаза CCl₄ III изоструктурна SnBr₄ и самое короткое несвязанное расстояние Cl—Cl составляет 3,49 Å, что значительно меньше вытекающей из ван-дер-ваальсова взаимодействия величины 3,60 Å. Предсказана и обнаружена путем оптич. наблюдений более плотная фаза CCl₄ IV при давлениях 35—40 кбар и т-рах до 500° С. Е. С. Алексеев

ф. 1973.

№ 7

30717.8819
TE, Ch, Ex-C

CCly
(allv)

40892

X

1973
4-1074

Wilhelm Emmerich, Battino Rubin.

On the calculation of heats of vaporization from hard sphere equations of state.

"J.Chem.Phys.", 1973, 58, N 9, 3561-3564

(allv.)

0917 ВИК

895 896

ВИНИТИ

CC4

1973

Yushin A.S., et al.
Zh. Fiz. Khim., 1973, 47(7),
1828-31.

(AH7)

(see BF₃; I)

CCl_4

+ 1974

$(T_c; d_c)$

X 140932c Critical constants of liquids as a function of volume variations. Popovici, Vasile (Bucharest, Rom.). *Rev. Fiz. Chim., Ser. A* 1974, 11(6), 211-18 (Rom). Good agreement with the available exptl. data, on the crit. temps. (T_c) and crit. ds. (d_c) for a no. of common liqs. (e.g. C_6H_6 , PhMe , CCl_4 , CHCl_3 , n -hexane, SnCl_4 , Et_2O), was obtained in calcns. with the derived formulas $T_c = (1/2)[(1/\alpha) + T]$ and $d_c = d/2[2 - (T/T_c)]$, where T is the abs. temp., d is the d., and α is the vol. thermal expansion coeff.
G. Auslaender

C. A. 1974. 81 N22

+4



CCl_4

1974

Rodgers A.S et.al.,
J. Phys. and Chem. Ref. Data.,
1974, 3, N1, 117-140.

$\Delta H_v; \Delta H_f$

(cor CH_3Cl ; I)

PCL₄

Bp-6151-XIV

1974

(Do)

Wang J.
Ling-Fai, Margrave J.D.

"J. Chem. Phys." 1974, 61, NY,
1357-1360 (anal)

(as SiCl₄; III)

Q. 1975. N2.

41022.6699

Ch

50701 83

1974

CCl₄ / SiCl₄; SnCl₄ (A.H.m.) XIV 6066

Всп-6066 - XIV
Wilhelm Emmerich, Zettler M., Sackmann H.
 Mlowärmen binärer Systeme aus Cyclohexan,
 Kohlenstofftetrachlorid, Siliziumtetrachlorid
 und Zinntetrachlorid. "Ber. Bunsenges. phys. Chem.", 1974, 78, N 8,
 795-804.
 (нем., рез. англ.)

188 189

0209

BCP

0212
 ВИНИТИ

Зап 6020

ССе₄

T_{tr}

ΔH_{tr}

ΔS_{tr}

1975

2 Б1040. Система хлор — четыреххлористый углерод. Полиморфизм четыреххлористого углерода. Abassalti Mansourhe, Michaud, Maurice. Système chlore-tétrachlorure de carbone. Polymorphisme du tétrachlorure. «Rev. chim. minér.», 1975, 12, № 2, 134—138 (франц.; рез. англ.)

Методом ДТА изучены фазовые превращения CCl_4 (I) и диаграмма состояния системы Cl_2 — I. Обнаружено, что I образует при $-27,1^\circ$ метастабильную тв. фазу, а при $-22,8^\circ$ кристаллизуется в орторомбич. модификации, к-рая при $-47,5^\circ$ обратимо переходит в моноклинную. Найденные величины энтальпий и энтропий переходов в орторомбич. и моноклинную фазу составили 440 и 340 кал/моль и 1,7 и 1,38 э. е. соотв. Система Cl_2 — I имеет одну эвтектику, т. пл. к-рой $-114,4^\circ$. Хим. соединений в изученной системе не обнаружено. Определены энтальпия и энтропия плавления Cl_2 : 1,3 ккал/моль и 7,6 э. е.

Ж. Василенко

№ 1976 №2

CCl_4

1975

(Ttr)
($\Delta H_m, \Delta S_m$)

209827h Chlorine gas-carbon tetrachloride system. Polymorphism of the tetrachloride. Abassalti, Mansourhe; Michaud, Maurice (Lab. Chim. Miner. Sels, Univ. Pierre-et-Marie-Curie, Paris, Fr.). *Rev. Chim. Miner.* 1975, 12(2), 134-8 (Fr). Depending on thermal treatment CCl_4 crystallizes either at -22.8° or -27.1° . The higher temp. corresponds to the equil. liquid $\rightleftharpoons$ rhombohedral crystals, and the lower to the formation of metastable fcc. crystals. The rhombohedral phase is transformed reversibly at -47.5° to monoclinic crystals which are stable above that temp. No new compds. are formed in the Cl_2 - CCl_4 system. There is one eutectic at -114.4° . Values of ΔH and ΔS for melting of Cl_2 and of the stable and metastable forms of CCl_4 were estd. A. J. Miller

(41) Cl_2 ☒  ($\Delta H_m, \Delta S_m$)

C.A. 1975. 83 N26

CCl₄ (тв)

XIV-6452

1975

22 Б929. Полиморфизм в твердом CCl₄. Коган, Morrison J. A. Polymorphism in solid CCl₄. «J. Chem. Phys.», 1975, 62, № 8, 3359—3361 (англ.)

(T_m ; T_{tr})
Оптическим методом (двулучепреломление) изучены полиморфизм и фазовые переходы в тв. CCl₄. Кубич. фаза Ia всегда образующаяся при медленном охлаждении жидкости (т. пл. 250,3 К), представляет собой пластич. кристаллы, характеризующиеся низкой энтропией плавления. При более быстром охлаждении жидкости, образующаяся вначале фаза Ia при понижении т-ры < 240 К переходит в ромбоэдрич. фазу Ib (интервал перехода 231—242 К). При т-ре 225,5 К происходит фазовый переход в монокл. модификацию II. Переход может реализоваться в последовательности Ia—Ib—II или по схеме Ia→II←Ib. Оптич. характеристики фаз (источник — вольфрамовая лампа): Ia $|n_e - n_o| 1 \cdot 10^{-5}$; Ib $1,10 \cdot 10^{-3}$, II $\gg 1 \cdot 10^{-3}$.
Т. Л. Хоцянова

X. 1975. N 22

CCl₄

13-12770

1976

17 Б502. О полиморфизме четыреххлористого углерода при атмосферном давлении. Badiali Jean-Pierre, Bruneaux-Pouille Janine, Defrain André. Sur le polymorphisme du tétrachlorure de carbone à la pression atmosphérique. «J. chim. phys. et phys.-chim. biol.», 1976, 73, № 1, 113—114 (франц.; рез. англ.)

Т_{тх}; Т_м

Проведено рентгенографич. (метод порошка) и термич. изучение CCl₄ с целью устранения нек-рых неопределенностей, касающихся полиморфизма этого соединения при атмосферном давл. Ромбоэдрич. фаза, стабильная при 225,4—250,4° К, может быть получена непосредственно из расплава при больших скоростях охлаждения или при переходе из гранецентр. кубич. фазы, метастабильной при всех т-рах и плавящейся при 245,5° К. Ниже 225,4° К наиболее стабильной является монокл. форма, к-рая может быть также получена непосредственно из кубич. фазы охлаждением образцов малой массы. Показано, что т-ры переходов CCl₄ не являются собственными св-вами этого в-ва, а зависят от скорости охлаждения, массы и чистоты образцов.

В. П. Мартовицкий

х. 1976

N17

11V-4329

X-12776

1976

CCl₄

9 E866. О полиморфизме четыреххлористого углерода при атмосферном давлении. Badiali Jean-Pierre, Bruneaux-Pouille Janine, Defrain André. Sur le polymorphisme du tétrachlorure de carbone à la pression atmosphérique. «J. chim. phys. et phys.-chim. biol.», 1976, 73, № 1, 113—114 (франц.; рез. англ.)

Методами термич. анализа и рентгеновской дифракции исследовался полиморфизм CCl₄ при атмосферном давлении. Ромбоэдрич. фаза *I_b* стабильна в интервале т-р 225,4—250,4° К. ГЦК-фаза *I_a* плавится при 245,5° К. Моноклинная фаза II существует при т-рах ниже 225,4° К. Возможно переохлаждение жидкости вплоть до 239° К. Фаза *I_b* может быть получена непосредственно при кристаллизации жидкости или из фазы *I_a*. Наблюдался также прямой переход *I_a*→II. Показано, что границы температурной области метастабильности фаз *I_a*, *I_b* или жидкости существенно зависят от условий эксперимента — скорости охлаждения, массы и чистоты образца.

А. И. Коломийцев

(T_m, T_{cc})

Ф. 1976 N 9

XIV-7329

СССР

ВФ - 7077 - XIV

1976

 C_2H_5OH

17 Б791. Теплоемкости некоторых органических жидкостей, измеренные в проточном калориметре Пикера. Fortier Jean-Luc, Benson George C., Picker Patrick. Heat capacities of some organic liquids determined with the Picker flow calorimeter. «J. Chem. Thermodyn.», 1976, 8, № 3, 289—299 (англ.)

 (C_p)

В проточном калориметре Пикера при 298,15 К определены теплоемкости пром. н-гептана (I), EtOH (II), н-PrOH (III), CCl₄ (IV), бензола (V), циклогексана (VI) и этилбензола (VII) по отношению к станд. образцу I из NBS с величиной $C_p = 224,740$ дж/град·моль. Величины C_p I—VII при 298,15 К составили соотв. $224,707 \pm 0,005$ (2-й образец $224,781 \pm 0,005$), $112,33 \pm 0,04$, $143,87 \pm 0,04$, $131,36 \pm 0,04$, $135,76 \pm 0,02$, $156,07 \pm 0,02$, $185,78 \pm 0,04$ дж/град·моль. Обсуждена примененная методика определения C_p орг. жидкостей. Ж. Василенко

X 1976

N 17

(1)

1976

CCl₄

10 Б723. Получение стеклообразного четыреххлористого углерода. Haida O., Suga H., Seki S. Preparation of glassy carbon tetrachloride. «J. Non-Cryst. Solids», 1976, 22, № 1, 219—221 (англ.)

Синтез
Эндотерм.
Эффект

Аморфные Пл CCl₄, CH₂Cl₂, (CH₂Cl)₂ и (CH₃)₃Br получены конденсацией пара на подложки, охлаждаемые до 20° K. Методом ДТА установлено, что эндотермич. эффект T_g наблюдается только у CCl₄ (61° K), у остальных в-в наблюдается только экзотермич. кристаллизация. Отсутствие эффекта T_g объяснено малой величиной конфигурац. теплоемкости. Сопоставление величин T_g CCl₄, CHCl₃, спиртов и др. в-в с их т. пл. и кип. показывает, что наибольшее постоянство характерно для отношения $T_g/T_{\text{кип.}}$ (1/4—1/3), но у CCl₄ это отношение всего 0,17. С. В. Немилов

X, 1977, №10

1976

 CCl_4 $CHCl_3$

(14, 15, 16)

88: 159259c Thermodynamic functions of dissolution of normal, aromatic, and unsaturated hydrocarbons in sulfoxides and their complexes with metals. Kolyadina, O. A.; Nikitin, Yu. E.; Murinov, Yu. I. (Inst. Khim., Ufa, USSR). *Neftekhim. Sint. Tekh. Prog.* 1976, 105 (Russ). Edited by Nusenkis, R. V. Vses. Khim. O-vo. im. D. I. Mendeleeva, Bashk. Resp. Pravl.: Ufa, USSR. Gas chromatog. was used to det. distribution coeffs., activities, and partial molar enthalpies, entropies, and free energies of soln. of vapors of ethers, heptane, isoprene, pentane, 2-pentene, C_6H_6 , cyclohexane, CCl_4 , $CHCl_3$, *m*-xylene, and PhMe in a series of solvents. The results are discussed in terms of soln. and sepn. theories. The solvent phases studied were petroleum sulfoxides (S), hexyl sulfoxide and metal complexes ($CoCl_2 \cdot 2S$, $FeCl_3 \cdot 3S$, $CrCl_3 \cdot 3S$, $CuCl_2 \cdot 2S$). Thermodyn. parameters varied with type of metal ion and of ligand in the complex. Abs. values of enthalpy, entropy, and free energy changes increased with increasing mol. wt. for $CoCl_2 \cdot 2S$ in the order unsatd. < normal < arom. hydrocarbon, but for $FeCl_3 \cdot 3S$ and $CuCl_2 \cdot 2S$, normal < unsatd. < arom. hydrocarbon.

C.A., 1978, 88, 922

(71) 18

CC₄

1976

Morrison J.A. et al.

БТТ, N 19, 118.

(Г Мервега Ва)

Cp, 220-Tm;

ΔH_z ; ΔH_m

СССР

44-15750

1976

7 Б823. Термодинамическое исследование фазовых переходов в четыреххлористом углероде. Morrison J. A., Richards E. L. Thermodynamic study of phase transitions in carbon tetrachloride. «J. Chem. Thermodyn.», 1976, 8, № 11, 1033—1038 (англ.)

С помощью адиабатич. калориметра исследовано плавление и затвердевание двух пластич. модификаций четыреххлористого углерода, одна из к-рых является метастабильной (Ia), а другая стабильной (Ib). Найдено, что образование модификаций Ia и Ib при затвердевании жидкости протекает самопроизвольно и не зависит от скорости охлаждения, причем переход в Ib носит более резкий характер. Модификация Ia полностью превращается в Ib за несколько часов. Все переходы, связанные с Ia, отличаются большей размытостью. Т-ра перехода фаза II → фаза Ib 225,7 К, Ib → жидкость 250,53 К, Ia → жидкость 246,00 К. Энтальпии переходов 4631 ± 20 , 2562 ± 6 и 1830 ± 70 Дж/моль соотв. Энтальпия перехода Ia → Ib определена непосредственно и составляет —550 Дж/моль с точностью 100 Дж/моль. Полученные результаты сравнены с данными др. авторов.

Г. Л. Апарников

Ттр, 4 Нтр

х. 1977. № 7.

CCl₄

44-15750

1976

86:22600y Thermodynamic study of phase transitions in carbon tetrachloride. Morrison, J. A.; Richards, E. L. (Inst. Mater. Res., McMaster Univ., Hamilton, Ont.). *J. Chem. Thermodyn.* 1976, 8(11), 1033-8 (Eng). The freezing and melting of 2 solid phases of CCl₄, one metastable and the other stable, have been studied using an adiabatic calorimeter. Either phase can be formed directly from the liq. The stable form freezes and melts sharply but the behavior of the metastable form is much more diffuse. Measured heat capacities and enthalpies of transition confirm and supplement the results of other recent measurements.

ΔH_{tr}

C.A. 1977 86N4

CCl₄

#4-15750

1976

3 E745. Термодинамическое исследование фазовых переходов в тетрахлориде углерода. Morrison J. A., Richards E. L. Thermodynamic study of phase transitions in carbon tetrachloride. «J. Chem. Thermodyn.», 1976, 8, № 11, 1033—1038 (англ.)

Методом адиабатич. калориметрии исследованы процессы кристаллизации и плавления двух твердых фаз CCl₄, стабильной I_b и метастабильной I_a . Любая из указанных фаз может быть получена непосредственно из жидкой L (стабильная фаза I_b примерно в одном случае из трех). Переходы $I_a \rightleftharpoons L$ размыты по т-ре больше, чем переходы $I_b \rightleftharpoons L$. Получены следующие значения т-р и энтальпий кристаллизации фаз: $T_m = 250,53 \pm \pm 0,01^\circ \text{K}$, $\Delta H_m = 2562 \pm 6$ дж/моль ($I_b \rightleftharpoons L$) и $T_m = 246,00 \pm 0,01^\circ \text{K}$, $\Delta H_m = 1830 \pm 70$ дж/моль ($I_a \rightleftharpoons L$). Разница энтальпий фаз I_b и I_a оценивается величиной 685 дж/моль. Фаза I_b может быть получена также из низкотемпературной фазы II более низкой симметрии при нагреве до $225,7 \pm 0,1^\circ \text{K}$ ($\Delta H_{II \rightarrow I_b} = 4631 \pm \pm 20$ дж/моль). В. Половов

 $T_m, \Delta H_m$

P 1977 N3

XIV - 7046

1976

FeCl_2 , CCl_2F ; CCl_4 ; $\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$ (P)

Нисенсон Л. А., Соколова Т. Д.,
Званков В. И.,

Иср. крист. химии, 1976,

49, N 7, 1499-1502



CCy

1976

Pruzan Philippe

These. doct. sci. phys. Univ.

Pierre et Marie Curie. Paris.
1976, 222 p,



cm. G H₅OH-I

(p)

61125.7206
Ch, Ex-C, TC

40771
СССР (Крат.)

1976.
4810

Tucker Edwin E. Christian Sherrill

D.

Vapor phase hydrogen bonding of
2,2,2-trifluoroethanol with acetone.

"J. Amer. Chem. Soc.", 1976, 98, N 20,
6109-6111 (англ.)

0755 пнк .

716 720

7 1 7

ВИНИТИ

орш 1/593

CCl₄

1976

Yoshikawa Y, et al.

"Bunseki Kagaku", 1976,
25, N5, 341-3.

(ΔH₂)

/see CH₃OH/ (7)

СССР

1977

11 E900. О существовании четырех кристаллических фаз CCl_4 при атмосферном давлении. Dumas Jean-Pierre. Sur l'existence de quatre phases cristallines du CCl_4 à la pression atmosphérique. «C. r. Acad. sci.», 1977, C284, № 21, 857—860 (франц.; рез. англ.)

Методом дифференциального термич. анализа исследовались фазовые превращения в CCl_4 при атмосферном давлении. При больших объемах образцов ($\sim 1 \text{ мм}^3$) фиксируются известные кристаллич. модификации CCl_4 — α -, β - и γ -фазы (из них β -фаза метастабильна). При увеличении дисперсности CCl_4 путем распыления на подложку (размер капелек в эмульсии составляет $\sim 1 \text{ мк}^3$) наряду с известными фазами обнаружена еще одна метастабильная δ -фаза. Т-ры плавления α - и β -фаз $T_{F\alpha} = -23,3^\circ \text{C}$ и $T_{F\beta} = -27,6^\circ \text{C}$. Соответствующие теплоты плавления $L_\alpha = 0,61$ и $L_\beta = 0,44$ ккал/моль. Фазовые превращения $\delta \rightarrow \beta$ и $\gamma \rightarrow \alpha$ происходят при т-рах $T_{\delta\beta} = -42,7^\circ \text{C}$ и $T_{\gamma\alpha} = -47,2^\circ \text{C}$ и сопровождаются тепловыми эффектами $L_{\delta\beta} = 1,34$ и $L_{\gamma\alpha} = 1,17$ ккал/моль. А. И. Коломийцев

фазовое
превращ.

ф. 1977
N 11

CCl₄

1977

T_{tr}, ΔH_{tr}

S7: 109659u Existence of four crystal phases of carbon tetrachloride at atmospheric pressure. Dumas, Jean Pierre (Inst. Univ. Rech. Sci., Univ. Pau Pays Adour, Pau, Fr.). C. R. Hebd. Seances Acad. Sci., Ser. C 1977, 284(21), 857-60 (Fr). The phase transitions of CCl₄ (particle size diam. ~ 1μ) were studied calorimetrically. The existence of a fourth cryst. phase was shown, in addn. to the 2 stable and 1 metastable phases already known. Transition temps. and heats of transition were detd.
H. Pomerance

C. A. 1977. S7 14

СССР

фазов.
превращ.

ф. 1977
N 11

1977
D 11 E901. Исследование метастабильности четырех фаз CCl_4 при высоком давлении. Hans P., Saint-Guirons H., Dumas J. P. Etude sous haute pression de la metastabilité des quatre phases du CCl_4 . «J. Phys. C: Solid State Phys.», 1977, 10, № 10, L267—L270 (франц.; рез. англ.)

Методом дифференциального термич. анализа исследовались фазовые превращения в CCl_4 при давлениях P от атмосферного до 1250 бар. Использовались эмульсии CCl_4 , получаемые распылением на подложку, с размером отдельных капелек ~ 1 мк. Обнаружено существование четырех модификаций CCl_4 — ромбоэдрич. α -фазы, монокл. γ -фазы, метастабильной β -фазы с ГЦК-решеткой и новой метастабильной δ -фазы. Установлено, что T_f фазовых переходов повышаются линейно с увеличением P . Величина производной dT_f/dP составляет 0,02 град/бар для переходов $\gamma \rightarrow \alpha$ и $\delta \rightarrow \beta$ и 0,03 град/бар для плавления α - и β -фаз. Вычисленные по ур-нию Клапейрона значения молярного объема фазовых переходов при атмосферном давлении равны 5,7; 4,5; 3,4 и 2,0 см^3 для переходов $\delta \rightarrow \beta$, $\gamma \rightarrow \alpha$, $\alpha \rightarrow \text{жидкость}$ и $\beta \rightarrow \text{жидкость}$, соответственно.

А. И. Коломийцев

ccl₄⁺

1977

Rosenstock M. M. et al

J. Phys. Chem. Ref. Data

1977 6. Suppl. N1, p 1-454

T-g.
ebba

1977

CCl₄SiCl₄GeCl₄

(P)

87: 90868n Vapor pressures of some liquids of quasi-spherical molecules near their critical points and the applicability of the principle of corresponding states. Toczyłkin, Leonard S.; Young, Colin L. (Dep. Phys. Chem., Univ. Melbourne, Parkville, Aust.). *Aust. J. Chem.* 1977, 30(7), 1591-3 (Eng). The vapor pressures (p , in units of 10^5 pascal) are: 15.38-45.16 for CCl₄ at 478.8-556.6 K; 17.28-35.93 for SiCl₄ at 455.4-508.1 K; and 16.71-38.61 for GeCl₄ at 492.2-553.2 K. By using the method of J. S. Rowlinson (1954) and the available exptl. data on p , the deviations ($\delta^c = 0.10-0.12$), between the exptl. p value and the p value obtained from the principle-of-corresponding-states equation obeyed by the inert gases (e.g., N₂, O₂, CO), were calcd. for ACl₄ [$A = C, Si, Ge, Sn$], Me₄C, and Me₄Si.

(+2) 18

C.A. 1977. 87 N12

1977

ССл₄
СНСл₃
С₂НСл₅

9 Б691. Взаимодействие тетраэтилсульфамида с галогеналканами. Яськовяк А., Белей М. М., Цинканчук Я. М., Макитра Р. Г. «Ж. общ. химии», 1977, 47, № 1, 184—187

Методом физ.-хим. анализа исследованы взаимодействия тетраэтилсульфамида (I) со слабыми акцепторами электронов ССл₄ (II), СНСл₃ (III) и С₂НСл₅ (IV). Рас-

(T_m)

сматривали зависимости т. пл., плотности, псевдомольных объемов, вязкости, избыточной вязкости и избыточной энергии активации вязкого течения от состава соотв. бинарных смесей I с II, III и IV. Установлено существование конгруэнтно плавящихся соединений I с II (1:1), III (2:3) и IV (1:1) с т. пл. соотв. —44,5°, —81° и —30,5°. В системе I—II предполагается также образование в жидк. фазе соединения состава 1:2. Прочность комплексов убывает в ряду IV>III>II, на что указывают максим. отклонения избыточных характеристик смесей.

В. Юркин

Л. 1977 N 9

(42)

1977

CCl₄C₂H₅OH

(Cp)

87: 157949k Heat capacities of some organic liquids determined with the mixing calorimeter. Vesely, F.; Svoboda, V.; Pick, J. (Dep. Phys. Chem., Inst. Chem. Technol., Prague, Czech.). *Czech. Conf. Calorimetry, [Lect. Short Commun.]*, 1st 1977, C9/1-C9/4 (Eng). Inst. Inorg. Chem. Czech. Acad. Sci.: Prague, Czech. The heat capacities were detd. of benzene, cyclohexane, tetrachloromethane, and ethanol at 298.15, 308.15 and 318.15 K and of *n*-propanol at 298.15 by using a heat of mixing calorimeter. The results are in good agreement with more recent literature values and the total error in measuring the molar heat capacities should not exceed the value of 0.2-0.3%.

① ⊠

C. A. 1977, 87, v 20

CCLy

ammua 5890

1977

maailly
m. juu.
cb-b

Watson R.T.

J. Phys. and Chem. Ref. data,
1977, 6, 916-17.

CCl₄

суммарно 7478

1978

Колесов В.П.

(ΔHf)

Углекислый азот,
1978, 47 (7), 1145 - 48

ССУ

фазов.
диагр.

7978
2) 1 Б1013. Теплопроводность и фазовая диаграмма CCl_4 под давлением. Ross R. G., Andersson P. Thermal conductivity and phase diagram of CCl_4 under pressure. «Mol. Phys.», 1978, 36, № 1, 39—47 (англ.)

На основе измерений теплопроводности λ в интервале т-р 250—500 К и давл. до 2,25 ГПа с использованием лит. данных представлена фазовая диаграмма CCl_4 . Зафиксировано наличие фаз Ia, Ib, II, III и IV. Фазовая граница жидк. — Ia параллельна границе жидк. — Ib до давл. 0,05 ГПа. Картина фазовых изменений Ib → II → III соответствует лит. данным. Отмечено наличие петли гистерезиса между фазами III и IV, так что переход III → IV осуществляется при больших значениях давл., чем переход IV → III за счет затрудненного зародыше-

образования. В отличие от лит. данных в поле фазы Ib до 300 К не обнаружено фазовых изменений. Измеренные зависимости λ от давл. и т-ры представлены уравнениями $\lambda = A + B \cdot P$ и $\lambda = CT^n$. Ж. Г. Василенко

2-1949, M

1978

CCl₄

(P)

89: 204451v Relation between vapor pressure and internal pressure in liquids. Srinivaasan, G. M.; Raj, G. A. Savari; Suryanarayana, C. V. (Dep. Phys., St. Joseph's Coll., Tiruchirappalli, India). *Indian J. Phys.* 1978, 52B(1), 24-33 (Eng). By using statistical thermodyn., the equation $p = p_c \exp[-\pi_i V / 2RT]$, (1), was derived for relating the vapor pressure (p), crit. pressure (p_c), internal pressure (π_i), and molar vol. of a liq., where T is the abs. temp. and R is the ideal gas const. By using the appropriate existing exptl. data, equation (1) was tested for 30 liqs., nonpolar (e.g., alkanes, C₆H₆, CCl₄) and polar (e.g., water, alkanols, EtOAc, PhNH₂), by comparing the slopes of plots of $\ln(p_c/p)$ vs. $\pi_i V/T$ with the value of R . The correlations varied from satisfactory to poor, and depended significantly on the type and quality of the data used to calc. T_i .

C. A., 1978, 89, N24

1979

CCl₄

5 E503. Двойные кривые плавления четыреххлористого углерода. The dual melting curves of carbon tetrachloride. Bean V. E. «High Pressure Sci. and Technol. Proc. 7th Int. AIRAPT Conf., Le Creusot, 1979. Vol. 2». Oxford e. a., 1980, 638—640 (англ.)

Методом диффер. термич. анализа определены т-ры плавления ГЦК модификации CCl₄ (фаза Ia) и ромбоэдрич. модификации (фаза Ib) в области давлений p до 350 МПа. При $p < 100$ МПа существуют две кривые плавления для фаз Ia и Ib, отстоящие друг от

друга на несколько градусов. При атмосферном давлении $T_{пл}(Ia) = 245^\circ \text{K}$, $T_{пл}(Ib) = 250^\circ \text{K}$. При $p > 100$ МПа существует только одна кривая плавления фазы Ib. Тройной точки Ia — Ib — жидкость не существует. При 225°K и атмосферном давлении наблюдается переход ромбоэдрич. фазы в моноклинную, т-ра этого перехода с ростом p повышается. Обсуждается влияние различных внешних факторов на область существования и превращения метастабильных фаз. Е. З. С.

Кривые
плавления

ф. 1981 n 5

1980

Структура, ...
 9 Б778. Двойственные кривые плавления четыреххлористого углерода. Bean V. E. The dual melting curves of carbon tetrachloride. «High Pressure Sci. and Technol. Proc. 7th Int. AIRAPT Conf., Le Creusot, 1979. Vol. 2». Oxford e. a., 1980, 638—640 (англ.)

Методом ДТА в диапазоне т-р 225—350 К и давл. 0—350 МПа изучена фазовая диаграмма CCl_4 , затвердевающего при атмосферном давл. и 245 К в ГЦК-структуре фазы Ia, к-рая при дальнейшем охлаждении переходит в ромбоэдрич. фазу Ib. При нагреве Ib плавится при 250 К, не переходя в Ia фазу. Если же нагревать только фазу Ia, она имеет $T_{\text{пл}} = 245$ К. При атмосферном давл. и 225 К фазы Ib переходит в монокл. фазу II. Найдено, что до давл. 110 МПа CCl_4 имеет sdвоенные кривые плавления (КП), а выше 100 МПа существует только КП фазы Ib, с увеличением давл. две КП расходятся. КП фазы Ia оканчивается при 273 К и 100 МПа. Не обнаружено тройной точки Ia—Ib—жидк. Фазовая граница Ia—Ib метастабильна, так же как и граница Ib—II. Обнаружена область существования метастабильной жидк. фазы при изотермич. передавливании, аналогично явлению переохлаждения в изобарных экспериментах.

В. А. Ступников

CCl₄(T_m)

У. 1981/29

СССР


Т-т

Х-1980. N1

1979
D 1 Б790. Рентгенографическое исследование полиморфизма четыреххлористого углерода при атмосферном давлении. Bosio Louis, Defrain André, Dumas Jean-Pierre, Saint-Guirons Henri. Étude par diffraction des rayons X du polymorphisme du tétrachlorure de carbone a la pression atmosphérique. «J. chim. phys. et phys.-chim. biol.», 1979, 76, № 5, 498—500 (франц.; рез. англ.)

Рентгенографическим методом исследованы полиморфные превращения CCl_4 при атмосферном давл. в образцах, получаемых путем охлаждения жидк. азотом эмульсий CCl_4 в смесях глицерин — сорбитол D и лаурил — сульфат Na. Установлено, что при этих условиях CCl_4 имеет 3 крист. фазы: Ia (кубич.), Ib (тригон.) и II (монокл.) Фаза Ia кристаллизуется преимущественно при т-ре 195 K, как наиболее близко соотв-щая структуре жидк. фазы при этой т-ре. Характер превращений существенно зависит от степени дисперсности образцов. Фаза II, стабильная при более низких т-рах испытывает превращение $\text{Ib} \rightleftharpoons \text{II}$, либо (при т-ре 230,4 K) обратимое превращение $\text{IIa} \rightleftharpoons \text{II}$ в соответствии со следующей схемой:

1026-11X



А. Е. Вольян

1979

CCl₄
(Kong)

Tr

V92: 85264m Raman study phase transition and dynamic structure of solid carbon tetrachloride. Ebisuzaki, Y. (Dep. Chem., North Carolina State Univ., Raleigh, NC 27650 USA). *J. Raman Spectrosc.* 1979, 8(6), 331-4 (Eng). A high pressure Raman study of CCl₄ phase I and CCl₄ phase III and the changes in the Raman activity at the II-III phase transition at 300 K are reported. The spectrum of CCl₄ phase II is characterized by low intensity lattice bands and by the presence of sidebands on both the low and high energy side of the internal modes, ν_2 and ν_4 . The sideband structure becomes Raman inactive and the lattice bands increase in intensity at the II-III phase transition; however, the major lattice peaks appear to be Raman active in both phases. It appears that there are some orientationally disordered mols. in CCl₄ II. CCl₄ phase III is an ordered phase.

CA 1980 92 N10

CCl₄

фазовый
переход

1979
УДК 10 Б91С. Изучение фазового перехода и динамики структуры в твердом CCl₄ методом комбинационного рассеяния. Ebisuzaki Y. Raman study of phase transition and dynamic structure of solid CCl₄. «J. Raman Spectrosc.», 1979, 8, № 6, 331—334 (англ.)

При давл. 1—25 кбар получены спектры КР тв. CCl₄ и изучен характер их изменения при переходе CCl₄ II — CCl₄ III в районе 300 К. Обнаружено, что спектры CCl₄ III характеризуются низкой интенсивностью решеточной линии и наличием вторичных линий как на низко-, так и высокоэнергетич. стороне внутренних мод ν_2 и ν_4 . При фазовом переходе структуры II в структуру III втор. линии спектра исчезают, а интенсивности решеточных линий усиливаются. Показано, что в фазе CCl₄ II имеется нек-рое кол-во ориентационно разупорядоченных молекул CCl₄, тогда как CCl₄ III является хорошо упорядоченной фазой. Установлено, что превращение II — III относится к переходу типа порядок —

беспорядок и сопровождается изменением в структуре субрешетки.
И. Н. Бекман

ЖЛСР. №10

CCl₄
(тб)

1979

5 Д451. Изучение фазового перехода и динамической структуры твердого CCl₄ методом комбинационного рассеяния. Raman study of phase transition and dynamic structure of solid CCl₄. Ebisuzaki Y. «J. Raman Spectrosc.», 1979, 8, № 6, 331—334 (англ.)

фазовый
переход

Получены спектры комб. рас. (15—850 см⁻¹) твердого CCl₄ при давл. 5—35 кбар и возбуждении лазерной линией 514,5 нм. Отмечены резкие изменения интенсивности линий неполносимметричных колебаний CCl₄ при изменении давления. Изучены изменения частот решеточных колебаний CCl₄ в I, II, и III кристаллич. фазах в зависимости от давления. Показано, что увеличение давл. до 7 кбар при т-ре 300° К приводит к фазовому переходу II—III в CCl₄. В спектре комб. рас. фазы II

Ф. 1980 N. 5

наблюдены боковые полосы на низко- и высокочастотных крыльях полос ν_2 и ν_4 CCl_4 , тогда как переход в фазу III сопровождается исчезновением боковых полос увеличением интенсивности полос решеточных колебаний. Боковые полосы линий ν_2 и ν_4 приписаны комбинационным колебаниям с участием решеточных колебаний $40-60 \text{ см}^{-1}$. Сделан вывод, что фазы II и III CCl_4 могут быть охарактеризованы набором ориентационно-разупорядоченных молекул и упорядоченным расположением молекул соответственно. Библ. 16.

И. В. А.

1979

CCl_4 (ne)

93: 32649e Method and apparatus for measuring a set of thermophysical properties of liquids. Filippov, L. P.; Nefedov, S. N.; Kolykhalova, E. A. (Mosk. Gos. Univ., Moscow, USSR). *Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Priborostr.* 1979, 22(10), 78-82 (Russ). A method and app. are described for simultaneous detn. of thermal cond., diffusivity and heat capacity of liqs. The method was tested on CCl_4 , $n\text{-C}_7\text{H}_{16}$, $n\text{-C}_{10}\text{H}_{22}$, and $\text{C}_{12}\text{H}_{24}$. The av. errors were 1.2-2.3%.

(C_p)

CA 1980 93 x 4

Clly

1949

Kyselka P. et al

ΔHv

Collect. Czech. Chem. Commun.,
1949, 44, N 2, 307 - 312.

●
per. CS₂; I)

CCl₄

(5)

1979

90: 175552s Entropy determined from heat of compression at high pressure for benzene and carbon tetrachloride. Pruzan, P.; Ter Minassian, L.; Soulard, A. (Lab. Chim. Phys., Paris, Fr.). *High-Pressure Sci. Technol., AIRAPT Conf., 6th* 1977 (Pub. 1979). 1, 368-78 (Eng). Edited by Timmerhaus, Klaus D.; Barber, M. S. Plenum: New York, N. Y. Piezothermal methods were used to det. the entropy as function of pressure for benzene and carbon tetrachloride, liq. and solid, at pressures ≤ 4 and 7 kbars and at 30°. Two distinct calorimetric devices were used. One of the devices consisted of a high-pressure tube introduced in a flux calorimeter together with an appropriate thermal shunt. The 2nd device was a twin calorimeter of the Joule system. Data are tabulated and graphed for the thermal expansion of C₆H₆ and CCl₄. The transformation entropies were computed by integration of the peaks along the isotherms: the range of existence of the homogeneous phases are limited by the peaks of finite width, but exhibiting different characters when the transformation is a fusion or a solid-solid cryst. transition. The piezothermal method allows a detailed anal. of the phases.

C.A. 1979, 90, N22

1979

CCl₄C₆H₆

✓ 15 Б859. Определение энтропии из теплоты сжатия при высоком давлении для бензола и четыреххлористого углерода. Pruzan P., Minassian L. Ter, Sou-Tard A. Entropy determined from heat of compression at high pressure for benzene and carbon tetrachloride. «High-Pressure Sci. and Technol. Proc. 6th AIRAPT Conf., Boulder, Colo, 1977. Vol. 1». New York—London, 1979, 368—378 (англ.)

Методом пьезотермич. анализа определены коэф. термич. расширения как функции давления P при t -рах 302 и 325 К бензола в интервале 10—657 МПа и четыреххлористого углерода при 3—706 МПа. Результаты табулированы и представлены в графич. виде. По теп-

 ΔS сжатия ΔH сжатия

⑦ ☒

x 1980 N 15

лотам сжатия найдены скачки энтропии $\Delta S/R$, где R — газовая постоянная, и $\langle \rho \rangle \Delta S/R$, где $\langle \rho \rangle$ — средняя плотность двух фаз, для фазовых переходов в тв. состоянии (ФП) и плавления. Для плавления бензола при $T=302$ К и $P=82$ МПа значения $\langle \rho \rangle \Delta S/R$ г/см³ и $\Delta S/R$ составили 4,17 и 3,84; при 325 К и 176 МПа $\langle \rho \rangle \Delta S/R=3,73$. Для ФП III—II CCl_4 при 302 К и 687 МПа $\Delta S/R=0,25$; для ФП II—I 302 К и 370 МПа $\Delta S/R=2,25$, $\langle \rho \rangle \Delta S/R=3,79$; для плавления при 302 К и 142 МПа $\Delta S/R=1$, $\langle \rho \rangle \Delta S/R=1,76$, 325 К и 210 МПа $\langle \rho \rangle \Delta S/R=1,72$. Обсуждены нек-рые аспекты теории плавления.

Р. Г. Сагитов

СССР

1979

Соломонов Б.Н. и др.

(ΔH_{soln})

Докл. АН СССР, 1979, 247,
(2), 405-408

(соед. CH_3CN ; I)

CCl_4

XIV-9044

1979

$\text{C}_2\text{H}_5\text{-OH}$

(Cp)

92: 117466x Enthalpy data of liquids. XVII. The use of a mixing calorimeter for measuring heat capacities of liquids. Vesely, Frantisek; Zabransky, Milan; Svoboda, Vaclav; Pick, Jiri (Dep. Phys. Chem., Prague Inst. Chem. Technol., 166 28 Prague, 6 Czech.). *Collect. Czech. Chem. Commun.* 1979, 44(12), 3529-32 (Eng). Heat capacities of benzene, cyclohexane, CCl_4 , and EtOH at 25-45°, and of 1-PrOH at 25° were measured in a mixing calorimeter. The results are in good agreement with the literature values. The error of measurements is $\leq 0.3\%$.
E. Erdos

(+1) 18

C.A. 1980. 92 N14

CCl_4

Commuca 10206 | 1980

Majer V., et al.

(ΔH°)

J. Chem. Thermodyn,
1980, 12, 843-47

CCl_4

1980

Majer V, et al

J. Chem. Thermodyn., 1980,
12, N9, 843-47.

(840-)

cal. CH_2Cl_2 - I

CCl₄

$T_m; T_{tr}$

Х. 1981 № 2

2 Б871. Двойные кривые плавления и метастабильность четыреххлористого углерода. Bean Vern E., Wood Sharrill D. The dual melting curves and metastability of carbon tetrachloride. «J. Chem. Phys.», (1980, 72, № 11, 5838—5841 (англ.)

Методом ДТА изучены фазовые превращения в CCl₄ в интервале давл. до 350 МПа и т-р ~200—350 К. Зафиксированы известные по лит. данным фазовые переходы с образованием гранецентрированной кубич. (Ia), ромбоэдрич. (Ib) и монокл. (II) решеток. Найденные т-ры (T) фазовых переходов составили для переходов II—Ib $225,05 \pm 0,57$, Ib — жидк. $249,58 \pm 0,50$, Ia — жидкость $244,63 \pm 0,54$ К. Зависимость T от давл. (МПа) представлена уравнением $T_{tr} = A_0 + A_1 P + A_2 P^2$, коэф. A_0 , A_1 и $-A_2$ составили для переходов II—Ib $225,05$; $0,230$; $4,13 \cdot 10^{-5}$, Ib — жидкость $249,58$; $0,386$; $2,18 \cdot 10^{-4}$, Ia — жидк. $244,63$; $0,336$; $3,88 \cdot 10^{-4}$ соотв. Представлены также фазовые диаграммы CCl₄ в изученной области. Указано, что между атмосферным давл. и 100 МПа ниже 273 К имеются две кривые плавления для фаз Ia и Ib, к-рые расходятся с ростом P, причем тройная точка Ia—Ib — жидкость отсутствует. Отмечено наличие гистерезиса для переходов Ia — жидкость и Ib—II.

Подчеркнута связь метастабильности изученных фаз с размерами образца.

Ж. Г. Василенко

1980

CCl₄

1980

Cp°

95: 87145j Study of a complex of thermophysical properties of liquids in a wide range of states. Filippov, L. P.; Nefedov, S. N.; Kravchuk, S. N. (USSR). *Fiz. Fiz.-Khim. Zhidk.* 1980, 4, 31-8. (Russ). In order to det. or verify the relationships between the thermal properties (thermal cond., heat capacity, d., thermal diffusivity) of condensed gases and liqs., an exptl. app. was constructed for simultaneous detns. of these properties at 20-400° and 1-300 bar. Measurements were made on toluene, heptane, cyclohexane, CCl₄, and nonane; data are presented only for toluene.

C.A. 1981, 95, N10

ССл₄
(ж. и крист)

$T_m, \Delta H_m;$

Х. 1982,
19, №4

1981

4 Б1101. Метастабильные состояния жидкого и кристаллического четыреххлористого углерода. Байдаков В. Г., Рубштейн А. М. «Теплофиз. исслед. перегрет. жидкостей». Свердловск, 1981, 80—84

Методом калориметра Кальве исследованы тепловые эффекты при фазовом переходе жидкость — кристалл и полиморфные превращения в CCl_4 с участием метастабильных фаз. В опытах наблюдалась кристаллизация переохлажденного жидк. CCl_4 как в стабильную ромбоэдральную структуру, так и в метастабильную кубич. (большие переохлаждения). Определена теплоемкость жидк. и крист. фаз в окрестности точек фазовых переходов, включая метастабильную область. Полученные значения t_r и теплот равновесных фазовых превращений хорошо согласуются с данными др. авторов. Макс. переохлаждение жидк. фазы составило 5,2 К, ромбоэдральной крист. структуры — 6,3 К. Впервые определена теплота перехода метастабильная жидкость — стабильная низкот-рная фаза. Обсуждаются вопросы термодинамич. устойчивости метастабильных состояний CCl_4 .

Резюме

CCl₄

1982

1 10 E547. Полиморфизм тетрахлорида углерода. The polymorphism of carbon tetrachloride. Chan R. K. «Annu. Rept: Conf. Elec. Insul. and Dielec. Phenom., Whitehaven, Pa, Oct., 26—28, 1981». New York, N. Y., 1981, 123—128 (англ.)

Обсуждаются особенности полиморфного фазового перехода CCl_4 . При охлаждении CCl_4 из расплава образуется ТЦК-фаза (I). В процессе изотермич. выдержки фаза I спонтанно преобразуется в ромбоэдрич. фазу (II). Фаза II далее переходит в моноклинную стекловидную фазу (III). При нагревании CCl_4 в фазе III образуется ромбоэдрич. кристаллич. фаза, которая существует до его плавления. В. Л. Экеелекян

T_{tr};

Ф. 1982, 18, N10.

$\text{CCl}_4 + (\text{CH}_3)_2\text{CO}$ | Ommuck 12595 |
(смесь)

(P) -
уавление
микромет-лар,
Δ G

Haase R., and Bruch
B.,

Z. Naturforsch.,
1981, 36a, 915-916

CCL₄

[Ommuck 12926]

1981

ΔH_f°
298.15

Rowe B.R., et al.,
J. Chem. Phys., 1981,
75(7), 3325-3328

CCL_4

1981

Wang Ji-Fang, et al.

T_{21} Perimeter.

Wu Li 1981, 10(3),
154 - 157.

●
(see H_2O ; I).

СССР

Омск 13924

1982

термодинам.
св-ва,

V, Cv,
коэф. терм.
расшир.,
изотерм.
сжимаем.

Asenbaum A.,
Wilhelm E.,

Adv. Mol. Relax.
and Interact. Pro-
cess., 1982, 22, N3,
187-198

СССР

1982

электростат.
моделю для
 ΔH_f ;



сп. 1982, 18, N 12

12 Д162. Электростатическая модель для теплот образования и дипольных моментов хлор- и фторзамещенных метанов. Electrostatic model for the heats of formation and dipole moments of chlorine- and fluorine-substituted methanes. Buckley G. S., Rodgers A. S. «J. Phys. Chem.», 1982, 86, № 11, 2059—2062 (англ.)

Показано, что теплоты образования и дипольные моменты хлорфторметанов количественно передаются в рамках электростатич. модели. В этой модели исходные точечные заряды помещаются на бесконечности, затем сводятся в молекулу и подвергаются поляризации. При рассмотрении теплоты образования соединения как составленной из вкладов от связей, электростатических и поляризационных вкладов, полученные величины хорошо согласуются с эксперим. данными. Модель, по-видимому, может быть распространена на галоидпроизводные этанов.

Резюме

CCl_4

1982

Kertes A.S., Lai W.C.

J. Chem. Thermodyn.

$\Delta H_{\text{soln.}}$

1982, 14 (6), 601-602.

(see C_6H_6 ; I)

CC₄

1983

Dewar M. J. S., Rzepa
H. S.

$\Delta_f H$,
meopem.
pacem

J. Comput. Chem.
1983, 4 (2), 158-169.

(en. Hce; I)

CCl₄

1983

13 Б3127. Рентгеновский дифрактометр с дисперсией по энергии и его применение. Структурная корреляция между жидкой фазой и пластичным кристаллом четыреххлористого углерода. Energy-dispersive X-ray diffractometry and its application. Structural correlation between the liquid and the plastic crystal of carbon tetrachloride. Nishikawa K., Tohji K., Murata Y. «Ions and Mol. Solut. Collect. Invit. Pap. Sess. Lect. and Microsymp. 6 Int. Symp. Solute—Solute—Solvent Interact., Minoo, 4—10 July, 1982», Amsterdam e. a., 1983, 165—174 (англ.)

В диапазоне т-р от -30 до $+25^{\circ}\text{C}$ при помощи рентгеновского дифрактометра с дисперсией по энергии выполнен структурный анализ жидк. фазы и тв. г.ц.к. пластич. метастабильной фазы (Ia) CCl₄. Из 9 возможных вариантов упаковки молекул в обеих фазах доминирующей является упаковка типа «голова—хвост голова—хвост» (расстояние Cl—Cl 3,8, C—C 5,77 Å). Для жидк. фазы предположено наличие о.ц.к. структуры, причем дальнейшее упорядочение в этой фазе выше, чем в твердой.

В. А. Ступников

X. 1984, 19,
N 13

CCL₄

1984

. Barthora J. R., Saxena
N. S.

(O₂) Indian J. Pure Appl.
Phys. 1984, 22(9), 559-
- 560.

(cur. CS₂; ~~X~~^I)

СССР

1984

Евлямов С. Ф.

Кр;

м. Груз. жмичи, 1984,
58, N 8, 2049-2050.

●
(сир. C_2C_6 ; I)

CC₄(21,2)

1984

Pankratz L.B.

U.S. Bureau of
Mines, Bull. 674, P101.

m. sp.
298.15
2000K

CCl₄

1984

3 E596. Сжатие CCl₄ при высоких давлениях. Compression of CCl₄ at high pressures. Wood Sharrill D., Bean Vern E. «High Pressure Sci. and Technol. Proc. 9th AIRAPT Int. High Pressure Conf., Albany, N. Y., July 25—29, 1983. Pt 2». New York e. a., 1984, 29—32 (англ.)

Измерялась сжимаемость CCl₄ в диапазоне давлений 0,1—200 МПа и интервале т-р 254—298 К. Объемные изменения определялись с помощью емкостного моста, при этом измеряемым конденсатором служил сильфон, наполненный CCl₄. Определены кривые фазового равновесия между жидкостью, ГЦК- и ромбоэдрич. фазами. Обнаружено предплавленное поведение обеих твердых фаз, проявляющееся в закруглении соответствующих кривых плавления. Полученные результаты наиболее удовлетворительно описываются уравнением состояния Тейта $P = B_0(B_0' + 1)^{-1} \{ \exp[(B_0' + 1) \cdot (1 - V/V_0)] - 1 \}$, где B_0 — объемный модуль при атм. давлении P_0 , B_0' — его производная по давлению, V_0 — объем при P_0 .

А. И. Коломийцев

сжимаемость

ф. 1985, 18, № 3

CCy

Om. 21999

1985

Eastal A.F., Wood L.A.,
Wilson E.L.,

Tr;

Int. J. Thermophys., 1985,
6, N3, 275-284.

СССР

1985

3 ИЗ2. Теоретическое и экспериментальное изучение уравнения состояния тетрафторметана. A theoretical and experimental study of the equation of state of tetrafluoromethane. Rubio R. G., Calado J. C. G., Clancy P., Streett W. B. «J. Phys. Chem.», 1985, 89, № 21, 4637—4646 (англ.)

Плотность ρ четырёхфтористого углерода в жидко-газовой области состояний измерена на ~~33~~ изотермах в интервале t -р 95—413 К до давл. 1100 бар. Приведена таблица 1500 эксперим. значений ρ . Погрешность измерений возрастает при уменьшении ρ от 0,1% для жидкого CF_4 до 0,4% для $\rho < 2$ дм³/моль. Обработка измеренных PVT-данных в совокупности с данными других авторов позволила получить интерполяционное ур-ние состояния в форме Стробриджа, содержащее 16 подгоночных параметров. Обсуждается использование «вариационного» ур-ния состояния Алена и Мансури и теории возмущений в форме Губбинса для теоретич. описания полученного ур-ния состояния. А. Д. О.

уравнение
состояния

ср. 1986, 18, №3

CCl₄ (n)

1985

/ 103: 43058n Do tetrachlorides have a common liquid structures?
Sjoerdsma, Jelle S.; Van Tricht, Jan B. (Interuniv. React. Inst.,
2629 JB Delft, Neth.). *Chem. Phys. Lett.* 1985, 117(4), 336-9
(Eng). By combining neutron diffraction data and model calcns.,
semi-exptl. partial chlorine-chlorine radial distribution functions are
derived for liq. CCl₄, SiCl₄, TiCl₄, VCl₄, GeCl₄ and SnCl₄. From the
comparison of these functions it follows that they do not scale
linearly with respect to each other. The assumption of a structure
that is common to these mol. liqs. is therefore rejected.

мгнукмгпа

C.A. 1985, 103, N 6

Cly (mc)

1986

Zou Wenqiao, Qin Songlin.

Cp;

Huaxue Shijie 1986, 27.
(2), 64-6.

(see. C_6H_6 (mc); I)

CChy

1987

Cobos C. J.

An. quim. Real. soc.

esp. quim., 1987, A83,

N3, Sept. N2, 615-621.

A, Δ H_f;

(see. CH₃ Bz; ^I~~2~~)

CCl_4

1987

106: 144957x Enthalpies of solution of t-butyl chloride and bromide and carbon tetrachloride and tetrabromide in alcohols. Goncalves, R. M. C.; Simoes, A. M. N. (Cent. Electroquim. Cine., Univ. Lisboa, Lisboa, Port. 1200). *J. Solution Chem.* 1987, 16(1), 39-43 (Eng). Std. enthalpies of soln. of *tert*-BuX and CX_4 (X = Cl and Br) in several alcs. are reported as measured by a calorimetric method. The corresponding transfer functions from the gas phase were calcd.

($\Delta H_{\text{soln.}}$)

(17) CBr_3

C.A. 1987, 106, N18

Cly(2) (DM-26636) 1987

Kirne Y. J., Driscoll D. C.,
Dowben P. A.,

J, D, H; J. Chem. Soc. Faraday
Trans., 1987, Pt 2, 83, n2,

● 403-410.

CCl_4

(om. 28603)

1987

108: 119290h Volumetric and speed-of-sound measurements for liquid tetrachloromethane under pressure. Lainez, A.; Miller, J. F.; Zollweg, J. A.; Streett, W. B. (Sch. Chem. Eng.,

Cornell Univ., Ithaca, NY 14853 USA). *J. Chem. Thermodyn.* 19(12), 1251-60 (Eng). For liq. CCl_4 (p, V_m, T) was measured with a direct-weighing app. at 329-409 K and at pressures to 55 MPa. The results compare very well with published values, esp. at the lower temps., and were fitted to a modified form of the Tait equation. Speeds of sound c were measured at 283-455 K and pressures to 12 MPa.

(p, V_m, T)

c. A. 1988, 108, n 14

Ccl₄

1987

Meyer Jürgen.

Wiss. Z. Friedrich-Schil-
ler-Univ. Jena. Natur-
wiss. R., 1987, 36, N 4,
595-603.

(see. C₆Cl₆; I).

Kp;

$\text{CCl}_4(\text{K})$

1988

22 Б2646. Структура и динамика твердого CCl_4 с примесью ацетонитрила. Structure and dynamics of solid CCl_4 matrices doped with acetonitrile. Deise-roth H.-J., Popp S., Kollhoff H., Langel W., Knözinger E. «J. Mol. Struct.», 1988, 174, 89—94 (англ.)

Исследована смесь CCl_4 — CH_3CN с конц-ией CH_3CN до 35 мол.% методами ИК-спектроскопии и рентгенографии. ИК-спектры ацетонитрила при конц-ии 12,5% в обл. 50 — 250 см^{-1} не испытывают существенных изменений при переходе смеси из жидк. в тв. пластич. фазу (от 250 к 230 K), хотя отмечено уменьшение интенсивности и сдвиг в сторону больших волновых чисел на 14 см^{-1} сразу после затвердевания. За время в несколько минут эти изменения усиливаются и стабилизируются через 8 мин., что дает представление и скорости перераспределения молекул CH_3CN . При переходе в фазу с упорядоченной ориентацией молекул CCl_4 (210 K) появляется картина поглощения, характерная для антипараллельного димера $(\text{CH}_3\text{CN})_2$. Сохранение интегрального поглощения свидетельствует о наличии димера и в пластич. фазе. Определены концентрац. зависимости периодов решетки CH_3CN в CCl_4 и CBr_4 .

С. Ш. Шильштейн

структура
и

динамика

Х. 1988, № 22

CCl_4^+

Om. 29317

1988

Hop C.E.C.A., Holmes J.L.
Int. J. Mass Spectrom.^{et al}
and Ion Process., 1988,
83, N3, 285-294.

(ΔH_f ;

CCl_4

[Dm · 31991]

1989

Bardelmeier U., Würz-
linger A.,

(T_{±2})

Thermochim. Acta,
1989, 143, 109-114

CCl₄

1991

3 И24. О диссоциации CCl₄ и CHBr₃ при ударно-
волновом сжатии / Долгобородов А. Ю., Воскобойни-
ков И. М., Толстов И. К. // Экстрем. состояния ве-
щества.— М., 1991.— С. 317—324

Кр

☑ (4) CHBr₃

ф. 1992, №3

CCl₄

1991

114: 193689k Isochoric thermal conductivity and thermal pressure of solid carbon tetrachloride. Konstantinov, V. A.; Manzhelii, V. G.; Smirnov, S. A. (Phys. Tech. Inst. Low Temp., SU-310164 Kharkov, USSR). *Phys. Status Solidi B* 1991, 163(2), 369-74 (Eng). Isochoric thermal cond. and thermal pressure are studied of monoclinic and rhombohedral phases of solid CCl₄ at different densities in the temp. range 210-300 K and pressures up to 200 MPa. At const. d. the thermal cond. increases with increasing temp. in both the phases. The exptl. results are discussed on the basis of the conception of the min. value of the thermal cond.

(менюро
Ростовно)

C.A. 1991, 114, N 20

CCl₄

1991

2 Б3176. Избыточные энергии Гиббса бинарных жидких смесей. Смесии углеводородов и четыреххлористого углерода с альдегидами или кетонами. Excess Gibbs energies of liquid binary mixtures. A hydrocarbon or tetrachloromethane + an aldehyde or a ketone / Giannotti Antonio, Lepori Luciano, Matteoli Enrico, Marongiu Bruno // Fluid Phase Equil.— 1991.— 65.— С. 275—290.— Англ.

При 298,15 К (в нек-рых случаях при 293,15 К) определены избыточные энергии Гиббса (G^E) бинарных смесей CCl₄, циклогексана и гептана с рядом альдегидов и кетонов во всем интервале составов. Для всех систем G^E положительны. Обсуждается влияние природы компонентов изученных бинарных смесей из абс. значения G^E . Рассчитаны и табурированы коэф. активности компонентов при бесконечном разбавлении и свободные энергии Гиббса сольватации (ΔG_e^0). Эксперим.

ΔH_{mix}

X. 1992, N2.

ΔG_c^0 сопоставлены с рассчитанными на основе комбинированной с теорией масштабных частиц модели аддитивности поверхностных взаимодействий.

А. С. Соловкин

CCl₄

1992

8 БЗ196. Структура и динамика молекулярных кластеров. 2. Плавление и замораживание кластеров CCl₄. Structure and dynamics of molecular clusters. 2. Melting and freezing of CCl₄ clusters /Bartell L. S., Chen J. //J. Phys. Chem. .—1992 .—96 ,№ 22 .—С. 8801—8808 .—Англ.

Методом моделирования молек. динамики для 225 молекул в диапазоне т-р 10—200 К исследовано фазовое поведение CCl₄. Вычисления начинались с ориентационно разупорядоченных молекул, распределенных в г.ц.к.-решетке почти сферич. кластера. Кластер нагревался до 200 К ступеньками в 10 К (длительность каждой 50 пс) и затем охлаждался до 10 К. Исследованы трансляц. и вращат. переходы (по диффузии и по энтропии) индивид. молекул. Плавление начинает идти с ПВ (в районе 70 К) и распространяется внутрь при повышении т-ры. Затвердевание расплавленного кластера протекает от центра к ПВ. При высоких скоростях охлаждения молекулы не успевают организовать в крист. решетку и образуется фаза стекла. Сделано сравнение полученных результатов с предсказаниями др. теор. моделей.

В. А. Ступников

(T_m)

Х. 1993, №8

СССР

1992

20 БЗ037. Глубокая очистка четыреххлористого углерода /Шалыгин В. А., Смирнова Г. Е., Ухин В. И., Сиромолот В. Н., Сиромолот Ю. С. //Высокоочист. вещества .—1992 .—№ 3 .—С. 88—91 .—Рус. ;рез. англ.

Приведены данные по равновесию жидкость — пар в системах четыреххлористый углерод (I) — примеси. Определены примеси, лимитирующие процесс ректификац. очистки. Проведена ректификация I в колоннах различной эффективности с получением продукта квалификации «ос. ч.». Рассмотрена возможность регенерации I после его использования в электронной пром-сти. На основании эксперим. и расчетных данных рекомендованы условия получения высокоочистого I.

(глубокая
очистка)

X. 1992, N 20

CCl₄

1993

Fitschen W.

Sp, merkw-
herd.

Vak. Prax. 1993,

5(1), 35-6.

cb-ba

( ccl. H₂ ; I)

CCl₄

1993

19 Б3135. Термическое разложение тетрахлорида углерода. Thermal decomposition of carbon tetrachloride /Michael J. V., Lim K. P., Kumaran S. S., Kiefer J. H. //J. Phys. Chem. .—1993 .—97, № 9 .—С. 1914—1919 .—Англ.

Сообщается об измерении скорости термич. разл. CCl₄. Разл. начинается с отщепления двух атомов хлора, при этом второй атом Cl отщепляется значительно медленнее первого. Библ. 31.

термическое
разложение

X. 1993, N 19

CCl₄

1993

Rychlicki G., Terzyk A. P.

Zesz. nauk. AGH im.

Stanisława Staszica.

Chem. 1993, N 25. C.

119-128.

изотермы
адсорбции,
темпер.
теплот,
кинетики
адсорбции

 (соед. $\text{CH}_2\text{OH}; \text{I}$)

CCLy Berry R. J., Burgess D. R. F., (Jr). ¹⁹⁹⁶
et al.

ΔH_f ,
расчёт J. Phys. Chem. 1996, 100,
N 18. C. 7405-7410.

(see  CH₃Cl; I)

CCl₄

1996

126: 23532j Kinetic method for the determination of the heat of vaporization of liquids. Li, Jinyu; Zeng, Daogang; Wang, Guoyan; Li, Xiangwu (Dep. Chem., Yunnan Educational College, Kunming, Peop. Rep. China 650031). *Huaxue Yanjiu Yu Yingyong* 1996, 8(2), 304-308 (Ch), *Huaxue Yanjiu Yu Yingyong Bianjibu*. A kinetic method is developed for the detn. of vaporization heat of liq. samples using the equation: $\ln k = -\Delta_{vap}H_m/RT + c'$, which is deduced based on the work of Brennan et al. The method is verified by detg. the vaporization heat of CCl₄ and Et acetate and compared with referenced method.

($\Delta_v H$)

C.A. 1997, 126, N2

F: CCl4

P: 1

133:110281 Equation of state for CCl4. Fat'yanov,
Oleg V.; Nicol, Malcolm F.; Ogura, Toshiyuki; Kondo,
Ken-ichi Core Research for Evolutional Science and
Technology, Japan Science and Technology Corporation
Saitama 332-0012, Japan AIP Conf. Proc.,

505(Shock Compression of Condensed Matter, Pt. 1),
117-120 (English) 2000. Thorough anal. of the
Us vs. Up principal Hugoniot data for liq. CCl4
shows that our values along with all the data
reported by other groups except the low pressure
results of Dick can be described by the single
smooth function proposed by Woolfolk et al. with
the following coeffs.: $Us/C0 = (2.08 \pm 0.07) +$
 $(1.34 \pm 0.04)Up/C0 - (1.08 \pm 0.07)\exp((-1.2$
 $\pm 0.2)Up/C0)$. This satisfies the boundary
condition $Us = C0 = 926 \text{ m/s}$ at $Up = 0$ and gives the

2000

same asymptotic linear relationship as the best-fit expression reported by Dick at shock pressures above ~16 GPa. On-Hugoniot temps. calcd. using the EOS of Cowperthwaite and Shaw and the revised U_s vs. U_p are in good agreement with the results of our IR measurements and reported optical pyrometry data. The max. discrepancy does not exceed 5% in the 3.3 to 7 GPa and 10 to 15 GPa shock pressure ranges and is less than 10% for other pressures below 20 GPa. Within the accuracy of our data, the behavior of single-shocked CCl_4 does not contradict to the predictions of the const. $(\Delta P / \Delta T)_v$ model, at least between 3.3 and 7 GPa. All reliable exptl. results suggest only two singularities along the principal Hugoniot of CCl_4 : the threshold of chem. reactions at 7 GPa and complete decompn. at 20 GPa.