

TeH₂

$H_2Te^{+}(2)$
(ΔfH)

~~7556~~
165 - II - ТКВ

Горохов Л.Н.

Потенциалы ионизации молекул H_2Se , H_2Te
и $H_2PO(2)$, 5 с.

$H_2TeO_3 (x)$
 $\Delta_f H$

1966

204-II-ТХВ

Привалова Н.М.

Энтальпия образования твердой теллуристой
кислоты, 2 с.

$H_2Te(g)$
sfH

~~202~~
202-II-ТКВ

Энтальпия реакции разложения H_2Te /г/,
2 с.

~~2226~~
 H_2Te (к, м)

($T_m, T_b, \Delta mH, \Delta vH$)

202-II-ТХВ

Резницкий Л.А.

Температуры и теплоты плавления и кипения
теллуридов водорода, 2 с.

$H_2 Te(x, m)$

~~1966~~

$T_m, \Delta m H, T_b, \Delta H$

202-II-ТК13

Соколов В.Б.

Температуры плавления и кипения, энтальпии
испарения и плавления, $H_2 Te(x, m)$, 5 с.

$H_2Te(g)$

1966

термод. ф.

202-II-ТХВ

ЮНГМАН В.С.

Термодинамические функции ($C_p, S, H-H$)

H_2Te /г/, 2 с.

H₂Te

Berthelot

1888

Fable

Bp - 6021-II

" Ann. Chim. phys⁴

1888, 24, 284-
14, 92-109


Recherches thermiques sur
le Te et ses tellures

II-1182

1920

Druylants

I. Bull. classe sci. Acad. roy. Belg. 6, 472
(1920)



Circ. 500

K

(40-1)

H₂Te

N. O. Stein

1931.

Te; ΔH_v

Te; ΔH_m

B90-5082-II

"J. Chem. Soc"

1931,

134-8

H₂Te

1932

Robinson W.E.

Scott W.E.

"J. Chem. Soc."

1932,

972-3

ΔH_m; P;
T_m; b

II-5807-cba

II-1183

1949

H_2O , H_2S , H_2Se , H_2Te (K)

Ebert L.

Monatsh., 1949, 80, 738-739.

The second dissociation constants of
water.

C.A., 1950, 44, 9218g

M 10

Еврт Л. К. П

U 1354

1957

H_2Te (Cp; ΔH ; ΔS ; ΔF)

Altschuler A.D.

Thermodynamic functions for
the isotopic hydrogen selenides and
hydrogen tellurides

J. Phys. Chem., 1957, 61, 509-11

Kelley, bull. 532, c. 24

10

cut sp. r. p

H_2Te

Gunn S.R.

1962

U.S. At. Energy Comm.

UCRL-7301-T, 10pp.

ΔH_f

Heats of explosion of
unstable gaseous hyd-
rides.

$(Cu. Si_3H_8)I$

1963

H₂TeH₂SeSi₃H₈Ge₃H₈Bi₁₀H₁₄SbH₃SnH₂

+ 5

Gunn S. R.

Calorimetry of reactions other than combustions. Symposium on thermodynamics and Thermochemistry, VII, Lund, Sweden, July 18-23, 1963.

Heats of explosion of unstable gaseous hydrides.

[X]

3, 4, 5, 12 1964

A-223

CH_4 , PH_3 , H_2S , B_2H_6 , SiH_4 ,
 GeH_4 , AsH_3 , SbH_3 , H_2Se ,
 H_2Te (Кс)

Девятых Г. Г., Юшин А. И.

Иср. физ. химии,
1964, 38 № 4,

957-62

есть ср. к.

М

5

H_2Te , H_2Se (ΔH_f°) 1844-II 1964.
Se-H, Te-H (one-point) (chem).

Gunn S. R., BD-6816-II 5

J. Phys. Chem, 1964, 68(4), 949-52

The heat of formation of H_2Se
and H_2Te correlations of simple
covalent hydrides

M. (P)

NOTE: E. R.

CA, 1964, 60, 513, 15215h

12 Se, HeTe (Kp) 1.XII 867 1969

Устинов Г. П., Вугород Е. Н.
Изб. АН СССР, Георг. материалы, 1969,
5, №1, 163-165

Птеридовые устьевые селеноводороды
в титуроводорода.

РНХУМ, 1969
115648

