

$C_3 \quad C_3^+ \quad C_3^-$

С

Bobrovnikov N.T.

1931

Hydrophys. J. 73, 61

Солнце 4050А

расстояние к новой системе СН
необоснованное



изу.

C3

0

G. Herzberg

1942

10504

Res. Mod. Phys. 14, 195

Квант. структура молекул.
 пришло Герцберга и Вайсберга
 о том, что молекулы CH_2 состоят
 перпендикулярной молекулы имеют
 атомную формулу CH_2
 симметричного строения

CH_2 из CH_2 и CH_2 $\text{C}, \text{O}, \text{N}$
 Наиболее характерна CH_2 и N .

M24

она по расчётам имеет температурный перепад
в области 4000-4500°K. Однако окончательное
равномерное замораживание о ширине
полосы 4050 термобер не делал.

h₂

G. Herzberg

1942

Astrophys. J., 96, 314

Наблюдениям молодых звезд
в сфере разряда

излучавших красную - см. радиацию

Красноватый разряд в спектре
Мира. ● Космические излучения

- CN, NH, H₂. Исследования

первые моменты разрыва. В результате
высвобождения в каберов. условиях
была получена новая форма
раствора каберов. вещества, которая
в смеси с водой и водой
(Swings, McKellar 1953).

C₃

чосон

Swinos P

1942.

Hydrophys. J., 95, 270

Выводение базисного уравнения
 для чосон CH_2 (NH^+ , CH_2 ,
 NH_2^+). Вывод о б.м.з. с групп
 зрения апроприации б.м.з.
 водорода $\bullet$ CH_2 .

изу

C₃

Swings P.

1942

Rev. Mod. Phys., 14, 190-4.

Molecular bands in cometary spectra. Identifications.

C₃

Swings P.

11943

Monthly Notices Roy.
Astron. Soc., 103, 86-111.

Reports on the progress
of astronomic cometary
spectra.

СЗ

Р. Нерман

1946

Сопров. зенд. 223, 281

Работа

Исследования моего выдвинутого
 на 4050. Исследования Оуэна
 ие записки в агнелере Н₂,
 рабавакского ксенном, (дава
 of 3 до 10 мм кг). Кажды с Н₂ и
 с наблюдая. 4050
 и идентификации и рашироули

wasce he Puno bynans .

63

McKellar A.,

1948

Astrophys. J., 108, 453

Loose, 4050² & circle

zeta² & name

C3

A. Mankils, B. Rosen

1949

Saburo 164, 713

Изучение воздуха изнутри Носа 4050

В носу из воздуха из графика
 в атмосфере не разбавлено
 водородом или парами органи-
 ческ. соединений: (метан, газ, бензол)

Азотом удаётся но
 при смешивании при температуре с

1949

гидрометр 1,64 мм в отв. 4040-8 и даури
паву с кантом в отв. 4043². Заметив
водород на дейтерий, они 102 обнаружили
изотоп. смещение, что вызвало сомнения
в равномерности изотопизации германия
по отв. 4050⁰.

63

Jose P.D., Swings P.

11950

Astrophys. J., III, 41

Знаю 4050A 6 спектр
коммент.

C₃
1

Douglas A.E.

1951

Astrophys. J., 114, 466

Смешан с популяцией в
результате смешивания
звездных масс.

Σ -II переход
близко к нулю
сочетание полей.

всплеск
всплеск

C₃

E. Edinne, P. Goff, B. Rosen

1951

Coll. de Mem. Liege, in 4⁰ 4²³, 1.

Условия существования клеток чого
показываются в виде
переоформления соединений.

Одновременно определяются
клетки чого в среде
а реакция ● расщепления галакто-
вого зерна, помещенного в

мн

разрядной трубе радикалом CH_2 не
наблюдается. Это возможно сделать
~~вывод~~ о том, что CH_2 не
излучает в видимом

C₃

Phillips J. S.

1951

Mém. Soc. Roy. Sci. Liège,
18, 538.-543.

Relative temperature
coefficients of features
in the C₃ spectrum.

1952

Swire ~~the~~ R.A.

Proc. Roy. Soc. (A) 211, 110, 1952.

Болоса ЧОСО в изучении
молнии при реакции фторид
с органическими соединениями

Болоса ЧОСО появились в среде
когда изучались наф. тело C_2
Вещ. наиб. $\bullet$ смел, а также CH
также нагали появлялись.

Фьюри показал, что с ионизацией керны
ноя изучения в сфере пронада
наша ЧОЗО и что в случае радиации
некий наш CCl_4 , необходимо добавляя
водород, инае морос ЧОЗО в сфере
не появляются.

3

Gordon A G
Wolfhard H. G.

1952

Proc. Roy. Soc. (L). A213, 366

Кварц 4050 Å в центре шара
установочный микроскоп.



C3

K. Knox, R.G.W. Norrish,
G. Porter

1952

J. Chem. Phys. 20, 1477

Исслед. разрошения кинетов
при действии света и последо-
вание взрывного окисления
ацетона, вызываемого
мгн. сенсибилизатором

C3

Gardner W.R.S.

1953.

Proc. Phys. Soc (L) Abb, 848

Горбачевское шоссе ЧОСОН в
свердловской области Чернышкова
в бассейне Трансильванского
в долине реки Восточная (в долине)
по шоссе 1100 м. на высоте 2200 м.
в свердловской области с высоты
C2 поворачивать шоссе ЧОСОН, Свердловская

не через д. или работу все же при непрерыв-
ном откачивании. Очевидно, что в условиях,
применяемых. возмущения водород не
выражает никакой роли.

C₃

Goupil R., Herman R

Ann. Astrophys., 1953, 16, № 6, 444

Условия излучения и поглощения
в звезде с массой 4050 M_☉.Расчет частоты излучения в
кванте Гейсера

$$\lambda_1 + \lambda_3 = \kappa_1 \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) + \kappa_3 \left(\frac{1}{m_2} + \frac{1}{m_3} \right)$$

$$\lambda_1, \lambda_3 = \frac{m_1 + m_2 + m_3}{m_1 m_2 m_3} \kappa_1 \kappa_3$$

Для C_3 $\lambda_1 + \lambda_3 = 2\kappa \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{m} \right) = \frac{4\kappa}{m}$

$$\lambda_1 \lambda_3 = \frac{3\kappa^2}{m^2}$$

$$x^2 - \frac{4\kappa}{m}x + 3\frac{\kappa^2}{m^2} = 0$$

$$\lambda_3 = \frac{3\kappa}{m} \quad \nu_3 = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{3\kappa}{m}}$$

$$\lambda_1 = \frac{\kappa}{m} \quad \nu_1 = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{\kappa}{m}}$$

$$\kappa = 2A$$

$$2A = 355 = 35 \cdot 10^4 \frac{\text{cm}^{-1}}{\text{\AA}^2}$$

$$m = 12 \cdot 1,66 \cdot 10^{-24} \text{ г}$$

$$\nu_3 = 1725 \text{ см}^{-1} \text{ и } \nu_1 = 1000 \text{ см}^{-1}$$

В конусе конусов газит



$$\nu_1 = 1947 \text{ см}^{-1} \text{ и}$$

$$\nu_3 = 1263 \text{ см}^{-1}$$

C₃.

Goupil R.

1953

Campes. Rend. 236, 1542

Вычислено разделение нормаль-
ного и первого воздушного
жидкого уровня анион-
ной молекулы C₃.

1465-11

C₃

эмиссия 2147 1953

крат.
номера.
стр.

Rene Coupié

Renee Herman

"Ann. d'Astrophys"

1953, 16 n 6, 1-22

Conditions d'émission et origine
du groupe 4050 Å des noyaux
cométaires.

СЗ

S. Kautschler, B. Rosen

1953

Comp. and 237, 294.5

Роль Savings и образования
налогового режима

Сд 1954.

4968a

C3

Hantkecker S., Rosen B. 1953
Actes Congr. Luxembourg Press.
Assoc. franç. avancement sci.,

Некоторые замечания об излучении
поле Свинца (группа Чобор)
в лабораторных условиях.

Графитовый разрядник с полем
каждом. Обнаружены новые

РМХ, 56103, 120 64219.
наблюдение с полем, предположительно св-
наблюдение с полем, предположительно св-

Рис в сибирях "увердныр" здесь в
область 3850-3300 м. По видимому зр-
ношение ранее принадлежит "молочу"
4050 "

C₃

A. Mandile, B. Rosen

1953

Coll. de Mem. Liege in 4° 43', 47'

Нормальное состояние вещества
до момента - излучения и
вещь не содержит вещества.

424

C2

Norrich R.G.W.

1953

Porder C. Thrush B.A.,

Proc. Roy. Soc. (L) A216, 165.

Кодовый член в группе новых
членов. При генетическом
различии соединены.

C3
—

Rosen B. Swinas P.

1953

Ann. d' Astrophys, 16, 82

Краткое научное обзор
проблем, связанной с появлением
в 4050 Å. ~~линии~~

C3

смерь

Swings P.

1953

Ann. Astrophys. 16, 307-14.

~~Смерь~~ C3 в центре комет
и звезд класса N.

CA 48

5643c

C₃

R. E. Honig

1954

J. Chem. Phys. 22, 126.

Масс-спектрометрические данные из первого обнаруженного существования молекулярных соединений углерода. Наблюдался температурный интервал до 2600° от жидкого в паровом состоянии. Существование молекул от C⁻ до C₈⁻, а также молекул C₁, C₂ и C₃.

МЗУ

C_3^{13}

Клузис, Думас | 1954
Cluzis K., Douglas A.E.

Canad. J. Phys., 1954, 32, N5319 -
-325

Спектры

Полосы поглощения C_3^{13} при
4050 Å°
[полюса C_3^{13} - линейная]

X-55-10-18119

C3

смерг
браз.
нагоран

11-54/2

N.H. Kiess, A.H. Bass

1954

J. Ch. Ph. 22, 569 - 570, 1/3Гороса 4050 Å в $C_2H_2-O_2$ пла

Богаре пламя, в зоне реакции

Удара Е-2. Импульс. Лин

2-й период ● период 214 с

густота 0.88 Å/мм

Другое предположение, что спектр связан
с Σ -П-переходом молекулы C_3 .

Наши измерения дали ($\lambda = 48 - III$)

$$B' = 0.413 \text{ см}^{-1}$$

$$B'' = 0.435 \text{ см}^{-1}$$

$$D' = 0.45 \cdot 10^{-6} \text{ см}^{-1}$$

$$D'' = 0.90 \cdot 10^{-6} \text{ см}^{-1}$$

$$V_0 = 24673.75 \text{ см}^{-1}$$

C3

G. Herzberg

1955

Mem. soc. roy. sci. Liège 15, 231-331
ann.

Работающие маши. энерг. в
молнии надх. в энерг. в
звезд и комет.

Центрирование C3 на и уагау
поис. 24050 ● генерирует подходы

Library of
Congress

C.A., 49
13773 d.

63

Herman R. Herman L.

1954

Compd. read, 258, 664

Рисов 4050² 6 черт

диаметр разряда (квант 3 мм) (50)

$$(d^3n - a^3n) - 10$$
$$(A^2D - X^2T) - CH.$$

Описание  концентрическая, на в. с. шар 4365 Å .

C3

R. Herman, L. Herman

1955

C3

Mem. Soc. Roy. Sci. Belg. 15, 352-9

Никто лабораторные мыши
всегда едят укропа

CA 49

144850 E

6

McKellar A., Richardson E.H.

11955

Mém. Soc. Roy. Sci. Liège,
Collection in -8°, 15, 256.

Ряды звездного неба,
сопровождающие движение
со звездным светом.

C₃

1955

Lerkovits H. C., Fain J., Matsen F. A.

J. Chem. Phys., 1955, 23, 1690.

сен. соф.

2A₂

Полюса π -электронная система
атомов аммиака и
амми. молекул.

Формально теория для сен. соф. C₃ и
C₃⁺ идентична с теорией для H₃ и H₃⁺,
разработано Hirschfelder: см. и др.

C₃
C₃⁺

(J. Ch. Ph., 4, 121, 130, 1936.)

бензол. C_3 (2A_2).

C3

смер.

Marr G.W., Nicholls R.W.

1955

Canad. J. Phys. 33, 57, 394.

Линия ЧОСОА и кривер. смер.
в микрофото-измер. и пламени:

Линия ЧОСОА наб. в смер. камере (7)
и в смер. камере звезд (9).
в лабораториях в иза. измер. и
разреш (6, 1, 4), в ускорителе.
пламени (2, 8, 3) в ускорителе (12)

в 6 показ. фазы photolysis (1). Кризиса и
 Дула (1) показам, зо. показана связана с
 показом C_3
 C_3 кабул. в соединяющей зоне богато $C_2H_2 + O_2$
 Лифровеши смир. 4 л/мм при 4000 Å ..
 $\frac{C_2H_2}{O_2}$ от 2.5 до 4 На выезде 3 мм под реинион
 ной зоной сменяется
 смир. в смир. сф. показ
 CN, CH, C_3, C_2 .

Библиография.

63

J. Phillips, L. Brewer

1955

Mon. Soc. Sci. League 15, 341-51

И. Ф. Конкин в семье уперода
в 1000 Å и в 1300 Å

зрелая перь сапурибалес
карев. До 2000°

9 4700-3700 Å

CA. 75

14 175 Å

C₃

Ф. Саваннес

11.9.56

У. Ризз. ед газівим 17, 16, 492-96

Образование газу уперода
в пламенар и нагледение
молекуль C₃.

C₃

N.H. Kiess, H.P. Broida

1956

Смелл. Canad. J. Phys. 34, 1128, 1471-1479

Смелл молекулы C₃ в обл.
3600-4200 Å.

$C_2H_2 + O_2$ плазма $C_2H_2/O_2 = 1/1$.
(40 канав плазма)

Получены фотографиями в
уравновешенной плазме инертных
CN и C₂ плазма была наименьшей

31/12-11

Наблюдения спектров полярных звезд 4050 и 4050 и 4050
 4050A 4050A 4050A

$$\begin{aligned}
 B' & 0.4125 \pm 0.0005 \\
 B'' & 0.4280 \pm 0.0005 \\
 V_0 & 24675.75 \pm 0.08 \\
 D' & (0.22 \pm 0.03) \cdot 10^{-6} \\
 D'' & (0.46 \pm 0.05) \cdot 10^{-6}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4050A & \\
 0.4110 \pm 0.0005 \\
 0.428 \pm 0.001 \\
 24539.8 \pm 0.2 \\
 (0.22 \pm 0.06) \cdot 10^{-6} \\
 (0.7 \pm 0.2) \cdot 10^{-6}
 \end{aligned}$$

C₃ L. S. Nelson, D. A. Ramsay 1956
J. Ch. Ph. 25, 12, 372

Спектры поглощения электро-
дных радикалов, наблюда-
емые при инфракрасном
фотолизе

C₃

Brion H., Lefebvre R.,
Moser C.

1957

J. Chim. Phys. et phys.-chim. Biol.
1957, 54, 15, 363-368 (фр.)

Защитные соединения: углеводородных радикалов; аллила, нефаденила, бензила

РМФ II.
1958, 669

C₃

J. H. Callomon, D. A. Ramsay 1957
Canad. J. Phys. 35, 12, 129

Флуоресценция кварцевого
(C₂, C₃ полосы)

C₃ (Di)

116-IV

1957

Kiess N., Broida H. P.

Mém. Soc. Roy. sci. Liège, 1957, 18, Fasc. univ.
544-548 (annc).

Spectrum of the

C₃ molecule between
3600 Å and 4200 Å.

Pub. Xuv, 1958. 80274 10

2

C3

Оттиск 317 л.

1957

C. Herzberg.

Мем. Soc. Roy. Sci. Liege
1957. 18 397-418.
Последние лабораторные
исследования. Искренне
с точки зрения асимметрии.

Кислород
 $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_2$

Радикалы

G. I. Mavor

11957

Canad. J. Phys. 35, 11, 1265

(C₂)

II. Свободные радикалы и ионы.
Коррелирование и изр. вандер Ва
излучения с радиацией в ботарке
 $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_2$ и др.

Кислород. излучения ботарки ионизации $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_2$ в
инте 23-4,2. ● Измерения ионизации
излуч. C₂, C₃, CH и CN и кинет. кинетика

в обл. от 3000 до 5200 Å показало, что

- а) кривая спектр. энергии излучения имеет распределение энергии, соответствующее температуре $2400 \pm 200^\circ \text{K}$.
- б) кривая спектр. излучения с λ увеличивается от 3500 до 4600 Å с максимумом при 4000 Å.
- в) кривая спектр. в обл. 3000 - 500 Å аналогична кривой для излучения СО.

В пределах точности измерения излучение, по-видимому, возможно, является равновесным излучением образцов C_2 и связ. с ними излучение рассматривается и вероятно имеет ту же природу. Среднее



C₃

Marr G. V.

11957

Can. J. Phys. , 35, 1245

The luminous mantle of
fuel-rich oxyacetylene flames,
II. Free radicals and conti-
num intensities, and their
influence on the C₃ emissions.

СЗ

Phillips J. G.

1957

Mem. Soc. Roy. Sci. Liège 18, 538-43

Ориентальные литературные
координаты характерных
элементов Снеира СЗ.

РШФ, 52
1959, 4338

~~Нерв~~ ~~Китка~~ ~ 3000°K.
узловая грудная нерв

C3 Doherty.

C-C = 1,28

Thompson Sub/ou (1958)

51/CS/UV/6. Douglas A. E. Astrophys. J., 114, 466.

54/CS/UV/8. Clausen K., Douglas A. E.

Canad. J. Phys. 32, 319.

C₃

Flaser L.

11958

Ann. Astrophys., 21, 114.

Some new bands emitted by
the oxyacetylene flame (in
French).

63

Marr G.V., 1958
 Publ. Microb. Soc. Pacific 70, 197-201

Возможный барьер и реакция
 связан с изучением радиации
 в лабораторных и астроном.
 условиях.

Континуум связанный с полем ζ
 в среде CH_2/O_2 и др.
 связан с реакцией $\text{C}(\text{P}) + (\text{C}_2\text{V}^{\text{BT}}) \rightarrow$
 $-\text{C}_3(\Sigma) + \text{H}^+$ (континуум), followed by

CA-52
 117, 14321 6

$G(\Sigma) \rightarrow G(\pi) + h\nu$ (bands).

Такой континуум не есть. В синфрак-кан
и сам-по рассеиваемый выше уровня
образования возмущенный радиант G
не яв. - доминирующим при образовании G
в колор.

1959

~~UCRL~~
8727

Engelke J. L.

High-temperature studies of the
 C_3 molecule

сверх, шк. кабул. температура C_3 в атм. 3700-4850A
Температура ~ 3000-4000, но при излучении перекрывает

$\Pi_u - \Sigma_g^+$, не исследовано - осн. электр. сов. C_3
измерена таблица. энергии. в волн. ч. с точн.

2

в атм. 4045A. $\Delta H^\circ_{f0}(C_3, газ) = (189 \pm 5) \text{ ккал}$
Данные с. г. C_3 ($C_p, H-H, S, \phi^+$) при

298.15, 2000, 2500, 3000, 3500 и

UCRL

4000°K



8727

C₃

Drowart J., Burns R.P., 1959
De Maria G., Inghram M.G.

J. Phys. Chem., 31, 1131-1132

Mass spectrometric study
of carbon vapor.

1959

Herzberg G.

An. Real soc. esp. fis. y quim., ser. A,

1959, 55(a), 15-16, 179

Espectros de radicales libres.

 E_3 SiC_2 NH_2 HCO HNO NCO NCS CH_3 CH_2 C_2H

сн

C3

John L. Engelke

1959

US At Energy Comm. UCRL
-8727, 84pp, 1959.

Всплощательная. изучение мал-б
C3.

Гонимано, 2го псевдокоординату
C3 ива. 2адро подас
21140; Swings-a, сбержаневер с итеродам

$^4\text{P}_u \rightarrow ^1\Sigma_g^+$. Интегральное поперечное
сечение для C_{H_2} ас. $f = 0,2$.

Интегральный коэффициент попереч. и излучения
в линии $\text{C}_{\text{H}_2}^+$ равен 181 ± 10 и $197 \pm 10 \text{ км}^2/\text{мкс}$
в ас. и миним. предполож.
режиме образования C_3 .

C₃

Pitzer K., Clementi E. 1959.

J. Am. Chem. Soc., 81, 4477.

Large molecules in carbon
combustion phenomena.

C₃

Pitzer K., Clementi E.

1959

JACS, 1959, 81, 4778

G₃

Baun William L., Fischer David W.

J. Chem. Phys., 35, n4, 1578

Ассоциации углеводных
анионов из графита в воз-
высочастотном поле
разряде. ●

СЗ
1

1639. Волновые функции основного состояния линейных молекул. Clementi Enrico. Ground-state wave functions for linear molecules. «J. Chem. Phys.», 1961, 34, № 4, 1468—1469 (англ.).—Сообщаются некоторые результаты предпринимаемых в Чикагском университете систематич. расчетов волновых функций трех- и четырехатомных молекул с помощью электронно-счетных машин. Приводятся орбитальные коэф. энергии МО линейных трехатомных молекул C_3 , N_3^- , NO_2^+ , HF_2^- , полученные по методу самосогласованных МО ЛКАО. В качестве АО использовали функции слейтеровского типа с экспонентами для свободных атомов. Полные энергии для перечисленных выше молекул равны (в ат. ед.): —113,08754, —162,54219, —202,90110, —198,28264. М. Местечкин

х. 1962. 1.

1961

C₃Gen. Conf.1 Σ_g^+ space
energy

Ground-state wave functions for linear molecules.
 Enrico Clementi (Univ. of Chicago). *J. Chem. Phys.*
 34, 1468-9(1961).—Slater-type at. orbitals were used as a
 basis to calc. the L.C.A.O.-M.O.-S.C.F. wave functions
 for the $1\Sigma_g^+$ ground states of C_3 , N_3^- , NO_2^+ , and HF_2^- .
 The total energy in at. units is, resp., -113.08754,
 -162.54219, -202.90110, and -198.28264. R. Benz

C.A. 1961, 55 19
 18284f

C₃

Cuegg

The C₃ spectrum at 4050 Å. B. Rosen (Univ. Liege, Belg.). *Astron. J.* 66, 383(1961).—High-dispersion spectra were obtained, showing structure in bands of CH, NH, CN, and C₃ for several bright comets. For the C₃ system 55 emission features were measured in the spectrum of comet Burnham (1959 k). No definitive analysis of these bands was made, but the main feature at 4050 Å. undoubtedly belongs to the (0,0) transition.

C. C. Kiess

C. A. 1962. 56.7
6797a

C₃ 12 В160. Спектр C₃. Brewer Leo, Engle-
ke John L. Spectrum of C₃. «J. Chem. Phys.», 1962,
36, № 4, 992—998. (англ.) 1962

Изучены термодинамич. и спектроскопич. свой-
ства молекулы C₃ путем исследования темпера-
турной зависимости давления паров, масс-спектро-
метрич. исследований, анализа спектров поглощения
и излучения в области 3500—5000Å в широком интер-
вале т-р (печь Кинга) и т. д. Определены интегр. интен-
сивности полос (рассчитаны силы осцилляторов) и
вычислена энтальпия сублимации C₃ при различных
т-рах. Показано, что значения последней величины,
полученные разными методами (напр., по спектрам
поглощения и излучения), хорошо согласуются друг
с другом, причем среднее значение равно
188 ккал/моль. Предложена новая электронно-коле-
бательная схема образования спектра C₃ в области
3500—4500Å. Показано, в частности, что т. наз.
континуум C₃, наблюдаемый в спектрах некоторых
источников, на самом деле является псевдоконти-
нуумом и обусловлен переходами между обычными

см. таб.

Ф. 1962. 123

8581
114

дискретными уровнями ($A^1\Pi_u \rightarrow X^1\Sigma_g^+$), которые по-разному возмущены в различных источниках (печах, электрич. разряде или кометах). Указана величина частоты $000-000$ -перехода (24686 см^{-1}) и приведены значения колебательных частот, активных в электронном спектре молекулы C_3 . Библ. 26 назв. Н. Бахшиев

21Б46. Спектр C_3 . Brewer Leo, Engelke John L. Spectrum of C_3 . «J. Chem. Phys.», 1962, 36, № 4, 992—998 (англ.).—С целью выяснения происхождения непрерывного фона в спектре C_3 предприняты измерения интегрального поглощения равновесного пара C_3 в печи Кинга при t -ре 3200° . Обработка полученных данных показывает, что этот фон является псевдоконтинуумом, так как не может быть связан с диссоциацией C_3 на $C_2 + C$. Последнее предположение потребовало бы для объяснения наблюдаемой интенсивности считать силу вибратора порядка 10^6 . Измерение зависимости интенсивности непрерывного фона спектров поглощения и излучения от t -ры дало возможность определить энтальпию сублимации C_3 $\Delta H_0^0 = 188 \pm 5$ ккал/моль, что согласуется с данными измерений другими методами. Отсюда заключено, что рассматриваемое сплошное поглощение отвечает тем же связанным состояниям, что и дискретные полосы Свингса, трактуемые как C_3 ($A^1\Pi_u - X^1\Sigma_g^+$). Сила вибратора для полос 4050 А C_3 определена как 0,13 с возможной ошибкой в 2 раза. В. Дианов-Клоков

х. 1962. 21

8585

1159

much 4858

1962

Spectrum of C_3 . Leo Brewer and John L. Engelke (Univ. of California, Berkeley). *J. Chem. Phys.* 36, 992-8 (1962).—The enthalpy of sublimation of C_3 was detd. to be 188 kcal./mole by a 2nd-law method by using both emission and absorption measurements. The results agreed with the total vapor pressure and mass spectrometer measurements. The enthalpy agreement and integrated absorption coeff. measurements demonstrate that the so-called continuum of C_3 is a pseudocontinuum and involves the same bound states as the discrete Swings bands of C_3 ($A^1\Pi_u-X^1\Sigma_g^+$). An oscillator strength for the 4050-A. bands was 0.13. Henry Leidheiser, Jr.

C. A. 1962. 56. 13

15058 ab.

$$V_1'' = 1300 \quad V_2'' = 550 \quad V_3'' = 2200$$

$$V_1' = 1130 \quad V_2' = 420 \quad V_3' = 2000$$

000-000
4050A

полоса и имеет кант при

24686 см⁻¹

010-010
40728

1962

С₃
14 Б93. Спектр поглощения паров углерода в твердом аргоне при 4 и 20° К. Barger R. L., Broida H. P. Absorption spectrum of carbon vapor in solid argon at 4° and 20° K. «J. Chem. Phys.», 1962, 37, № 5, 1152—1153 (англ.)

Измерены спектры паров углерода, нанесенных на матрицу из твердого аргона в области 3000—6000 Å при 4 и 20° К. В области 3797—4221 Å в спектре наблюдаются полосы поглощения (21 полоса), которые отнесены к поглощению С₃. В более длинноволновой области лежат полосы 5269 и 5208 Å, отнесенные к поглощению С₂. При повышении т-ры от 4 до 20° К полуширина полос увеличивается в полтора раза.

Н. Куплетская

X-1963-14

C₃C₂

Absorption spectrum of carbon vapor in solid argon at 4 and 20°K. R. L. Barger and H. P. Broida (Natl. Bur. of Stds., Boulder, Colo.). *J. Chem. Phys.* 37, 1152-3(1962). A spectrum consisted of 21 absorption lines and a broad continuum was observed at 3797-4221 Å. The spectrum was attributed to C₃. Two weak and broad lines were observed at 5269 and 5208 Å.; these were attributed to C₂. Henry Leidheiser, Jr.

2 vapors

C.A. 1963. 58. 1

1454

C₃

12 В57. Самосогласованная волновая функция МО ЛКАО для $^1\Sigma_g^+$ основного состояния C₃. Clementi Enrico, McLean A. D. SCF—LCAOMO wave function for the $^1\Sigma_g^+$ ground state of C₃. «J. Chem. Phys.» 1962, 36, № 1, 45—47 (англ.)

1962

Вычислена энергия и волн. ф-ция основного

$$^1\Sigma_g^+ (1\sigma_g)^2 (1\sigma_u)^2 (2\sigma_g)^2 (3\sigma_g)^2 (2\sigma_u)^2 (4\sigma_g)^2 (3\sigma_u)^2 (1\pi_u)^4$$

состояния молекулы C₃ для экспериментально наблюдаемой величины расстояния между соседними атомами $R_{CC} = 1,281 \text{ \AA}$ при линейном симметричном расположении атомов. Расчет произведен самосогласованным методом МО, являющихся линейной комбинацией атомных ф-ций Слейтера. Взаимодействие конфигураций не учитывалось. Сообщаются результаты четырех различных вариантов расчета, различающихся кол-вом плп видом АО, образующих базисную систему ф-ций вариац. метода решения. Рассчитанные значения полной энергии, в зависимости от выбора базисных АО Слейтера, составляют —113,08754; —113,10970; —113,16254 и —113,1651 ат. ед., в то время как сумма энергий трех атомов С

ф. 1962. 12 В

см. и об.

в основных 3P -состояниях равна: 1) —112,857 ат. ед. при расчете вариац. методом с миним. базисной системой АО Слейтера, 2) —112,8672 ат. ед., если, кроме того, минимизировать энергию по отношению к величинам эффективных зарядов и 3) —113,565 ат. ед. — эксперим. величина. Характер получаемой волн. ф-ции соответствует почти чистой структуре: $C=C=C$. Вычисления выполнены на электронной счетной машине по программе, описанной ранее (РЖФиз, 1961, 1В50). С. Ветчинкин

Иных
16р

1962

3

S.C.F.-L.C.A.O.-M.O. wave function for the $1\Sigma_g^+$ ground state of C_3 . Enrico Clementi and A. D. McLean (Univ. of Chicago). *J. Chem. Phys.* 36, 45-7(1962); cf. CA 57, 4183f. Four different wave functions for the $(1\sigma_g)^2 (1\sigma_u)^2 (2\sigma_g)^2 (3\sigma_g)^2 (2\sigma_u)^2 (4\sigma_g)^2 (3\sigma_u)^2 (1\pi_u)^4: 1\Sigma_g^+$ ground state of C_3 were calcd. with the use of 4 different base sets of Slater-type orbitals which were formed from those previously computed for the C_2 mol. (CA 55, 18284e; Mulliken, CA 55, 23029i). S.C.F. wave functions for occupied mol. orbitals and the corresponding orbital energies are tabulated. The 4 computed total energies range from -113.16518 to -113.08754 at. units.

R. Benz

C.A. 1962-57.7

8068 yk

C₃
=

1962

18Б13. Волновая функция самосогласованного поля МО ЛКАО для основного $^1\Sigma_g^+$ -состояния C₃. Clementi Enrico, McLean A. D. SCF—LCAO-MO wave function for the $^1\Sigma_g^+$ ground state of C₃. «J. Chem. Phys.», 1962, 36, № 1, 45—47 (англ.).—В рамках самосогласованного метода МО ЛКАО рассчитана волновая функция основного состояния линейной системы молекулы C₃ при межъядерном расстоянии C—C 1,28 Å. Однодетерминантная волновая функция состояния $^1\Sigma_g^+$ отвечала конфигурации $(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(2\sigma_g)^2(3\sigma_g)^2 \cdot (2\sigma_u)^2(4\sigma_g)^2(3\sigma_u)^2(1\pi_u)^4$, причем при построении МО использовались четыре различных приближения: выбор одной слейтеровской АО для каждого ядра C при построении определенной МО, выбор двух $2p\sigma$ -АО на центральном ядре, выбор двух $2p\sigma$ -АО на центральном атоме с добавочной примесью $3d\sigma$ -АО на центральном атоме и $3d\pi$ -АО на крайних атомах, выбор двух $1s$ -АО на центральном атоме. Рассчитанные полные энергии соответственно равны —113,08754, —113,10970,

см. ил. об.

X. 1962.18

—113,16254 и —113,16518 ат. ед. Общий выигрыш в полной энергии за счет последовательного расширения базиса оказывается сравнительно малым $\sim 2,1$ эв. На основании общей картины распределения электронной плотности структура C_3 может быть отображена ф-лой $:C=C=C:$.

Е. Никитин

оттиск 1008

I962

C₃

Herzberg G.

Internat. Sympos. Molec. Struct. and
Spectrosc. Tokyo, 1962. S. I. S. a., Q3/I-
G3/II

Последние работы по спектрам сво-
бодных радикалов.

(M. SiC₂

7 Д177. Спектральные исследования паров углерода, конденсированных в инертных матрицах при 4 и 20° К. Weltner William, Jr, Walsh Patrick N. Spectroscopy of carbon vapor condensed in inert matrices at 4° and 20° К. «J. Chem. Phys.», 1962, 37, № 5, 1153—1154 (англ.)

Спектр поглощения C_3 , изолированного в твердых матрицах Хе, Аг и Не при т-рах 4 и 20° К, исследован в области системы полос 4050 Å. Образцы получались осаждением на охлажденное до 4 или 20° К окно из CsBr углерода, испаряемого при т-ре 2400° К с чистого графитового стержня. На это же окно направлялся поток инертного газа со скоростями 0,5—1 л/час. Отмечается, что полоса C_3 при 4072 Å не смещается при переходе от газа к матрице Не, полоса у 4050 Å при этом смещается на 50 cm^{-1} в красную сторону. В спектре разбавленной матрицы Не наблюдаются 4 пары полос (4072 и 3933, 4058 и 3921, 4020 и 3886, 3979 и 3847 Å), разность между которыми составляет 868, 861, 858 и 862 cm^{-1} . Эта частота отнесена к частоте ν_1 сим. вал. кол. C_3 в возбужденном состоянии. Спектр C_3 в матрице Аг согласуется с полученным другими авторами. Здесь также наблюдаются пары полос с разностью частот около 860 cm^{-1} . В ИК-области полу-

ф. 1963-7

IV-10020
8.2-5422-11

чена только одна полоса, отнесенная к ν_3 асим. вал. кол. C_3 в основном состоянии. Она встречается при 2040 см^{-1} в матрице Ne как дублет при 2036 и 2040 см^{-1} в Ar и как слабый дублет при 1993 и 2021 см^{-1} в Xe. Некоторые слабые полосы, обусловленные C_2 , обнаружены между 5199 и 5269 Å в матрице Ne и вблизи 4700 и 5200 Å в матрице Ar.

К. Василевский

С₃
С₂
14 Б131. Спектроскопия паров углерода, конденсированных на инертных матрицах при 4 и 20° K. Weltner William, Jr, Walsh Patrick N. Spectroscopy of carbon vapor condensed in inert matrices at 4° and 20° K. «J. Chem. Phys.», 1962, 37, № 5, 1153—1154 (англ.)

Исследованы ИК-спектры в области 3—33 м, а также видимые и УФ-спектры поглощения паров углерода, нанесенных на матрицы из Ne, Ar и Xe при 4 и 20° K. В области 3800—4050 Å в спектрах на матрицах из неона и аргона обнаружено 8 полос, принадлежащих поглощению С₃. Разность между парами этих полос, равная 860 см⁻¹, отнесена к ν₁ — симм. вал. кол. С₃ в возбужденном состоянии. В ИК-области для матрицы из Ne имеется одна полоса асимм. вал. кол. С₃ в основном состоянии при 2040 см⁻¹, превращающаяся в дублет для матриц из Ar и Xe. К поглощению С₂ относят полосы 5199 и 5269 Å в Ne и 4700 и 5200 Å в Ar.

Н. Куплетская

X-1963-14

1962

11

В.р-5422

Bep-M 321-IL

1962

C₃(Di)

Welther W.,
Condensation. Evaporation
Solids Proc. intern. Symp.,
Dayton, Ohio, 1962, 243-53

C₃

W. Weltner, Jr. and Y.R.W. Warn 1962
(Union Carbide Corp. Research Inst.
Tarrytown N.Y.) Jan. 1962
Contract D9-30-065-ORD-2787

Материал изданных вв. —
составляющих паров:
оксида сера и углерода.

III B₂D₃

C₃

Семени Г., Семени Н.

I963

мекк.
раскелт

Распределение электронной плотности
в небольших молекулах.

"*J. Chem. Phys.*", 1962, 36, №II, 2824

Ф-1963.1Д

См. С₂(III)

1963

490

IV-9684

C₃

Checkup

②

2800000

C.A. 1964. 601

129 a

Spectrum of the C₃ molecule. L. Gausset, G. Herzberg, A. Lagerqvist, and B. Rosen (Univ. Liege, Belg.). *Discussions Faraday Soc.* 1963(35), 113-17. High-resolution spectra of the 4050-A. group of the C₃ radical were obtained in absorption in the flash photolysis of diazomethane. A reinvestigation of the 0-0 band at 4050 Å. shows the electronic transition to be of the type ${}^1\Pi_u - {}^1\Sigma_g^+$ (not $\Sigma_u^+ - {}^1\Pi_g$). From the analysis of several addnl. bands, esp. 000-020 and 010-010, it follows that the bending frequency ν_2'' of the ground state is very low (about 70 cm.⁻¹). Because of this low value of ν_2'' , a very large l-type doubling in the 010 level arises. For the same reason, the rotational const., α_2'' , is very large. The low value of ν_2'' combined with large vibronic (Renner-Teller) splittings of the levels involving ν_2' in the upper state ($\nu_2' \gg \nu_2''$) is largely responsible for the complexity of the vibrational structure of the 4050-A. group; since, even at room temp., ν_2'' is excited by several quanta, both progressions and sequences in ν_2 arise which, on account of the vibronic splittings, do not show the usual simple regularities.

S. E. Whitcomb

1963

490

10 Д126. Спектр молекулы C_3 . Gausset L., Herzberg G., Lagerqvist A., Rosen B. Spectrum of the C_3 molecule. «Disc. Faraday Soc.», 1963, № 35, 113—117 (англ.)

Получены спектры радикала C_3 в области 4050 Å в поглощении при импульсном фотолизе диазометана. Уточненный анализ O—O-полосы у 4050 Å показывает, что спектр соответствует электронному переходу ${}^1\Pi_u \rightarrow {}^1\Sigma_g^+$. Из анализа некоторых других полос, в особенности 000—020 и 010—010, следует, что деформационная частота ν_2'' основного состояния весьма мала ($\sim 70 \text{ см}^{-1}$). Поэтому наблюдается значительное удвоение l-типа для уровня 010. По той же причине вращательная константа очень велика. Малая величина ν_2'' в основном обуславливает сложность колебательной структуры спектра.

 C_3

интер

N-9634

ф. 1964. 108

C3

Dixon R.N.

1963

Discussion Faraday Soc.

1963, 35, 222.

by ~~pastor~~ Weldner on McLeod.

СЗ 8/4

Nixon R.N., Walsh H.S. 1963.

Nise. Faraday Soc., 1963, 35, 223.

Исследования Габриэля Goussard, Кер-
берга, Лагершмидта и Розен-
а о оптометрии нуклео-
нх значешие $\nu_2 \sim 700 \text{ см}^{-1}$.

C₃

Hertzberg G.

1963

1009

см. пункт.

"Discussions For Soc."

Э. Вайд. соет.

1963, № 35

"Determination of the Struct.,

1963

41M - 10

C, C₂, C₃, C₄

Стабильность
механизма. Струк-
тура

Mueller H.

Z.Chem., 1963, 3(10), 369-78

Physical stability and ...

J

12 Д224. • Спектры свободных многоатомных радикалов. Рамзай Д. В сб. «Успехи спектроскопии». М., Изд-во ин. лит., 1963, 11—74 1963

В обзоре обобщен накопленный материал по спектрам многоатомных свободных радикалов и технич. приемы, используемые для получения этих спектров. Дано описание спектров радикалов, полученных методами электрич. разрядов, пламен, флуоресценции, непрерывного и импульсного фотолиза, методами высокотемпературных печей и замороженных радикалов, а также химич. методами. Обсуждены спектры радикалов C_3 , CO^+_2 , CS^+_2 , $C_4H^+_2$, HCO , DCO , HNO , DNO , NH_2 и ND_2 , для которых выполнен подробный анализ вращательной структуры. При интерпретации спектров использован метод МО с привлечением орбитальных диаграмм Уолша. На примере спектра поглощения радикала NH рассмотрено влияние на колебательные спектры линейных многоатомных молекул взаимодействия электронного момента кол-ва движения с моментом, связанным с деформационными колебаниями молекул (эффект Реннера). Библи. 195 назв. В. Колобков

C_3
спектр

A-87

оттиск

ф. 1963. 12А

1963

C₃
SiC₂

✓ 12 Д180. Спектроскопия молекул C₃ и SiC₂ в неоновых и аргоновых твердых растворах. Weltner W., Jr., McLeod D., Jr. Spectroscopy of C₃ and SiC₂ molecules in neon and argon matrices. Abstract. «Sympos. Molec. Struct. and Spectrosc., Columbus, 1963, Columbus Ohio, s. a., 47—48 (англ.)

Измерены ИК- и УФ-спектры поглощения C₃ в неоне и аргоне при 4 и 20° К, а также спектры люминесценции в видимой области. Выделены полосы, отвечающие колебаниям в основном и возбужденном состоянии. Сделан вывод, что наблюдаемый переход скорее ${}^3\Pi_u \leftrightarrow X^3\Sigma_g^-$, чем ${}^1\Pi_u \leftrightarrow {}^1\Sigma_g^+$. Аналогичные измерения проведены для SiC₂. В спектрах обнаружены полосы примесей Si₂; Si₂C; Si₂C₃. Д. Глебовский

ВФ-10022-17

Ф. 1964. 128

X

C₃

125 Б62. Спектроскопия C₃ и SiC₂ в матрицах неона и аргона. Weltner W., Jr., McLeod D., Jr. Spectroscopy of C₃ and SiC₂ molecules in neon and argon matrices. Abstract. «Sympos. Molec. Struct. and Spectrosc., Columbus, 1963». Columbus Ohio, s. a., 47—48 (англ.)

Изучены УФ- и ИК-спектры поглощения и спектры флуоресценции молекул C₃ в матрицах неона и аргона при 4 и 20° К. Спектр в неоне близок по своему характеру к хорошо известному спектру испускания комет, начинающемуся при 4050Å. Найденные из УФ-спектра значения частот колебаний C₃ в возбужденном состоянии равны 1100 см⁻¹ (ν₁') и 420 см⁻¹ (ν₂'). Из ИК-спектров поглощения и флуоресценции для основного состояния получены значения ν₁ 1235 см⁻¹ и ν₃ 2042 см⁻¹. Данные УФ-спектров согласуются с литературными данными: ν₂ ~ 70 см⁻¹. Показано, что наблюдаемая полоса скорее относится к переходу ³Π_u—X³Σ_g⁻, чем к ожидавшемуся переходу ¹Π_u—¹Σ_g⁺. Подобное исследование проведено также с молекулой SiC₂, спектр которой ранее наблюдался в излучении звезд. Поглощение начинается около 4963Å и содержит серию полос, часть из которых может быть отнесена к молекулам Si₂, Si₂C и Si₂C₃.

Из резюме авторов

х. 1965-5

1963

ВФ-10022-11

12

С₃
№ 22 Б15. Теоретическое исследование электронной структуры молекул, содержащих *sp*-гибридные атомы. II. Молекула С₃. Julg André, Pellégatti Alain. *Recherches théoriques sur la structure électronique de molécules contenant des atomes hybridés en sp: II: La molécule С₃*. «Theoret. chim. acta», 1964, 2, № 3, 210—214 (франц.; рез. англ., нем.).

Расчет молекулы С₃ по улучшенному методу МО ЛКАО (Сообщение I, РЖХим, 1965, 14Б83) произведен в двух вариантах: без учета электронного смещения вдоль δ -связи и с учетом такого смещения. При расчете по первому варианту получаются слишком высокие остаточные заряды у крайних атомов (q_1 и q_3). Кроме того, не наблюдается равенства значений для интегралов остова I_{12} и I_{21} . Указанные недостатки удастся избежать во втором варианте. При этом вычисленные заряды равны $q_1 = q_2 = 0,09$; полученное в результате расчета меж-атомное расстояние С—С равно 1,286 А и хорошо согласуется с опытным значением. Рассчитанные энергии первых двух $N \rightarrow V$ -переходов ${}^1\Sigma_g^+ \rightarrow {}^1\Sigma_u^- = 4,7$ эв, ${}^1\Sigma_g^+ \rightarrow \Delta_u = 4,8$ эв. По данным, полученным путем изучения спектров комет, энергии этих переходов должны быть $> 4,1$ эв.

М. Адамов

Х. 1965. 22

1964

11-19-11

C₃

5 Д108. Теоретическое исследование электронной структуры молекул, содержащих *sp*-гибридные атомы. II. Молекула C₃. Julg André, Pellégatti Alain. Recherches théoriques sur la structure électronique de molécules contenant des atomes hybridés en *sp*. II. La molécule C₃. «Theoret. chim. acta», 1964, 2, № 3, 210—214 (франц.; рез. англ., нем.)

Расчет молекулы C₃ по улучшенному методу МО ЛКАО произведен в двух вариантах: без учета электронного смещения вдоль σ -связи и с учетом такого смещения. При расчете по первому варианту получаются слишком высокие остаточные заряды у крайних атомов (q_1 и q_3). Кроме того, не равны интегралы остова I_{12} и I_{21} . Указанных недостатков удастся избежать во втором варианте. При этом вычисленные заряды равны $q_1 = q_3 = 0,09$, полученное в результате расчета межатомное расстояние C—C равно 1,286 Å и хорошо согласуется с опытным значением. Рассчитанные энергии первых двух $N \rightarrow V$ -переходов ${}^1\Sigma_g^+ \rightarrow {}^1\Sigma_u^-$, ${}^1\Sigma_g^+ \rightarrow \Delta_u$ равны соответственно 4,7 и 4,8 эв. По данным, полученным путем изучения спектров комет, энергии этих переходов должны быть выше чем 4,1 эв. Ч. I см. реф. 5Д107. М. Адамов

1964

1965

ф. 1965. 58

C₃

1964

✓ 4 Д192. Аномалии колебательных силовых постоянных. Pitzer Kenneth S., Strickler S. J. Abnormalities in vibrational potential constants. «J. Chem. Phys.», 1964, 41, № 3, 730—732 (англ.)

Приведены величины силовых постоянных угла между двойными связями $=C=N=N=$ для 9 линейных и квазилинейных молекул. Отмечена большая область ее изменения (от 0,095 до $7,7 \cdot 10^{-12}$ эрг·град⁻²). Малое значение силовой постоянной угла $C=C=C$ в молекуле C₃O₂ позволяет объяснить ее ИК-спектр. Очень низкое значение для C₃, полученное из спектроскопич. данных, приводит к завышенным значениям некоторых термодинамич. величин. Библ. 13 назв. С. С.

ф. 1965. 4А



Monogram. Schickler S.Y., Pitzer K.S. 1964.

C_3 Molecular Orbitals in Chemistry

Academic Press Inc., New York
1964.

Energy Calculations for
Polyatomic Carbon Molecules
281-291

1964

Spectroscopy of carbon vapor condensed in rare-gas matrixes at 4 and 20°K. I. W. Weltner, Jr., P. N. Walsh, and C. L. Angell (Union Carbide Res. Inst., Tarrytown, N.Y.). *J. Chem. Phys.* 40(5), 1299-1305(1964). The mols. vaporizing from graphite at 2300-600°K. were trapped in Ne, Ar, and Xe matrixes at 4 and 20°K. The near-ultraviolet bands of C₃, beginning at 4050 Å. in the gas, were observed in the absorption spectra of these matrixes, but shifted to 4057 Å. in Ne, 4102 Å. in Ar, and 4226 Å. in Xe. The Ne spectrum is strikingly similar to low-temp. gaseous spectra, including cometary spectra, but the matrix bands occur in groups about 100 cm.⁻¹ wide. The infrared spectrum yields a strong band at 2038 cm.⁻¹ in Ar (2042 cm.⁻¹ in Ne) which is assigned to ν_3'' , the asymmetric stretching frequency of C₃ in the ground electronic state. When the Ar matrix is allowed to warm up, diffusion occurs, and larger carbon mols. C₄, C₅, C₆, etc., are formed, causing the appearance of many new bands in the infrared. The Swan bands of C₂ are observed in Ne and Ar matrixes, but only after some annealing of the matrix has occurred by warming. The vibrational frequency of C₂ in the excited ³II_u state in a Ne matrix is 2094 cm.⁻¹, exceeding the value found in any other matrix or in the gas (1750 cm.⁻¹). The possible appearance of C₂ in its ¹Σ_g⁺ ground state in Ne and Ar matrixes

C.A. 1964. 60. 7

7589 h - 7590 ab

C.A. 1964. 60. 7

is discussed briefly. II. William Weltner, Jr., and Donald McLeod, Jr. *Ibid.* 1305-16. The vaporization of ^{13}C -substituted carbon has established the isolation of C_3 mols. in the matrix and the assignment of the ν_2'' frequency observed in the infrared spectrum. A vibrational analysis of the near-ultraviolet spectrum (the well-known 4050-A. gas bands) of C_3 trapped in a Ne or Ar matrix was carried out. The presence of a large Renner effect ($\epsilon = \pm 0.566$) in the bending motion in the excited state of this ${}^1\Pi_u \leftrightarrow {}^1\Sigma_g^+$ transition was confirmed. Infrared and fluorescence spectra also support the assignment of a low bending frequency ($\sim 70 \text{ cm.}^{-1}$) in the ground state as recently proposed by Gausset, *et al.* (CA 60, 128h). Then the following vibrational frequencies apply: ${}^1\Pi_u$ state $\nu_1' = 1125 \text{ cm.}^{-1}$, $\nu_2' = 305 \text{ cm.}^{-1}$, $\nu_3' = ?$; ${}^1\Sigma_g^+$ ground state $\nu_1'' = 1235 \text{ cm.}^{-1}$, $\nu_2'' \cong 70 \text{ cm.}^{-1} (?)$, $\nu_3'' = 2040 \text{ cm.}^{-1}$. ν_2'' is still doubtful because it does not yield thermodynamic functions for C_3 which agree with those derived by mass spectrometry. The f number (oscillator strength) of the 0-0 band is $\sim 7 \times 10^{-4}$ in a Ne matrix. The properties of a long-lived emission (lifetime = 0.02 sec. in Ne) at 5856 A. indicate that it is the ${}^1\Pi_u \rightarrow {}^1\Sigma_g^+$ transition of C_3 . Another, rather unpredictable, system of bands near 4200 A. was also seen in absorption and emission, but the mol. producing these bands was not identified. An attempt was made, via a linear chain model, to assign the stretching frequencies of the larger carbon molecules, $\text{C}_4, \dots, \text{C}_{12}$, which were observed in the infrared after solid-state diffusion was allowed to occur. RCJQ

3
Спектр

11 Д178. Спектроскопия паров углерода, сконденсированных в матрицах редких газов при 4 и 20° К. I. 1964
Weltner W., Jr, Walsh P. N., Angell C. L. Spectroscopy of carbon vapor condensed in rare-gas matrices at 4° and 20° K. I. «J. Chem. Phys.», 1964, 40, № 5, 1299—1305 (англ.)

Проведено спектральное исследование (область 4230—3790 Å) методом матричной изоляции при 4 и 20° К молекул углерода, полученных испарением из графита. В качестве редких газов использованы Ne, Ar и Xe. Полосы поглощения C_3 в близкой УФ-области, начинающиеся в газе при 4050 Å, сдвинуты в спектрах матриц (М) к 4057 Å в Ne, к 4102 Å в аргоне и 4226 Å в Xe. Спектр C_3 в неоновой М сходен со спектром газа при низкой т-ре и со спектром комет. Сильная ИК-полоса поглощения 2038 см^{-1} в Ar (2042 см^{-1} в Ne) отнесена к ν_3'' — частоте несим. вал. кол. C_3 в основном электронном состоянии. Нагревание аргоновой М вызывает появление новых ИК-полос вследствие диффузии молекул C_3 и образования молекул C_4 , C_5 , C_6 и т. д. Наблюдены сван-полосы поглощения C_2 . Частота колебаний C_2 в возбужденном $^3\Pi$ -состоянии в неоновой М (2094 см^{-1}) превосходит по величине аналогичные частоты колебаний C_2 в других М и в газе (1750 см^{-1}). Библ. 32 назв.

9.1964.112

✕

C₃

1964

3 Д175. Спектроскопия паров углерода, сконденсированных в матрицах редких газов при 4 и 20° К. Ч. II. Weltner William, Jr, McLeod Donald, Jr. Spectroscopy of carbon vapor condensed in rare-gas matrices at 4° and 20° K. II. «J. Chem. Phys.», 1964, 40, № 5, 1305—1316 (англ.)

Продолжено спектральное исследование молекул углерода в области 4200—3520 Å методом матричной изоляции в Ne и Ar при 4 и 20° К. Дан колебательный анализ спектров поглощения и испускания матриц, содержащих молекулы C₃ и C¹³-замещенные молекулы C₃. Приведены следующие основные данные относительно электронных и кол. уровней энергии молекулы C₃: 4050 Å-0—0-полоса перехода ${}^1\Pi_u \leftrightarrow X{}^1\Sigma_g^+$; в возбужденном ${}^1\Pi_u$ -состоянии $\nu_1' = 1125 \text{ см}^{-1}$, $\nu_2' = 305 \text{ см}^{-1}$, пара-

ф. 1965. 3Д

метр Реннера $\epsilon = +0,566$. В основном электронном состоянии $^1\Sigma_g^+$: $\nu_1'' = 1230 \text{ см}^{-1}$, $\nu_2'' \cong 70 \text{ см}^{-1}$, $\nu_3'' = 2040 \text{ см}^{-1}$. Сила осциллятора 0—0-полосы 4050 Å $f = 7 \cdot 10^{-4}$. 0—0-полоса перехода $^3\Pi_u \leftrightarrow X^1\Sigma_g^+$ расположена около 5856 Å . Время жизни в триплетном состоянии в неоновой матрице при 4°K равно $0,02 \text{ сек}$. Новые полосы поглощения, появляющиеся в области $1300\text{—}3600 \text{ см}^{-1}$ при нагревании матрицы, отнесены к вал. кол. линейных молекул $\text{C}_4, \text{C}_5, \dots, \text{C}_{12}$. Библ. 20 назв. Ч. I см. РЖФиз, 11Д178.

M 1104 - IV

1965

S₂, C₃ (ALCA. norm.)

Brabson G.D.

U.S. At. Energy Comm. UCRL- 11976,
1965, 128pp

Spectroscopic investigation of high
temperature species isolated in inert gas
matrixes

F

J

CA., 1966, 64, N 5, 5936a

C₃

Barger R. L.

1965

Dissert. Abstr., 25(10), 6009

Spectra of C₂ and C₃ in frozen gases at 4°K and 20°K.

(Cell. C₂)

ВФ-М1107-IV

1965

6 Д244. Спектр C_3 в матрицах при 4 и 20° К. Bagger R. L., Broida H. P. Spectra of C_3 in solidified gases at 4° and 20° K. «J. Chem. Phys.», 1965, 43, № 7, 2364—2370 (англ.)

Изучен спектр молекул C_3 в матрицах из Ag, Kг, Хе, O_2 , N_2 , CO_2 , SF_6 при 4 и 20° К. Источником молекулярного пучка углерода с известной плотностью C_3 служила эффузионная ячейка, нагреваемая до т-ры 2900° К. В области 3000—4500 Å получены полосы поглощения, отнесенные к переходу ${}^1\Pi_u - X{}^1\Sigma_g^+$ молекулы C_3 . Приведены длины волн, ширины и интенсивности линий этой полосы. Вычислены основные колебательные частоты ν_1 и ν_2 для верхнего состояния ${}^1\Pi_u$ и ν_2 для основного состояния ${}^1\Sigma_g^+$, постоянные Реннера для ν_2 состояния ${}^1\Pi_u$ и сила осцилятора для перехода ${}^1\Sigma_g^+ - {}^1\Pi_u$ молекулы C_3 во всех матрицах. Сила осцилятора оказалась одинаковой во всех случаях и равной $\sim 6 \cdot 10^{-2}$. Обнаружено, что ширина линий C_3 меняется в различных матрицах от 40 до 500 cm^{-1} , а матричный сдвиг от —410 до 1065 cm^{-1} .
Библ. 17 назв. А. Беляева

спектр

ВФ-1324-121

1966. 6D

Kohn W., Sham L. J.

Quantum density oscillations in an inhomogeneous electron gas.
Phys. Rev., 1965, 137, N 6A, 1697—1705.

Квантовые колебания плотности неоднородного электронного
газа.

Spectra of C_3 in solidified gases at 4° and $20^\circ K$. R. L. Barger and H. P. Broida (U.S. Natl. Bur. of Stds., Boulder, Colo.). *J. Chem. Phys.* 43(7), 2364-70(1965)(Eng). Wave-length, line width, and intensity measurements were made, 3000-4500 A., of the spectra of triat. C mols. trapped in solid matrixes of Ar, Kr, Xe, O, N, CO_2 , and SF_6 at 4 and $20^\circ K$. The C source was a Knudsen cell, operated at temps. up to $2900^\circ K$., from which effused a mol. beam with known ds. of C_3 . Absorption transitions are assigned to vibrational levels of both upper and lower states of the ${}^1\Pi_u-X{}^1\Sigma_g^+$ 4050-A. group of C_3 . The fundamental vibrational frequencies ν_1 and ν_2 for the upper ${}^1\Pi_u$ state, ν_2 for the ground ${}^1\Sigma_g^+$ state, and Renner consts. for ν_2 of the ${}^1\Pi_u$ state in these matrixes are given. Measurements of absorption intensities give an oscillator strength, averaged for all matrixes, of 6×10^{-2} for the C_3 group. Little or no matrix effect on the intensities is found. However, exptl. detd. corrections to the intensities are necessary for effects caused by apparent diffusion of C in the matrixes to form nonabsorbing C aggregates. C_3 line widths vary with matrix from 40 to 500 $cm.^{-1}$, and C_3 line shifts vary from -410 to 1065 $cm.^{-1}$. All matrix shifts are to the red, except in the case of the CO_2 matrix. No definite effect of temp. on line widths or shifts is found.

RCJQ

C₃

11-13-65

11-10-65

N10

C.A. 1965.63

12512 g

C₃

B9-IV-M 868

1965
318

checkup,
u.n.,
acc. com.

Analysis of the 4050-A. group of the C₃ molecule. L. Gausset, G. Herzberg, A. Lagerqvist, and B. Rosen (Natl. Res. Council, Ottawa, Can.). *Astrophys. J.* 142(1), 45-76(1965)(Eng). The C₃ bands at 4050 Å., prominent in the spectra of comets, were obtained at high dispersion both in absorption and in fluorescence in the flash photolysis of CH₂N₂, in a multireflecting tube, at pressures of 0.005 to 0.040 mm., and mixed with N in the ratio 1:100. The bands represent transitions between vibronic levels in the lower $^1\Sigma_g^+$ state and the upper $^1\Pi_g$ state. The results of the analysis agree with those predicted theoretically for a mol. with 3 equal nuclei lying on a straight line. The similarity in the distribution of intensity in these bands in comets and in lab. sources is attributed to the near equality of the internuclear distances in the upper and lower states. Details of the measurements and analysis are listed in the tables.

C. C. Kiess

C.A. 1965. 63. 13
17319ab

Flux, 2.20e-20 W/m^2



С
[м.н.]
1 Д165. К-удвоение в линейных молекулах в состоя-
ниях $^1\Pi$. J. Johns J. W. C. K-type doubling of linear mo-
lecules in $^1\Pi$ electronic states. «J. Molec. Spectrosc.», 1965,
15, № 4, 473—482 (англ.)

Вращательные уровни, соответствующие колебатель-
ным уровням с симметрией Π в электронных состоя-
ниях Π линейных молекул, претерпевают удвоение. Оно
обусловлено взаимодействиями вращения с колебания-
ми и электронным движением. Оба типа взаимодействий
могут рассматриваться отдельно. Получены ф-лы для
поправок к энергии, соответствующих обоим взаимодей-
ствиям. Вычисление выполнено во втором приближении
теории возмущений. Поправки выражены через частоты
колебаний, квантовые числа (вращательные и колеба-
тельные) и постоянные Корнолиса. Численные расчеты
выполнены для молекулы Сз, для которой определены
значения параметра удвоения при различных значениях
колебательных квантовых чисел. Знаки этого параметра
совпадают со знаками опытных его значений. Однако в
абс. значениях имеются большие расхождения.

М. Ковнер

ф. 1966. 170

1965

С

738-11

11

139-11

C₃

1965

58996d C₃ and transition-metal oxide molecules. William Weltner, Jr. (Union Carbide Res. Inst., Tarrytown, N.Y.). NASA Accession No. N65-31322, Rept. No. AD 467028. Avail. CFSTI \$3.00 cy, 115-18(1965)(Eng). An unsuccessful attempt to observe another electronic transition of C₃(¹Σ_u⁺ . X¹Σ_g⁺) in a Ne matrix at 4°K. is described; the spectrum was measured out to the edge of the vacuum-uv region at 1900 Å. By reasoning from the ground states of TiO and TaO, M.O. may be constructed which allow a prediction of the ground states of the transition-metal diat. oxides of Groups IIIB to VIB of the periodic table. A predicted ¹Σ⁺ ground state has been confirmed for ZrO by matrix-isolation work. WO, WO₂, and the larger tungsten oxide mols. are briefly discussed. From *Sci. Tech. Aerospace Rept.* 3(20), 3390(1965). TCSI.

+ 4

C.A. 1967. 17. 12



1966

C₃

cncncp

Spectrum of C₃. L. Gausset (Univ. Liege, Belg.). *Mem. Soc. Roy. Sci. Liege, Collection in-8°* 12(1), 413-16(1966)(Fr). Fluorescence is used to provide the cometary emissions of C₃. The initial Boltzmann distribution, the method of cycles, and stationary states are used to establish the theoretical outline of the principal band. Parameters have been found for L , the no. of mechanisms necessary to attain equil., R , the parameter of the stationary states method, and N , the no. of levels with population $\geq 10^{-4}$.

V. Sutula

C.A. 1966. 68. 10

14642h

Обзор

1966

C₃
—

22

11 Д81. Спектры и строение трехатомных свободных радикалов. Герцберг Г. «Ж. Всес. хим. о-ва им. Д. И. Менделеева», 1966, 11, № 2, 146—153

Обзор. Дается краткое изложение спектроскопич. работ, в которых изучались трехатомные свободные радикалы, в том числе последних неопубликованных работ лаборатории проф. Г. Герцберга (Национальный научный совет Канады). Из приведенного обзора видно, что в течение последних 15 лет получены и изучены УФ-спектры довольно значительного числа трехатомных радикалов. Некоторые из этих радикалов давно известны химикам, но участие в химич. реакциях таких радикалов, как C_3 , NCN , BO_2 , ранее даже не предполагалось. Кроме того, в ряде случаев, из которых особо надо отметить CN_2 , установлено, что как триплетные, так и синглетные нижние состояния весьма существенны.

ф. 1966. 112



C₃

BQ - M945 - IV

1966

Molecular constants and thermodynamic functions of some linear symmetrical molecules. G. Nagarajan (Oklahoma State Univ., Stillwater). *Acta Phys. Austriaca* 21(4), 355-65(1966) (Eng). A brief vibrational analysis including fundamental frequencies and internuclear distances of C₃, Si₃, Ge₃, and XeF₂ mols. possessing a linear sym. structure is given. Mean-sq. amplitude quantities, generalized mean-sq. amplitudes, and mean amplitudes of vibration for the bonded and nonbonded atom pairs were calcd. by following Cyvin's method (CA 54, 5235d) but with different notations. The values are reported at the temps. $T = 0, 298, 500^\circ\text{K}$. The numerical values of the Bastiansen-Morino shrinkage effect are given at these temps. The mol. thermodynamic functions, such as heat content, free energy, entropy, and heat capacity, of Si₃, Ge₃, and XeF₂ mols. (Pitzer and Clementi, CA 54, 2849b) were calcd. at 100-2000°K. on the basis of a rigid rotator, harmonic oscillator-model. 50 references.

G. F. Goethel

+3ws

C.A. 1966. 65.4
4679 ef



M-1200-IV

1966

Spectroscopic studies of molecular constants in some polyatomic molecules. G. Nagarajan (Oklahoma State Univ., Stillwater). *Z. Naturforsch.*, a 21(3), 244-51(1966)(Eng). Force consts. have been evaluated by the Wilson group theoretical method (CA 35, 1280^s) for various ij_3 mols. possessing a planar trigonal symmetry. Mean sq. amplitude quantities and mean amplitudes of vibration for the bonded as well as nonbonded atom pairs have been computed at $T = 0^\circ\text{K.}$ and $T = 298^\circ\text{K.}$ for C_3 , Si_3 , and XeF_3 by the Cyvin method (Cyvin, CA 57, 7927g). The molar thermodynamic functions have been calcd. from spectroscopic data for Si_3 and XeF_3 on the basis of a rigid rotator, harmonic oscillator model. Bastiansen-Morino shrinkage effects (C., CA 57, 14445d) have been calcd. for various linear asym. ijk , linear sym. ij_3 , and tetrahedral ij_4 mols. at $T = 0$ and $T = 298^\circ\text{K.}$

F. Schossberger

C₃Si₃XeF₃

+2

C.A. 1966.65.7
9923e



C₃

1766
7 Б28. Корреляция электронной структуры и силовой константы изгиба в некоторых линейных молекулах. Smith Wm. Hayden, Leroi George E. Correlation of electronic structure and bending force constants in some linear molecules. «J. Chem. Phys.», 1966, 45, № 5, 1784—1786 (англ.)

эксперим.
значения
частот

силовые
конст.

В рамках методов МО и валентных схем исследована корреляция между силовой константой изгиба и электронной структурой молекул C₃, C₃N₂, C₃O₂, C₃S₂, C₃H₄, CCN, CCO, NCN, BO₂, NCO, NNO, CO₂. Приведены эксперим. значения частот и силовых констант. Рассмотрение методом МО приводит к выводу, что основное влияние на величину силовой константы изгиба центрального атома оказывает электронная плотность на высшей занятой орбите. Таким путем удастся объяснить экспериментально обнаруженный рост силовых констант изгиба для центрального атома С в ряду $C_3 \approx C_3O_2 < C_3S_2 < C_3H_4 < CO_2$.
В. Лебедев

+11

2. 1967. 7

21

C3

ВФ. М1683-IV

1966

12 Б126. Спектроскопия паров углерода, сконденсированных в матрицах из инертных газов при 4° K. III. Weltner William, Jr, McLeod Donald, Jr.
Spectroscopy of carbon vapor condensed in rare — gas matrices at 4° K. III. «J. Chem. Phys.», 1966, 45, № 8, 3096—3105 (англ.)

Исследованы УФ-спектры поглощения (8900—1950 Å) паров углерода, сконденсированных в матрицах из Ar и Ne при 4° K. Отмечено наличие различных мест захвата в матрице. Регулируемый разогрев матрицы из Ne,

X. 1967: 12

18

содержащей пары углерода, вызывал исчезновение множественности мест захвата для молекул C_3 , что способствует более определенному отнесению колебательных переходов в системе ${}^1\Pi_u \leftarrow X^1\Sigma_g^+$. Вплоть до 1950 А в матрице из Ne не наблюдалось перехода ${}^1\Sigma_u^+ \leftarrow X^1\Sigma_g^+$ для C_3 . В результате изучения спектра C_2 в неоновой матрице до и после разогрева до $12^\circ K$ подвергается сомнению отнесение полос в области 4000—6000 А к системе Свана для C_2 ; предложено их отнесение к большим молекулам углерода. Полоса 2320 А в Ne отнесена к полосе (0,0) системы $d^1\Sigma_u^+ \leftarrow X^1\Sigma_g^+$ для C_2 . Сделан вывод, что захват матрицами C_2 в возбужденном состоянии ${}^3\Pi_u$ менее вероятен, чем в основном состоянии $X^1\Sigma_g^+$. Отмечено, что в матрице из Ne при добавлении 0,06—0,5% N_2 происходит р-ция с образованием CNN . В спектрах молекул C_n обнаружено много новых колебательных полос; утверждается, что молекулу C_4 лучше записывать в виде $\cdot C \equiv C - C \equiv C \cdot$. Сообщ. II см. РЖХим, 1966, 13Б128.

С. Бурейко

ВРД 1683-IV

1966

5 D208. Спектроскопическое изучение паров углерода, конденсированных в матрицах из инертных газов при 4° K. III. Weltner William Jr, McLeod Donald, Jr. Spectroscopy of carbon vapor condensed in rare-gas matrices at 4° K. III. «J. Chem. Phys.», 1966, 45, № 8, 3096—3105 (англ.)

Исследованы УФ-спектры поглощения (8900—1950 Å) паров углерода, конденсированных в матрицах из Ag и Ne при 4° K. Отмечено наличие различных мест захвата в матрице. Регулируемый разогрев матрицы из Ne, содержащей пары углерода, вызывал исчезновение множественности мест захвата для молекул C₃, что способствует более определенному отнесению колебательных переходов в системе ${}^1\Pi_u \rightarrow X{}^1\Sigma_g^+$. Вплоть до 1950 Å в матрице из Ne не наблюдалось перехода ${}^1\Sigma_u^+ \leftarrow X{}^1\Sigma_g^+$ для C₃. В результате изучения спектра C₂ в неоновой матрице до и после разогрева до 12° K подвергается

ф. 1967. 550

Y

сомнению отнесение полос в области 4000—6000 Å к системе Свана для C_2 ; предложено их отнесение к большим молекулам углерода. Полоса 2320 Å в Ne отнесена к полосе (0,0) системы $d^1\Sigma_u^+ \leftarrow X^1\Sigma_g^+$ для C_2 . Делается вывод, что захват матрицами C_2 в возбужденном состоянии $^3\Pi_u$ менее вероятен, чем в основном состоянии $X^1\Sigma_g^+$. Отмечено, что в матрице из Ne при добавлении 0,06—0,5% N_2 происходит реакция с образованием CNN. В спектрах молекул C_n обнаружено много новых колебательных полос; утверждается, что в согласии с теорией молекулу C_4 лучше записывать в виде $C\equiv C-C\equiv C$. Библ. 28. Ч. II см. РЖФиз, 1965, 3Д175.

С. Бурейко

C3

B97-M-1683-IV 1966

Spectroscopy of carbon vapor condensed in rare-gas matrixes at 4°K. III. William Weltner, Jr., and Donald McLeod, Jr. (Union Carbide Res. Inst., Tarrytown, N.Y.): *J. Chem. Phys.* 45(8), 3096-105(1966)(Eng); cf. CA 60, 7589h. For C₃, controlled warming of Ne matrixes contg. C vapor caused the multiple sites for C₃ mols. to disappear. The assignments of vibronic transitions in the ${}^1\Pi_u \leftarrow X{}^1\Sigma_g^+$ system could then be made more definite by using the parameters of Gausset, *et al.* (CA 63, 17319a). Two unaccounted-for bands were attributed to transitions involving $\nu_3' \cong 840 \text{ cm.}^{-1}$. This low value was rationalized by comparison with other similar mols. The ${}^1\Sigma_u^+ \leftarrow X{}^1\Sigma_g^+$ transition of C₃ in a Ne matrix was not observed in the uv out to 1950 Å. For C₂, the spectrum of C-Ne matrixes, before and after warming to 12°K., indicated that the absorption bands, 4000-6000 Å., are probably not the C₂ Swan system but may be due to a larger C mol. A band at 2320 Å. in Ne was attributed to the (0,0) band of the Mulliken system (${}^1\Sigma_u^+ \leftarrow$

+2

C.A. 1966. 68.12

17904 de

$x^1\Sigma_g^+$) of C_2 . These and other observations indicate that the trapping of C_2 in the excited $^3\Pi_u$ state in matrixes is doubtful. CNN is formed in Ne matrixes contg. N by the reaction of C atoms in C vapor with N. The proportion of C atoms in the vapor and the formation of CNN can be enhanced by vaporization of C from thin W or Ta cells because of the formation and vaporization of the solid carbide. For C_n , carefully controlled diffusion of C mols. relatively concd. in a Ne matrix led to the appearance of many new vibrational bands. These were analyzed in terms of 2 extreme linear chain models. It is concluded, for example, that C_4 is probably best written as $\cdot C:C-C:C\cdot$, in agreement with theory.

RCJQ

1967

С₃
23 Б104. Изучение спектров поглощения свободных радикалов в пламенах. Jessen P. F., Gaydon A. G. Study of the absorption spectra of free radicals in flames. «Combustion and Flame», 1967, 11, № 1, 11—16 (англ.)

(снимок)
Для определения спектров поглощения свободных радикалов в пламенах сконструирована система с многократным (до 12 раз) отражением луча света. Изображение точечного источника с высокой яркостной т-рой (импульсной лампы) фокусируется не на поверхностях сферич. зеркал (как это делается обычно), а в зоне пламени на небольшом расстоянии a от общего центра кривизны обоих зеркал; поэтому оно мало портится неравномерностями показателя преломления и т-ры. Последующие изображения получают попеременно в двух точках по обе стороны от центра кривизны (в них располагаются две одинаковых горелки). Число отражений (и, следова-



X

X. 1967. 23

тельно, оптическая длина пути) зависит от a и диаметра зеркал. По спектру поглощения кислородно-ацетиленового пламени зарегистрированы следующие радикалы: в верхней части реакц. зоны в богатой смеси ($C_2H_2 : O_2 = 6 : 5$) — интенсивный электронно-колебательно-вращательный спектр C_2 с центром при 5165 Å, слабая полоса C_3 при 4051,5 Å (обнаружена впервые) и — в более бедной смеси — системы полос CN при 4315, 3900 и 3143 Å. Поглощение C_2 и C_3 (но не CN) наблюдается также и выше реакц. зоны (внутреннего конуса), что весьма интересно с точки зрения механизма образования углерода в пламени.

Р. Васильев

C₃

ВФ - 644 - XIV

1967

345

Д652. Спектры поглощения C₃ и C₃H₂ — продуктов импульсного фотолиза диазопропина. Meier A. J. Absorption spectra of C₃ and C₃H₂ from the flash photolysis of diazopropyne. «Canad. J. Phys.», 1967, 45, № 12, 4103—4111 (англ.)

Исследовано поглощение продуктов импульсного фотолиза диазопропина (HC₂·CHN₂). Спектр поглощения свободного радикала C₃ вблизи 4050 см⁻¹ (¹Π_u—¹Σ_g⁺-система C₃), появляющийся спустя 40 мсек. после импуль-

спектр,
м.п.

Ф. 1968. 92

☒

са фотовозбуждения, подобен спектру C_3 , полученному при импульсном фотолизе диазометана, но значительно превосходит его по интенсивности. Проведен колебательный анализ полос, не наблюдаемых ранее в спектре радикала C_3 . Уточнено положение уровня $\nu_2''=6$ ($l=0$) на ~~основании~~ частичного вращательного анализа 000—060-полосы ${}^1\Pi_u-\Sigma_g^+$. Определена частота вал. кол. $\nu_1''=1224.5\text{ см}^{-1}$ в основном состоянии. В области 31 000—3700 Å обнаружена новая система полос поглощения, отнесенная к свободному радикалу $HCCSH$ в синглетном состоянии. Анализ спектра C_3H_2 невозможен вследствие чрезвычайной сложности колебательной структуры и положения коротковолн. края поглощения ${}^3\Pi_u-{}^1\Sigma_g^+$ -системы радикала C_3 . Библ. 12. А. М. М.

C₃

14502y Absorption spectra of C₃ and C₃H₂ from the flash photolysis of diazopropyne. A. J. Merer (Natl. Res. Council Canada, Ottawa). *Can. J. Phys.* 45(12), 4103-11(1967)(Eng). The flash photolysis of diazopropyne HC₃CCHN₂ provides a particularly strong absorption spectrum of the free C₃ radical. About 40 μsec. after the photolysis flash, the appearance of the ¹Π_u - ¹Σ_g⁺ (4050 Å.) system of C₃ is similar to that obtained in the flash photolysis of diazomethane by Gausset, *et al.*, though much more intense. The intensity of the spectrum has permitted a study of the *l*-type doubling effect in the ground-state level 6ν₂, of which the Σ_g⁺ component has been found to lie at 458.2 cm.⁻¹. At shorter time delays (<20 μsec.) the spectrum is complicated by bands arising from the levels ν₁^{''} (1224.5 cm.⁻¹) and 2ν₁^{''} (2436.0 cm.⁻¹). Below 3700 Å. the C₃ spectrum is overlapped by absorption bands belonging to a new free radical, which has been identified from the intensity alternation in the rotational structure as the HCCCH radical. The vibrational structure of this system is exceptionally complex, and analysis has not been possible. The bands extend to about 3100 Å., but are predissocd. below 3450 Å.

RCCN

1967

345

XIV - 644 - 649 - 648



+1

C.A. 1968. 68. 10

II-2312 - IV

1967

C_3 (max. nat. mg p)

Strauss H.L., Thiele E.

J. Chem. Phys., 1967, 46, 17, 2473-2480.

Thermodynamics of C_3 . II. General methods for nonrigid molecules at high temperature.

RX., 1967, 9E21

Est/orig.

J

F.

1967 1 321 148.

СЗ

1981

вертикальн-
электрон-
спектры

Отчет „Комплексное исследование
физико-химических свойств и молекулярных
конформаций“ ИГУ, Хим-
фак, 1983 (годовой отчет
за 1981 г.)

C₃ 1968

47699z Synthetic profiles of C₃ cometary emissions. Denis-Gausset, L.; Sauval, A. J. (Univ. Liege, Liege, Belg.). *Bull. Soc. Roy. Sci. Liege* 1968; 37(1-2), 48-54 (Fr). By using normal resonance-fluorescence calens., the emission band at 4050 Å. was calcd. for the ${}^1\Pi_u - {}^1\Sigma_g^+$ electronic transition in a C₃ mol. The 3 basic calen. methods used gave differing *P* and *R* branches for the same *Q* branch. Spectra of 2 comets and a high resolu. solar spectrum were used for assessing the results of calen. No choice could be made among the calcd. spectra because of the inadequacy of resolu. in the observed comet spectra. 21 references.

S. Goldwasser

C.A. 1968. 69. 12

11 Д135. Электронная структура C_2^+ , C_3 и C_3^- . Nib-
ler J. W., Linnett J. W. Electronic structure of C_3^+ ,
 C_3 , and C_3^- . «Trans. Faraday Soc.», 1968, 64, № 5, 1153—
1164 (англ.) 1968

На примере молекул C_3 и ионов C_3^+ и C_3^- рассмотрен
выбор единственного наилучшего набора специальных
спин-орбит неспаренных электронов. В качестве базиса
использованы линейные комбинации слейтеровых опреде-
лителей, составленных из P -орбит атомов углерода. Вы-
числены энергии ряда низколежащих орбит C_3^+ , C_3 и C_3^-
и результаты сопоставлены с результатами метода МО.
Показано, что метод неспаренных орбит приводит к пра-
вильному описанию электронной структуры C_3 и C_3^- , а
для C_3^+ к лучшему результату приводит метод МО. Вы-
числено также распределение электронных спинов в C_3^+ ,
 C_3 и C_3^- для различных базисных ф-ций. Развита про-
цедура вычисления атомных интегралов, содержащих
неспаренные орбиты и рассмотрено приведение векового
ур-ния по симметрии М. Р. Алиев

структура

ф. 1968. 11 Д

C_3^+

1 Б63. Электронное строение C_3^+ , C_3 и C_3^- . Nibler J. W., Linnett J. W. Electronic structure of C_3^+ , C_3 , and C_3^- . «Trans. Faraday Soc.», 1968, 64, № 5, 1153—1164 (англ.)

Показано, что волновые функции, построенные из МО и неспаренных пространственных орбиталей (НПО), дают наилучшее простое описание электронного строения C_3^+ , C_3 и C_3^- . Рассмотрена задача наилучшего нахождения простых однозначных спиновых собственных функций, построенных из НПО. Исследованы два метода: в первом наилучшее спиновое распределение выбирается с помощью оператора спинowego проектирования, тогда как во втором полностью исключаются наименее подходящие спиновые распределения. Рассмотрение результатов соотв-щих расчетов показывает, что второй метод является в общем случае более успешным.

Резюме

Х. 1969. 1

1968

C⁺₃, C₃, C⁻₃(W. deep,
paired)

117246e Electronic structure of C₃⁺, C₃, and C₃⁻: J. W. Nibler and J. W. Linnett (Univ. Cambridge, Cambridge, Engl.). *Trans. Faraday Soc.* 64(Pt. 5), 1153-64(1968)(Eng). Calcs. for C₃⁺, C₃, and C₃⁻ show that M.O. and N.P.S.O. (nonpaired spatial orbital) functions provide the best simple description of the electronic structure of these species. The problem of the best a priori method of generating simple, unique N.P.S.O. spin eigenfunctions has been considered. Two methods were investigated; the first emphasizes the most favorable spin distribution by means of a spin projection operator, while the second excludes completely the least favorable spin distribution. In applying these methods, the double-quartet scheme permits the necessary qual. ordering of the spin distributions. A summary of all relevant N.P.S.O. calcs. done shows the exclusion method to be generally more successful. 18 references. RCTD

+2 refs

C.A. 1968: 68.26

C₃

Preuss H.
Fanoschek R.

1969

Do
y
ce
vi

J. Mol. Struct., 3 (4-5),
423.

(Cu.C₂H₄)III



1970

C₃

Burdett J.

J. Chem. Phys., 1970,

физ. хим.

св. ност.

52, n 6, 2983

(Cell. CO₂) III

C_3

τ_e

сим. н.

строение

Dewar M. F. S. et al. 1970

Angew. Chem., 82 (18),
774.

(сим. C_2) III

C₃

number 3589

1970

Hastie, J.W. et al.

рецензия
и ди
спектр в
магнито

Annual review of
Phys chem, 1970, 21,
475-498

High temp chemistry...

C₃

10m. 18105

1971

Merzberg G.,
Spectroscopic Studies of
molecular structure,
Nobel Lecture, December
11, ● 1971.

u.n.

1972

C₃

9 Д208. Частота деформационного колебания молекулы C₃. Liskow Dean H., Bender Charles F., Schaefer Henry F., III. Bending frequency of the C₃ molecule. «J. Chem. Phys.», 1972, 56, № 10, 5075—5080 (англ.)

(Vi)

Неэмпирическим методом ССП МО ЛКАО в базисах гауссовых ф-ций: по 4 ф-ции *s*-типа и 2 *p*-типа (базис 1), по 4*s*, 2*p* и дополнительно 1 ф-ции *d*-типа (базис 2), по 4*s*, 3*p* и 1*d* (базис 3) для каждого атома С, исследовано электронное строение молекулы C₃. Варьировался валентный угол в интервале 60°—180° и длины связей, но с сохранением симметрии C_{2v}. Для базиса 1 проведен расчет с учетом конфигурац. взаимодействия (КВ, 656 конфигураций). Приведены полные и орбитальные энергии и энергии колебательных уров-

Ф. 1972. 92.

ней деформация колебаний. Обнаружено, что с базисом 1 полная энергия как функция валентного угла изменяется наиболее быстро. Равновесная длина связи мало зависит от валентного угла. Базис 2 в отличие от остальных неправильно предсказывает большую стабильность изогнутой конфигурации молекулы. Базис 1 и КВ приводят к частоте деформационных колебаний около 320 см^{-1} , что близко к таковым для родственных молекул, но значительно больше опытного значения 64 см^{-1} . И только базис 3 приводит к хорошему значению 69 см^{-1} ; соответствующая потенциальная кривая ангармонична. С помощью диаграмм Уолша подробно обсуждены зависимости орбитальных энергий от валентного угла и природы химической связи в молекуле.

В. Л. Лебедев

C₃

(V_{geom})

11543v Bending frequency of the C₃ molecule. Liskow, Dean H.; Bender, Charles F.; Schaefer, Henry F., III (Lawrence Berkeley Lab., Univ. California, Berkeley, Calif.). *J. Chem. Phys.* 1972, 56(10), 5075-80 (Eng). Ab initio calcns. were made to det. a potential curve for the bending motion of C₃. The work was in part motivated by the disagreement between theoretical and exptl. values of the entropy of C₃. Three basis sets were used, with (4s2p), (4s2p1d), and (4s3p1d) centered on each C atom. Both SCF and configuration interaction (CI) (656 configurations) calcns. were carried out with the smallest basis. The CI wave functions were obtained by a method which may be viewed as an extension of the pseudonatural orbital technique of Edmiston and Krauss. By using the smallest basis, both SCF and CI calcns. yield "normal" bending frequencies, ~320 cm⁻¹. Electron correlation has little effect on the bending frequency. The larger (4s2p1d) and (4s3p1d) basis SCF calcns. yield much smaller bending frequencies, the latter being 69 cm⁻¹, in good agreement with the unusually low exptl. value of Gausset, Herzberg, Lagerqvist, and Rosen. The bending potential is predicted to be quite anharmonic. These results are discussed qual. in terms of a Walsh diagram and the importance of d orbitals by symmetry considerations.

1992

C. A. 1992. 14. 2

С₃

Темелев А. П. 1972

Оптики и Светофора.

1972, 33 №4, 631.

" Влияние зор. Рентг.
на оптик. д. полев.
переходов.

1972

C₃

21 Б56. Силовые постоянные возбужденных состояний некоторых линейных и изогнутых молекул типа XY₂. Ramaswamy K., Balasubramanian V. Excited state force constants of some linear and bent XY₂ type molecules. «Indian J. Pure and Appl. Phys.», 1972, 10, № 12, 853—857 (англ.)

Полуэмпирическая модель зарядов связей, предложенная Боркманом и Парром, применена для вычисления квадратичных силовых постоянных основного состояния и нек-рых возбужденных электронных состояний молекул C₃, VO₂, CO₂⁺, CN₂, HgCl₂, HgBr₂, HO₂ и ClO₂. Для всех состояний, в к-рых рассматриваемые молекулы имеют линейную конфигурацию, полученные значения силовых постоянных очень близки к их эксперим. значениям. Для состояний с нелинейной конфигурацией при сохранении значений параметров модели расхождение между вычисленными и эксперим. значениями силовых постоянных устраняется, если предположить равенство значений силовой постоянной взаимодействия связей в основном и возбужденном состояниях. М. Р. Алтнев

См. также 1057

Силов.
пост.

X. 1973 N 21

(47)



C₃

1972

11 Д319. Силовые постоянные возбужденных состояний некоторых линейных и изогнутых молекул типа XY_2 . Ramaswamy K., Balasubramanian V. Excited state force constants of some linear and bent XY_2 type molecules. «Indian J. Pure and Appl. Phys.», 1972, 10, № 12, 853—857 (англ.)

На основе метода Боркмана и др. (РЖФиз, 1969, 5 Д76) делается попытка расчета силовых постоянных для возбужденных состояний некоторых линейных и изогнутых молекул типа XY_2 . Указанный полуэмпирич. метод основан на модельном представлении потенциала взаимодействия вблизи положения равновесия для двухатомных молекул, применении теоремы вирнала и использования эксперим. данных. Для линейных молекул найдено хорошее согласие рассчитанных данных с экспериментальными, для изогнутых молекул согласие хуже, но положение значительно улучшается после введения дополнительного предположения о том, что продольные силовые постоянные не зависят от возбуждения молекул.

А. Зембеков

5501 сммк 1057

X. 1973
N 11

1972

C₃

Wyatt Jeffrey R.
et al.

(2) "J. Phys. Chem."
1972, 76 (13), 1913-18.

(rev. C₂H; T)

C₃

ВФ-4664-XIV

1973

8 Д192. Квантовая модель деформационных колебаний и термодинамические характеристики C₃. Hansen C., Frederick, Pearson Walter E. A quantum model for bending vibrations and thermodynamic properties of C₃. «Can. J. Phys.», 1973, 51, № 7, 751—760 (англ.; рез. франц.)

Проведен расчет энергетич. спектра дважды вырожденных деформационных колебательных мод молекулы C₃, находящейся в основном состоянии. Использован потенциал в виде прямоугольной ямы с бесконечно высокими стенками с добавкой в виде гармонич. возмущения, выбираемой из условия наилучшего совпадения рассчитанных низших 6 колебательных уровней ν^l (ν — полное колебательное число деформацион. мод, l — их угловой момент) с эксперим. наблюдаемыми значениями в низшем вращательном состоянии. Связью с вращениями молекулы и l -удвоением пренебрегалось. Расстоя-

М.И. Ес

Т.г.ср.

4-488

⊕ ⊗

Т.г.ср.

9/19/73
N 2

ние между высшими колебательными уровнями систематически увеличивается ($\sim v$). Поскольку в модели достигается максимально возможное увеличение, найденная из спектра статистич. сумма принимает наименьшее возможное значение. Вклад остальных колебательных мод учитывался в гармонич. приближении; вклад вращений — в приближении жесткого ротатора. Вычислен ряд термодинамич. характеристик. Проведено сравнение результатов расчета с эксперим. данными.

Ю. П. Денисов

C₃

Bp-4664-XIV

1973

153150j Quantum model for bending vibrations and thermodynamic properties of triatomic carbon. Hansen, C. Frederick; Pearson, Walter E. (Ames. Res. Cent., NASA, Moffett Field, Calif.). *Can. J. Phys.* 1973, 51(7), 751-60 (Eng). A quadratically perturbed square well potential was used to derive quantized bending mode vibrational energy levels for C₃. Coupling with rotational modes and *l* doubling was neglected for simplicity. The model was constrained to a best fit with obsd. lower vibrational levels in the lowest rotational state, and subject to this constraint, the upper vibrational levels have max. possible divergence. Thus a lower limit for the partition function and the entropy of C₃ was established; the neglected rotational coupling has little influence on these quantities because the splitting of levels is almost sym. The limits obtained support the classical model of Strauss and Thiele for the thermodyn. properties of C₃ rather than the ests. listed in current JANAF Thermochem. Tables, and imply that recent graphite vapor pressure measurements made by Zavitsanos and by Wachi and Gilmartin are more correct than earlier measurements.

(ϵ_i) v_i

T. g. q.

JANAF

C.H. 1973. 28. N24



(41)

T. g. q.

C₃

Nakatsuji Hiroshi

1973

"J. Amer. Chem. Soc."

геом.

1973, 95, №2, 354-61.

структ

"форма молекул в осн.
и возб. состояниях"

(см ВетН₂; III)

ommien 4620

1973

XU-1132

Kordis J. Gingerich R.A.
"J. Chom. Phys."
1973, 58, NII, 5058-5066.

(see CP; I)

1973

 C_3

NCN

 ϵ_i

11 Д326. Вращательная энергия линейной молекулы в электронном ${}^1\Pi$ -состоянии. Петелин А. Н. «Оптика и спектроскопия», 1973, 35, № 1, 35—41

Рассматривается влияние сильного электронно-колебательного взаимодействия (эффекта Реннера) на вращательные уровни линейной молекулы. Показано, что при наличии эффекта Реннера эффективная вращательная постоянная молекулы зависит от величины электронно-колебательного взаимодействия, проекции вибронного момента на ось молекулы, а также от большего, по сравнению со случаем электронного Σ -состояния, числа постоянных ангармоничности. Вычисленные по полученным ф-лам значения эффективных вращательных постоянных для радикалов C_3 и NCN находятся в хорошем согласии с эксперим. данными.

Резюме

2. 1973 N 11

(+1)



1973

C₃

NCN

(min.)

98703k Rotational energy of a linear molecule in a ${}^1\Pi$ electron state. Petelin, A. N. (USSR). *Opt. Spektrosk.* 1973, 35-
(1), 35-41 (Russ). The effect of strong electronic-vibrational interactions (Renner effect) on the rotational levels of a linear mol. in a ${}^1\Pi$ state was studied. The Born-Oppenheimer method was used as an initial approxn. In the presence of the Renner effect, the effective rotational const. depends on the value of electronic-vibrational interaction, projection of the vibronic moment to the mol. axis, and the large no. of anharmonicity consts., as compared with the case of electronic Σ state. An obvious dependence of the effective rotational const. on the characteristics cited was revealed for XY_2 -type mols. The values of effective rotational consts. for several electronic-vibrational states for C₃ and NCN agreed well with exptl. data.

J. Moravec

C. A. 1973 49 N/6

(+1) ☒

1973

С₃ 22 Б52. Вращательная энергия линейной молекулы в электронном ¹Π-состоянии. Петелин А. Н. «Оптика и спектроскопия», 1973, 35, № 1, 35—41

(ε_i) Рассмотрено влияние сильного электронно-колебательного взаимодействия (эффект Реннера) на вращательные уровни линейной молекулы. Показано, что при наличии эффекта Реннера эффективная вращательная постоянная молекулы зависит от величины электронно-колебательного взаимодействия, проекции вибронного момента на ось молекулы, а также от большего, по сравнению со случаем электронного Σ-состояния, числа постоянных ангармоничности. Вычисленные по полученным ф-лам значения эффективных вращательных постоянных для радикалов C₃ и NCN находятся в хорошем согласии с эксперим. данными. Резюме

Жл. 1973 N 22



(+1) O₂
(+1) E₂uvy
(+1) NCN

C₃

Zahradnik L.

Caraky P.

1973

4-1671

эксп.
спектр.

" Collect. Czech. Chem. Commun.
1971, 38, N 7, 1876-85

C₃

*4-5529

1974

(J:)

31774g Matrix isolation study of the vacuum ultraviolet photolysis of allene and methylacetylene. Vibrational and electronic spectra of the species C₃, C₃H, C₃H₂, and C₃H₃. Jacox, Marilyn E.; Milligan, Dophus E. (Inst. Mater. Res., Natl. Bur. Stand., Washington, D.C.). *Chem. Phys.* 1974, 4(1), 45-61 (Eng). Upon H-discharge photolysis of normal or D-substituted allene or methylacetylene in an Ar or a N matrix at 14°K, ir

C.A. 1974. 81. NY

absorptions of all of the C_3H_n species with $n < 4$ appear. A H-deformation fundamental of C_3H_2 was identified in the far-ir. The ir studies of the partially D-substituted methylacetylenes indicate that extensive photoisomerization occurs. The obsd. products are consistent with those predicted using the previously postulated gas-phase photolysis mechanism. The uv spectrum of C_3H_2 corresponds closely with that characteristic of the gas-phase mol. Comparison of the spectrum between 1900 and 4000 Å of photolyzed methylacetylene with that of matrix-isolated graphite vapor has indicated that any new electronic transition of C_3 in this region must be weak.

C₃

1974

17 Б78. Влияние криволинейного движения на деформационное колебание с большой амплитудой [в молекуле] C₃. Hansen C., Frederick, Henderson B. J., Pearson Walter E. Effects of curvilinear motion in large-amplitude bending of C₃. «J. Chem. Phys.», 1974, 60, № 3, 754—759 (англ.)

Рассмотрена модель для деф. кол. линейной гомоядерной трехатомной молекулы с учетом криволинейности движения и проведен расчет соотв-щих колебательных уровней энергии молекулы C₃. За начало отсчета принят центр масс 0; ось параллельна линии, соединяющей концевые атомы; отклонение центрального атома вдоль оси симметрии второго порядка (y) от 0 равно $2r$, концевых — r ; на оси y введена точка A, расстояние к-рой от 0 равно $3\delta r - r$, где δ — параметр, а расстояние от A до каждого концевого атома постоянно и равно параметру d . Вращение вокруг оси x задается углом ϕ . В координатах r, ϕ гамильтониан H представлен как обычный невозмущенный оператор $H_0 = p_r^2/2\mu + p_\phi^2/2\mu r^2 + V_0$ и возмущение $H' = F + V'$, $F = f(r, \delta, d) p_r^2/2\mu$, где p_r и p_ϕ — операторы импульсов, сопряженных r и ϕ , а $f(r, \delta, d)$ — известная отрицательно определенная функция. Оператор F характеризует

2056

Винница

X. 1974
N 17

криволинейность движения. В кач-ве V_0 использован либо гармонич. Пт, либо Пт типа прямоугольной потенциальной ямы, а в кач-ве V' — кватичный Пт. Возмущение H' учитывалось в первом порядке теории возмущений. Параметры δ и d определены для молекулы C_3 из условия, чтобы вычисленные средние значения вращательной постоянной B_v в зависимости от v совпадали с эксперим. значениями: $\delta=0,8112$ и $d=1,287$ А (эксперим. равновесное расстояние С—С 1,277 А). Отмечено, что только совместный учет криволинейности движения и кватичного возмущения приводит к согласию с опытом для $v=0-6$. Для описания эксперим. поведения уровней с $v>6$, более пригодным оказывается Пт прямоугольной ямы. В целом, оператор F вызывает понижение уровней энергии, относит. величина этого понижения для всех уровней примерно одинакова ($\sim 10\%$) для v от 0 до 50. Это означает, что при обычном анализе нормальных координат подбором силовых постоянных можно эффективно учесть поправку, обусловленную криволинейностью движения, так что обычный анализ оказывается пригодным и для колебаний с большими амплитудами. Н. Ф. Степанс

1974

C₃

(M.N)

126225x Effects of curvilinear motion in large-amplitude bending of triatomic carbon. Hansen, C. Frederick; Henderson, B. J.; Pearson, Walter E. (Ames Res. Cent., NASA, Moffett Field, Calif.). *J. Chem. Phys.* 1974, 60(3), 754-9 (Eng). Large-amplitude bending of linear, homonuclear, triat. mols. is analyzed, with curvilinear departure of the atoms from normal coordinate bending included. The curvilinear motion is deduced from the obsd. variation of rotational const. with bending quantum no. The effect of this motion is to decrease the energy eigenvalues; energy states with lowest angular momentum are decreased most. These effects counteract the effects of a steeper than harmonic bending potential. A harmonic oscillator model of C₃ is fitted to the obsd. rotational const. within 0.6%, and the bond distance between atoms in the linear configuration of C₃ is

ommucl. 2056

C.A. 1974. 80. N22

1.287 Å; noticeably larger than the av. internuclear distance of the vibrational ground state, 1.277 Å. First order perturbation results, including the effect of a quartic perturbation potential, approx. duplicate the pattern of energy levels obsd. Square well bending potential wavefunctions are presumed to represent a limiting approxn. for high vibrational levels of C, since these provide the divergence of upper levels required to fit the measured vapor pressure of graphite. In this case, the effects of curvilinear motion are similar to those obtained for the harmonic oscillator model, although somewhat larger decreases in energy are obtained. In either case, the av. energy decrease is relatively const.—the order of 10%—over a wide range of vibrational quantum no. This means that the usual normal mode anal. can be adjusted to approx. the effects of curvilinear motion and explains why normal mode approxns. can often be extended beyond the limits of small-amplitude bending and yet give reasonably good results.

1975

C₃

11 Д113. Параметры К-удвоения для линейных молекул в П-электронном состоянии. Brown J. M. K-type doubling parameters for linear molecules in П electronic states. «Mol. Spectrosc.», 1975, 56, № 1, 159—162 (англ.)

(м.н.)

В низших порядках теории возмущений рассчитаны параметры К-удвоения 3-атомных молекул в П-электронном состоянии. В качестве оператора возмущения выбирается корнелисово взаимодействие, включающее операторы углового момента электрона и колебательного углового момента. Расчет сравнивается с экспериментом для состояния A¹Π_u молекулы C₃.

Е. И. Дашевская

ф. 1975/11 (71) теор. спект. /расчет
м.н. а.т. а.т. а.т.

C_5^+

Chaikovskii E. F. 1975
et al

масс-спектр.
испарен.

Терлофиз., Выс. Темп.,
1975, 13(6), 1300-1

См C^+ ; III)

C₃

(Mmuck 13904)

1975

Cradock S., Hinchcliffe A. J.
Matrix isolation.

спектр
в
лампе

A technique for the study
of reactive inorganic
species.

Cambridge University Press, 1975

C₃

45-11470

1975

(J₃)

84:67328r The vibrational spectrum of triatomic carbon in the 5-micron region. Treffers, Richard R.; Gilra, Daya P. (Dep. Astron., Univ. California, Berkeley, Calif.). *Astrophys. J.* 1975, 202(3, Pt. 1), 839-43 (Eng). A band near $5\ \mu$ was found in the emission from a C tube furnace at 3100°K . It is a broad unresolved feature centered near $1850\ \text{cm}^{-1}$ and is $\sim 370\ \text{cm}^{-1}$ wide (full width half max.). It is shown to be the ν_3 (asymmetric stretch)rotation-vibration band of C₃. A second band at $3200\ \text{cm}^{-1}$ is present but weaker; it is possibly consistent with the combination band $\nu_1 + \nu_3$. These bands may be opacity sources in cool carbon stars.

C. A. 1976. 84 w 10

C₃

X4-10061

1975

197521 C₃ radical. Theoretical study of the electronic spectrum of C₃ via the equations of motion method. Williams, Geoffrey R. J. (Res. Sch. Chem., Aust. Natl. Univ., Canberra, Aust.). *Chem. Phys. Lett.* 1975, 33(3), 582-4 (Eng). The excited states of the C₃ radical were studied by using the equations of motion method. This study confirms the exptl. assignments of the 2 lowest energy excitations obsd. for this radical and suggests an assignment for 2 other weak transitions that have been detected for this system. The expected $1\Sigma_u^+ \rightarrow 1\Sigma_g^+$ transition is predicted to lie at an energy of 7.68 eV and to have an oscillator strength of 0.92.

(M.R.)

C.A. 1975, 83N14

1
Bq-6412-XIV

C₃

*43-10061

1975

3 Б66. Радикал C₃. Теоретическое исследование электронного спектра C₃ с помощью метода уравнений движения. Williams Geoffrey R. J. The C₃ radical: a theoretical study of the electronic spectrum of C₃ via the equations of motion method. «Chem. Phys. Lett.», 1975, 33, № 3, 582—584. (англ.)

[XIII]

Электр.
спектр.

Методом ур-ний движения в базисе сгруппированных гауссовых функций (типа 4—31 ГФ) рассчитан электронный спектр молекулы C₃ с геометрией, отвечающей эксперим. геометрии основного состояния ¹Σ_g⁺. Полу-

Вср - 6412

УТОЙ

X/1976 N 3

1
чены вертикальные энергии возбуждения ΔE и силы осцилляторов f для 15 возбужденных состояний. Нижнему из возбужденных синглетных состояний отвечает $\Delta E = 3,63$ эв, что согласуется с энергией единственного экспериментально наблюдавшегося в газовой фазе перехода ${}^1\Pi_u - {}^1\Sigma_g^+$ (3,06 эв). Спектр фосфоресценции C_3 при изоляции в матрице (2,12 эв) может быть приписан переходу из нижнего триплетного состояния ${}^3\Pi_u$, для которого $\Delta E = 1,73$ эв. Расчет предсказывает существование перехода ${}^1\Sigma_u^+ - {}^1\Sigma_g^+$ с $\Delta E = 7,68$ эв и $f = 0,92$ (эксперим. измерения выполнены в области энергий, не превышающих 6,4 эв). Результаты расчета позволяют также приписать две слабые полосы при 2812 Å (4,41 эв) и 2320 Å (5,34 эв) запрещенным переходам ${}^1\Delta_u - {}^1\Sigma_g^+$ ($\Delta E = 4,18$ эв) и ${}^1\Pi_g - {}^1\Sigma_g^+$ ($\Delta E = 5,02$ эв). Оценка потенциала ионизации C_3 на основании теоремы Купменса дала значение 12,7 эв. А. В. Абраменков.

*43-10067

1975

2 Д146. Радикал C_3 ; теоретическое исследование электронного спектра C_3 методом уравнений движения. Williams Geoffrey R. J. The C_3 radical: a theoretical study of the electronic spectrum of C_3 via the equations of motion method. «Chem. Phys. Lett.», 1975, 33, № 3, 582—584 (англ.)

Энергии E возбужденных состояний радикала C_3 и силы осцилляторов f переходов в эти состояния вычислены методом уравнений движения. Под ними подразумеваются (РЖФиз, 1968, 7В73) вариационные уравнения для операторов, проводящих волн. ф-цию основного состояния в волн. ф-ции соответствующих возбужденных. Расчет выполнен при эксперим. геометрии молекулы в базисе СТО-4-31 Г. Рассмотрены все 52 однократных возбуждения с четырех верхних заполненных

емь

Ф 1976 №2

МО на 13 нижних вакантных, причем влияние двукратных возбуждений учитывалось методом теории возмущений. Из полученных переходов отмечены следующие. Переход ${}^1\Pi_u \leftarrow {}^1\Sigma^+_g$, с $E=3,63$ эв, разрешенный с $f=0,13$, близок к полосе 3,06 эв, наблюдаемой в газовой фазе. Переход ${}^3\Pi_u \leftarrow {}^1\Sigma^+_g$, запрещенный по спину, с $E=1,73$ эв, близок к полосе фосфоресценции при 2,12 эв на матрице при низкой т-ре. Эту полосу уже относили предположительно к этому же переходу, полагая, что он частично разрешен из-за подмешивания упоминавшегося перехода при 3,63 эв вследствие спин-орбитального взаимодействия. Наблюдаемые слабые полосы при 4,41 и 5,34 эв сопоставляются с полученными здесь переходами ${}^1\Delta_u \leftarrow {}^1\Sigma^+_g$ и ${}^1\Pi_g \leftarrow {}^1\Sigma_g$ соответственно с $E=4,18$ и 5,02 эв, запрещенными дипольно и проявляющимися, по-видимому, вследствие вибронных взаимодействий. За пределами экспериментально исследованного интервала (т.е. при $E>6,4$ эв) предсказан сильный ($f=0,92$) разрешенный переход ${}^1\Sigma_u^+ \rightarrow {}^1\Sigma_g^+$ с $E=7,68$ эв. Ю. Е. Эйзнер

60810.1881

TC, A

СЗ (наим. & присл.)
инстр)
63439

1976
4574

к р. N 60810.1875

Gilra Daya F. Spectra of N-type carbon stars and some related laboratory spectroscopy.

"Mém. Soc. roy. sci. Liège", 1976, 9,
77-81. Discuss., 83 (англ.)

640 662

672

0680 ПРИНИТИ

C3

1976

Чаркин С.П. и др.

Ж. журн. хим. 1976. 21,
№ 8. 2022-3.

(расчет,
эл. смр.)

(all BeF₂) III

C₃

monopagus

1976

Ramsay D. A.

Exemp.
exemp.

"Spectrosc. Excited State"
New York-London, 1976
47-83 (ans)



(ex CO₂; 14)

C₃ Vernardakis T., Hoch M.

1976

универсальное графитное и углеродное
Pap. - London. Int. Conf.
Carbon Graphite, 4th 1974,
(Pub. 1976), 536-42 (Eng.)
Soc. Chem. Ind.; London. Engl.
масс спектры.

(see C) I

1974

 C_3 H_2C_2O CO_2 Сил. мет.
кв. мет.
расчет.

X-1974 №23

23 Б52. Локализованные молекулярные орбитали для кумуленов. Трехцентровые связи, дробные связи и угловые силовые постоянные. Brown Leo D., Lipscomb William N. Localized molecular orbitals for cumulenes. Three-center bonds, fractional bonds, and bending force constants. «J. Amer. Chem. Soc.», 1977, 99, № 2, 3968—3979 (англ.)

Методом МО ЛКАО ССП в приближении частичного сохранения двухатомного дифференциального перекрытия в миним. базисе ОСТ рассчитаны МО соединений C_kO_2 ($k=1, 3, 5, 7$), C_k ($k=3, 5, 7$), H_2C_kO ($k=1, 2, 4, 6$) и $H_2C_kH_2$ ($k=2, 3, 5, 7$) и локализованы затем по методу Бойса. Для трех молекул: C_3 , H_2C_2O и угловой конформации CO_2 , выполнен точный неэмпирич. расчет с последующей локализацией МО по Эдмистону — Рюденбергу. Оба критерия локализации дали почти идентичные результаты для C_3 и CO_2 ($\angle OCO = 125^\circ$), но различные для H_2C_2O . Для молекул

X

+2

$\text{H}_2\text{C}_k\text{H}_2$ и $\text{H}_2\text{C}_k\text{O}$ получены локализованные двойные связи $\text{C}=\text{C}$, связь $\text{C}=\text{O}$ является промежуточной между двойной и тройной. В случае молекул C_k и C_kO_2 локализация дает скорее трехцентровые $\text{C}=\text{C}=\text{C}$ связи, чем двойные кумилированные, часть связей $\text{C}=\text{C}$ и связи $\text{C}=\text{O}$ имеют дробный характер, являясь промежуточными между двойными и тройными связями. Более простая и удобная схема локализованных МО получается при раздельной локализации σ - и π -орбиталей. Приведены индексы связей, валентности и заряды атомов и силовые константы (k) угловых колебаний. Предложена след. корреляция между величинами k и зарядами атомов: малые значения k имеют колебания фрагментов, в вершине угла, к-рых находится атом со значит. отриц. зарядом (фрагменты трехцентровых связей) большие значения k отвечают колебаниям, изгибающим фрагмент с положительно заряженным атомом в вершине (фрагменты с дробными связями).

А. Клягина

C_3^+

osmuck 5741

1977

(Y)

Huntress W.T., Jr.
Astrophys. J. Suppl. Ser.,
1977, 33, (4), 495-514.

(see H^+ ; III)

1947

C₃

87: 191568v Shock tube measurements of the optical absorption of triatomic carbon. Jones, Jim J. (Langley Res. Cent., NASA, Langley Station, Va.). NASA Tech. Memo. 1977, NASA-TM-X-74025, 40 pp. (Eng). Avail. NTIS. From Sci. Tech. Aerosp. Rep. 1977, 15(18), Abstr. No. N77-27908. The spectral absorption of C₃ was measured in a shock tube using a test gas mixt. of acetylene dild. with Ar. The absorption of a pulsed Xe light source was measured by means of 8 photomultiplier channels to a spectrograph and an accompanying drum camera. The postshock test gas temp. and pressure were varied over the range 3300-4300 K and 0.36 to 2.13 atms., resp. The results showed appreciable absorption from C₃ for the wavelength range 300-540 nanometers. The computed electronic oscillator strength varied from 0.12 to 0.06 as a function of temp.

circles
nodes.
C₃, B; from

C.A. 1947, LT, N24

C₃

ommuck 5757

1977

(Aē)

LOU J.P.

J. Amer. Chem. Soc.,

1977, 22, (17), 5557-70.

1977

C₃

3 Б71. Расчет методом конфигурационного взаимодействия потенциальных кривых молекулы C₃ в основном и низших Π_u-состояниях. Peric-Radtke J., Römelt J., Peyerimhoff S. D., Buenker R. J. Configuration interaction calculation of the potential curves for the C₃ molecule in its ground and lowest-lying Π_u states. «Chem. Phys. Lett.», 1977, 50, № 2, 344—350 (англ.)

матрица
серии

Вблизи равновесных геометрич. конфигураций рассчитаны потенциальные поверхности и частоты колебаний основного $^1\Sigma_g^+$ и возбужденных $^{1,3}\Pi_u$ -состояний радикала C₃. Использован базисный набор двухэкспонентных сгруппированных гауссовых функций s- и p-типа, дополненный поляризац. связевыми функциями s- и p-типа, центрированными на связях C—C. Вычисления проведены в рамках процедур ССП и конфигурац. взаимодействия (КВ), причем в последнем случае в расчет включались конфигурации одно- и двукратно возбужденные относительно выбранного исходного набора конфигураций сравнения. Найдено, что во всех трех состояниях минимуму энергии отвечают

2, 1978, №3

линейные симм. конфигурации. Полученные методом КВ равновесные расстояния между соседними атомами углерода составляют 1,308; 1,311 и 1,317 Å для состояний $^1\Sigma_g^+$, $^3\Pi_u$ и $^1\Pi_u$, соотв., тогда как аналогичные величины, полученные методом ССП, равны 1,285; 1,288 и 1,295 Å. Отмечено, что для основного состояния эксперим. данные (1,277 и 1,287 Å) ближе к хартри-фоковскому значению. Однако энергия возбуждения $^1\Sigma_g^+ \rightarrow ^3\Pi_u$ (3,06 эв), рассчитанная в рамках процедуры КВ, практически точно совпадает с эксперим. величи-

ной, в то время как метод ССП приводит к ошибке порядка 1,5 эв. На основе результатов вычислений наблюдаемая в спектре полоса 5900 Å отнесена к электронному переходу $^1\Sigma_g^+ \rightarrow ^3\Pi_u$. Для рассмотренных переходов проведены также расчеты сил осцилляторов и факторов Франка — Кондона.

А. В. Немухин



1974

C₃

2 Д106. Потенциальные кривые основного и низколежащих Π_u -состояний молекулы C₃, вычисленные методом конфигурационного взаимодействия. Perić-Radić J., Römelt J., Peyerimhoff S. D., Buenker R. J. Configuration interaction calculation of the potential curves for the C₃ molecule in its ground and lowest-lying Π_u states. «Chem. Phys. Lett.», 1977, 50, № 2, 344—350. (англ.)

$\psi_n; \psi_i; E_i$

Методом ССП и КВ выполнен неэмпирич. расчет частот симметричных и антисимметричных валентных колебаний и симметричных деформ. колебаний молекулы C₃ в основном $^1\Sigma_g^+$ и двух первых $^1\Pi_u$ и $^3\Pi_u$ возбужденных состояниях. Базис на атоме С состоял из сгруппированных гауссовых ф-ций (4s, 2p), полученных с помощью разложения Данинга, с включением поляризующих s- и p-ф-ций, центрированных в середине C—C-связи. Экспоненты $\alpha(s)$ и $\alpha(p)$ этих ф-ций оптимизированы по ССП расчетам рассматриваемых состояний и равны 1,25 и 0,7 соответственно. В вековом ур-нии учтены все доминирующие однократно и двукратно возбужденные конфигурации. Вклад остальных конфигураций учитывался с помощью экстраполяции.

Ф. 1978
N 2

Во всех трех состояниях молекула обнаруживает тенденцию к сохранению линейной симметрии (частоты деформационных колебаний малы). Найдено, что частоты валентных колебаний в основном и возбужденном состояниях мало отличаются, что связано с небольшим увеличением равновесной длины связи в возбужденном состоянии. С помощью частот колебаний, рассчитанных методом КВ, получены энергии возбуждения $^1\Pi_u$ - и $^3\Pi_u$ -состояний, составившие 3,06 и 2,04 эв соответственно. Энергия возбуждения состояния $^1\Pi_u$ хорошо согласуется с началом полосы (000—000) в спектре C_3 (4049,8 Å или 3,03 эв). Наличие серии линий при частоте 5900 Å (2,10 эв) связывается с переходом в состояние $^3\Pi_u$. Рассчитаны также равновесные расстояния между атомами углерода, время жизни состояния $^1\Pi_u$ и факторы Франка—Кондона для перехода в это состояние. Подробно обсуждается различие результатов в методах ССП и КВ, проводится сравнение с экспериментом и результатами других авторов.

А. В. Гольцов

1977

87: 174909q Configuration interaction calculation of the potential curves for the triatomic carbon molecule in its ground and lowest-lying Π_u states. Peric-Radic, J.; Roemelt, J.; Peyerimhoff, S. D.; Buenker, R. J. (Inst. Phys. Chem., Univ. Bonn, Bonn, Ger.). *Chem. Phys. Lett.* 1977, 50(2), 344-50 (Eng). Ab initio SCF and CI calcs. are reported for the C_3 mol. using a basis set of double-zeta plus polarization quality. Potential curves are obtained for the sym. stretch and bending and antisym. stretch vibrational coordinates for the ground and $3\sigma_u \rightarrow 1\pi_g$ ${}^3\Pi_u$ excited states of this system in order to calc. the intensity distributions for the assoc. electronic transitions. The calcd. T_0 value for the ${}^1\Pi_u \leftarrow \tilde{X}^1\Sigma_g^+$ transition of 3.03 eV is in quite good agreement with the location of the origin of the 4050-Å band system in C_3 , confirming its previous assignment to this electronic transition; the lifetime of the ${}^1\Pi_u$ upper state is also obtained in the CI treatment. A value of 2.04 eV is calcd. for the corresponding ${}^3\Pi_u \leftarrow \tilde{X}^1\Sigma_g^+$ origin, which result in turn suggests that the weak feature starting at 5900 Å should be assigned thereto.

C.A. 1977. 87. v 22

1977

C3

5 Д257. Высокотемпературные и межзвездные молекулы. Weltner William Jr. High-temperature and interstellar molecules. «Int. Conf. Matrix Isol. Spectroscopy. Diskussions tag. Dtsch. Bunsen Ges. Phys. Chem. West — Berlin, 1977. Extended abstr.» Berlin, s. a., 164—169 (англ.)

Рассмотрены достоинства метода матричной изоляции для исследования тугоплавких соединений. По спектрам TiO в матрицах в УФ-, видимой и ИК-областях установлено основное электронное состояние этой молекулы $^3\Delta$, уточнены теоретич. расчеты ее орбиталей, а по лазерным исследованиям обнаружено 2 нижних синглетных состояния. Упомянуты работы по изучению гидридов, карбидов и нитридов переходных металлов в матрицах. Приведены результаты исследования углеродных молекул C_2 , C_3 и C_4 ., карбидов кремния и молекул Si_2 и B_2 . Описаны результаты исследования с помощью матричной техники HNC и C_2H , обнаруженных в межзвездной среде. Библ. 37. М. Тонков

спектроеск.
молекулы

Ф. В. В. В. В.

1978

C₃

12 Д850. Процессы релаксации изолированных в матрице молекул C₃ Bondybey V. E., English J. H. Relaxation processes in matrix isolated C₃. «J. Chem. Phys.», 1978, 68, № 10, 4641—4643 (англ.)

Получены спектры возбуждения и испускания молекул C₃, изолированных в Ar- и Ne-матрицах при t-ре 4° K. Молекулы C₃ получали в результате фотолиза ($\lambda=1216 \text{ \AA}$) аллена, осажденного на охлаждаемое Pt-зеркало. Типичные конц-ии аллена в матрицах составляли 1:2000. Спектры возбуждались лазером на красителе. В результате анализа спектров возбуждения C₃ (24 600—27 600 см⁻¹) и спектров испускания (16 400—24 700 см⁻¹) излучение молекулы C₃ в области ~17 000 см⁻¹ приписано переходу $a^3\Pi_u \rightarrow X^1\Sigma_g^+$. Показано, что колебательная релаксация в состоянии A¹Π_u происходит очень быстро. Обсуждено влияние окружения на характер процессов релаксации молекул C₃. Библ. 19.

спектры
испуск.
и возбужд.

р-1978, N12

C3

1978

89: 67948w Relaxation processes in matrix isolated triatomic carbon. Bondybey, V. E.; English, J. H. (Bell Lab., Murray Hill, N. J.). *J. Chem. Phys.* 1978, 68(10), 4641-3 (Eng). The low value of the bending frequency ν_2 in the upper $A^1\Pi$ state leads to efficient vibrational relaxation. The (0,0,0) level of this state populates by efficient intersystem crossing a lower lying triplet state. The vibrational ground state levels involving excitation in the low frequency ($\sim 65 \text{ cm}^{-1}$) ν_2 fundamental exhibit severe lifetime broadening due to strong mixing with the lattice modes. The excited ground state levels involving only the stretching frequencies are, on the other hand, sharp.

peaks
broadening

C. A. 1978, 29, NP

1978

C₃
BO₂

22 Б82. Применение функции Грина к исследованию химических возбуждений. Goud Slacha, Balasubramanian V., Gupta B. K. Green's function application to chemical perturbation studies. «Proc. Indian Acad. Sci.», 1978, А87, № 10, 353—358 (англ.)

Метод функции Грина в формулировке Де Веймса — Вулфрема использован для расчетов изменений силового поля ΔF при переходе от одной молекулы к другой для след. пар молекул: XY_2-ZY_2 и XY_2-XZ_2 , причем XY_2 , ZY_2 и XZ_2 суть линейные трехатомные молекулы, различающиеся в каждой паре по определенному типу «хим. возмущения»: либо центральным атомом, либо концевыми атомами, либо типом электронного состояния для одной и той же молекулы. При расчетах взяты данные для молекул C_3 , BO_2 , CO_2^+ , CN_2 , $HgCl_2$, $HgBr_2$ и CO_2 , причем для первых четырех из них — по нескольким электронным состояниям. Получено хорошее согласие между ΔF вычисленными по использованной методике и по разности силовых полей соотв-щих молекул.

Н. Степанов

сил. м-ст.

(4-6) 

х. 1979, 122

C₃

ориск 6870

1978

2 Б39. Расчеты неэмпирическим методом МОД КВ электронного спектра радикала C₃. Römelt Joachim, Peyerimhoff Sigrid D., Buenker Robert J. Ab initio MRD CI calculations for the electron spectrum of the C₃ radical. «Chem. Phys. Lett.», 1978, 58, № 1, 1—7 (англ.)

Неэмпирическим методом ССП МО ЛКАО с учетом взаимодействия наиболее существенных моно- и дважды возбужденный конфигураций рассчитан электронный спектр поглощения радикала C₃ и геометрия его нижних возбужденных состояний. Использовано два биэкспоненциальных гауссовых базиса с дополнительным включением в расчет поляризац. функций, всего 42 и 56 сгруппированных гауссовых функций. Для учета КВ использован многоконфигурац. метод для отобранных

х. 1979 IV 2

детерминантов (МОД КВ). Показано, что электронная конфигурация основного состояния $C_3 \dots 4\sigma_g^2 3\sigma_u^2 1\pi_u^4 1\pi_g^0$. Нижними возбужденными состояниями являются (в скобках приведены эксперим. величины) $^3\Pi_u$ 2,11 (2,10) эв и $^1\Pi_u$ 3,16 (3,06) эв, к-рые соотв-вуют переходу $3\sigma_u \rightarrow 1\Pi_g$. Выше лежат состояния $^3\Pi_g$ и $^1\Pi_g$ 2,82—2,92 и 4,17 эв, соотв-щие переходы $4\sigma_g \rightarrow 1\Pi_g$. Все состояния, соотв-щие переходу $1\Pi_u \rightarrow 1\Pi_g$ лежат в области 4 эв за исключением $^1\Sigma_u^+$ 8,13 эв, их порядок $^3\Sigma_u^+$, $^3\Delta_u$, $^3\Sigma_u^-$, $^1\Sigma_u^-$, $^1\Delta_u$ и $^1\Sigma_u^+$. Ридберговские переходы $1\Pi_u \rightarrow 3s$ имеют энергии выше 9 эв. Анализируются формы потенциальных кривых для основного и возбужденного ($1\Pi_u \rightarrow 1\Pi_g$) $^1\Sigma_u^+$ состояний.

К. Я. Бурштейн

C₃

оттиск 6840

1978

2 Д132. Неэмпирические расчеты методом МРД КВ электронного спектра радикала C₃. Römelt Joachim, Peyerimhoff Sigrid D., Buenker Robert J. Ab initio MRD CI calculations for the electron spectrum of the C₃ radical. «Chem. Phys. Lett.», 1978, 58, № 1, 1—7 (англ.)

Метод конфигурационного взаимодействия (КВ) применен для исследования низколежащих ридберговских электронных состояний, а также состояний, возникающих при возбуждении электронов занятых орбиталей 4σ_g и 1π_u на орбитали π*-типа в радикале C₃. Использованный базис сгруппированных гауссовых ф-ций имитировал двухэкспонентный базис слэтеровских орбиталей с включением (в качестве поляризационных) ф-ций s- и p-типов, центрированных на серединах связей C—C.

изд. лх
физ. 5

Ф. 1979-2

При расчете учитывались одно- и дважды возбужденные конфигурации с последующей экстраполяцией результатов на результаты полного учета КВ в данном базисе. Получены энергии вертикальных переходов из основного электронного состояния $X^1\Sigma_g^+$ линейной молекулы в синглетные и триплетные состояния типов Σ , π и Δ , а также рассчитаны вероятности дипольного перехода $^1\Pi_u \leftarrow X^1\Sigma_g^+$. Полученные результаты хорошо согласуются с экспериментом. Для состояния $^1\Sigma_u^+$ ($\pi_u \rightarrow \pi_g$), кроме того, рассчитана потенц. кривая, найдена равновесная геометрия и оценены колебательные частоты.

А. Дементьев

C3

Summer 6870

1978

89: 188446q Ab initio MRD CI calculations for the electron spectrum of the triatomic carbon radical. Roemelt, Joachim; Peyerimhoff, Sigrid D.; Buenker, Robert J. (Lehrstuhl Theor. Chem., Univ. Bonn, Bonn, Ger.). *Chem. Phys. Lett.* 1978, 58(1), 1-7 (Eng). Calcs. using the MRD CI method are reported for the ground and low lying excited states of C₃. Transitions from the $3\sigma_u$, $4\sigma_g$ and $1\pi_u$ MO's into $1\pi_g$ are considered, as well as the $1\pi_u \rightarrow 3s$ Rydberg species and the corresponding ionization, and good agreement with exptl. data is obtained when comparison is possible. Potential curves calcd. for the ground and $(1\pi_u \rightarrow 1\pi_g)^1\Sigma_u^+$ excited state are discussed.

no mealy,
Kpubare

C.A. 1978, 29, 122

C3

1979

91: 201503u An experimental determination of the cross section of the Swings band system of triatomic carbon. Cooper, D. M.; Jones, J. J. (Ames Res. Cent., NASA, Moffett Field, CA 94035 USA). *J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer* 1979, 22(2), 201-8 (Eng). The spectral absorption cross section of the Swings band of C₃ was detd. from measurements behind incident shock waves that heated a gas mixt. of Ar and C₂H₂. These measurements spanned the spectral region between 300 and 540 nm, and were obtained at temps. between 3200 and 4000 K. An electronic oscillator strength of 0.033 was deduced from the measurements.

nonrefer.
C3C3C3C3

C.A. 1979, 9/1024

1979

C₃

4 Б125. Экспериментальное определение сечения поглощения в полосе Свинга системы C₃. Cooper D. M., Jones J. J. An experimental determination of the cross section of the Swings band system of C₃. «J. Quant. Spectrosc. and Radiat. Transfer», 1979, 22, № 2, 201—208 (англ.)

Экспериментально определены абс. сечения поглощения в полосе Свинга системы C₃ в диапазоне т-р 3200—4000° К из измерений по нагреву газовой смеси аргона и ацетилена ударной волной (метод ударной трубы) в спектральном диапазоне 300—540 нм. Структура, наблюдающаяся в зависимости величины спектральных сечений поглощения от длины волны, обусловлена колебательными переходами. На основе полученных величин сечений вычислена сила электронных осцилляторов и показано, что она слабо изменяется при изменении т-ры и составляет 0,033 для всех измерений, что находится в соответствии с экспериментально измеренными и теоретически рассчитанными величинами электронных сил осцилляторов, имеющимися в литературе. В. А. Сараев

сечения
поглощения.

2.1980. N4

C₃

commen 9706

1979

Good S. Lacha, et al.

ces. 1104.
Ji

Proc. - Indian Acad. Sci.,
Sect. A 1979, SPA (Pt. 1, No. 6),
453-5.

ces. CO₂ - III

C₃

B91-XIV-9478

19.2

6 Б58. Неэмпирическое исследование эффекта Реннера в молекуле C₃. Perić M., Radić-Perić J. Ab initio investigation of the Renner effect in the C₃ molecule. «Chem. Phys. Lett.», 1979, 67, № 1, 138—141

Вариационным методом в базисе волновых ф-ций двумерного гармонич. осциллятора вычислены низшие вибронные уровни энергии молекулы C₃. Неэмпирич. поверхности потенциальной энергии для компонент ¹B₁ и ¹A₁ электронного состояния ¹Π_u заимствовались из результата неэмпирич. расчета и представлялись в виде полинома 6-й степени по координате *r* деф. кол. C₃. Увеличение базиса используемых ф-ций позволило проследить сходимость положения вибронных уровней, вычисленных при отсутствии взаимодействия с валентными симм. и антисимм. колебаниями. Это обстоятельство, возможно, объясняет небольшое расхождение теории с экспериментом. Др. объяснение заключается в том, что выбранные адиабатич. потенциалы слишком быстро возрастают при увеличении *r*.

Е. Е. Никитин

Кв. мех.
расчет
потенц.
энергии
поверхн.

2. 1980. № 6

C₃

BP-XIV-9478

1979

KB. max.
factor

92: 13048w Ab initio investigation of the Renner effect in the triatomic carbon molecule. Peric, Miljenko; Radic-Peric, Jelena (Inst. Fiz. Hem., Prirodno-Mat. Fak., 11000 Belgrade, Yugoslavia). *Chem. Phys. Lett.* 1979, 67(1), 133-41 (Eng). A method is developed for the ab initio treatment of the coupling between the electronic and vibrational motions in triat. mols. It is based on a polynomial expansion of the mol. potential and the use of a variational method for calens. of vibronic levels and wavefunctions. The results for the $^4\text{H}_2$ state of the C₃ mol. are reported.

C. A. 1980. 92, N2

ВФ - XIV-9478

1979

C₃

4 Д154. Неэмпирический расчет эффекта Реннера в молекуле C₃. Ab initio investigation of the Renner ef-

fect in the C₃ molecule. Perić Miljenko, Radić-
Perić Jelena. «Chem. Phys. Lett.», 1979, 67, № 1, 138—141 (англ.) 2:

Предложен метод расчета энергии и волн. ф-ций для электронно-колебательных уровней трехатомных молекул с учетом эффекта Реннера. Метод основан на представлении потенц. ф-ции в виде полинома, вычислены коэф. этого полинома по способу конфигурац. взаимодействия и путем численного решения вибронного уравнения Шредингера вариационным методом. Численный расчет энергии первых 11 колебательных уровней электронного состояния ¹Π молекулы C₃ дает удовлетворительное согласие с эксперим. данными. М. Р. Алиев

Кв. их.
Растис

ф. 1980 № 4

1949

C₃

90: 212521d Carbon's high-temperature behavior. Comments, Strauss, Herbert L. (Dep. Chem., Univ. California, Berkeley, Calif.). *Science* (Washington, D. C.) 1979, 203(4386), 1266 (Eng). A polemic concerning a paper by A. G. Whittaker (*ibid.* 1978, 200, 763) is given concluding that the gas phase spectra provide no evidence for new forms of C₃.

Monocyclic.
cyclopentadiene

C.A. 1949, 90, 1266

1979

2 БЗ. Новый подход к записи гамильтониана для нежестких молекул. Sørensen Georg Ole. A new approach to the hamiltonian of nonrigid molecules. «Top. Curr. Chem.», 1979, 82, 97—175 (англ.)

Получены общие выражения для эффективных постоянных, входящих в модельные гамильтонианы, применяемые для описания колебательно-вращательных состояний молекул с большими амплитудами колебаний. Рассмотрение проведено в рамках приближения Борна Оппенгеймера. Обсужден общий подход к выбору координат, а также общий формализм решения квантовых задачи. Основу метода составляет непосредственное преобразование кинетич. энергии к обобщенным импульсам. В кач-ве примера изучен гамильтониан Вильсона-Говарда, рассмотрены возможные обобщения, возникающие при замене условий Экарта условиями Сейвица. Построен общий вид гамильтониана для нежесткой молекулы, из к-рого с помощью преобразования Ван-Флека получен эффективный полужесткий вращательный оператор. Развитый подход проиллюстрирован конкретным расчетом молекулы C_3 . Библ. 85.

Б. И. Жилинский

расчет
молекул

⊠
(41) метод

2.1980, №2

1979

C3

90: 212522e Carbon's high-temperature behavior. Reply to comments. Whittaker, A. Greenville (Woodland Hills, Calif.). Science (Washington, D. C.) 1979, 203(4386), 1266 (Eng). A reply to a polemic by H. L. Strauss (*ibid.* 1979, 203, 1226).

K/N 212522e

unrecd.
emphysis



C.A. 1979 Q3 N265

Оттиск 9861 1980

C₃

12 Д147. Аналитические функции для потенциальных поверхностей основных состояний $C_3(X^1\Sigma_g^+)$ и $HCN(X^1\Sigma^+)$. Analytical functions for the ground state potential surfaces of $C_3(\tilde{X}^1\Sigma_g^+)$ and $HCN(\tilde{X}^1\Sigma^+)$. Carter S., Mills I. M., Murrell J. N. «J. Mol. Spectrosc.», 1980, 81, № 1, 110—121 (англ.)

Получены аналитич. выражения для ф-ций потенц. энергии молекул C_3 и HCN в основных электронных состояниях $X^1\Sigma_g^+$ и $X^1\Sigma^+$, соответственно необходимые постоянные в потенц. ф-циях, включая квартичные члены, получены методом наименьших квадратов на основе экспериментально определенных геометрич. конфигураций и основных частот колебаний молекул, а также точек на потенц. поверхности, полученных в неэмпирич. расчетах. Найденные ф-ции потенц. энергии с высокой точностью воспроизводят доступные экспериментальные и теоретич. данные по геометрии, силовым постоянным в стабильных конформациях, а также данные по различным продуктам диссоциации молекул. С помощью аналитич. ф-ций потенц. энергий построены энергетич. контурные карты, отвечающие различным конформациям C_3 и HCN .
А. Дементьев

М. П.;
Геометрия
сил. const.
математ. нов.

ф. 1980
N 12

Х/В-9861

Omnicel 986f

1980

C₃
HCN

nomencl.
sp-448

93: 34085s Analytical functions for the ground state potential surfaces of C₃(X¹Σ_g⁺) and hydrogen cyanide (X¹Σ⁺). Carter, S.; Mills, I. M.; Murrell, J. N. (Dep. Chem., Univ. Reading, Reading, Engl. RG6 2AD). *J. Mol. Spectrosc.* 1980, 81(1), 110-21 (Eng). Analytic functions were obtained to represent the potential energy surfaces of C₃ and HCN in their ground electronic states. These functions closely reproduce the available data on the energy, geometry, and force consts. in all stable conformations, as well as data on the various dissocn. products, and ab initio calens. of the energy at other conformations. The form of the resulting surfaces are portrayed in various ways and discussed briefly.

19806-11X

(7) X

CA 1980 93 N4

Оттиск 9861

1980

C₃

HCN

поверхн.
потенц.
энергии.

(+1) ☒

X. 1981 N 1

1 Б64. Аналитические функции для потенциальных поверхностей основных состояний $C_3(X^1\Sigma_g^+)$ и $HCN(X^1\Sigma^+)$. Carter S., Mills I. M., Murrell J. N. Analytical functions for the ground state potential surfaces of $C_3(X^1\Sigma_g^+)$ and $HCN(X^1\Sigma^+)$. «J. Mol. Spectrosc.», 1980, 81, № 1, 110—121 (англ.)

Получено аналитич. представление поверхностей потенциальной энергии для основных электронных состояний линейных трехатомных молекул $C_3(X^1\Sigma_g^+)$ и $HCN(X^1\Sigma^+)$. Параметры использованной функциональной формы подбираются в каждом случае так, что точно воспроизводятся энергия, геометрия и силовые постоянные стабильных конформаций, а также энергии диссоциации по всем возможным каналам. Воспроизводятся также данные неэмпирич. расчетов для специальных конфигураций, например для переходных состояний. Приведены различные графич. представления полученных поверхностей потенциальной энергии.

А. И. Маергойз

9861-11X

C₃

1980

SiC }
SiC₂ }

U. R. Chakraborty

(41) 12

✓ 93: 194686s Laboratory spectroscopy of silicon dicarbide, triatomic carbon and related species. Gilra, D. P. (Dep. Space Res., Univ. Groningen, Groningen, Neth.). *Spectres Mol. Simples Lab. Astrophys., Commun. Colloq. Int. Astrophys.*, 21st: 1977 (Pub. 1980), 389 (Eng). Univ. Liege, Inst. Astrophys.: Cointe-Sclessin, Belg. In a spectral study ($\sim 2500\text{--}6500\text{ \AA}$ and $\sim 600\text{--}3300\text{ cm}^{-1}$) of C₃ in a King furnace after the addn. of Si, the blue continuum reported by Kleman was obsd. and its wavelength dependence detd. As the temp. was increased the continuum became stronger and finally condensation of small solid crystals (identified as SiC from x-ray powder spectra) required aborting the expt. From IR spectra, however, these crystals were ruled out as the source of this blue continuum. SiC₂ vibration-rotation was seen at $\sim 1740\text{ cm}^{-1}$. Strong unidentified features were seen at $1100\text{--}1200\text{ cm}^{-1}$. Electronic bands of SiC₂ were weakly obsd. It is suggested that IR spectra of Si-C species in a King furnace can lead to a detn. of vibrational-rotational const., in particular of SiC₂.

C. A. 1980, 93 n 20

1980

6 Б88. Информация о структуре молекул из экспериментов по кулоновскому взрыву ионов C_3^- и C_3^+ . Molecular structure information from the coulomb explosion of C_3^- and C_3^+ ions. Goldring G., Thieberger P., Wegner H. E. «Mol. Ions, Mol. Struct. and Interaction Matter. Proc. 38 Bat-Sheva Semin., Haifa». Bristol; New York, 1980, 53—55 (англ.)

Методом кулоновского взрыва исследована структура ионов C_3^- и C_3^+ . Ионы ускоряли до энергии 4,67 МэВ, после чего их электронные оболочки обдирались в углеродной фольге (1 мг/см^2). Ионы, образующиеся после разлета ядер многократно ионизированных обдиркой исходных ионов, регистрировали с помощью сцинтилляц. экрана, установленного на входе телевизионной камеры. Телевизионное изображение фотографировали и анализировали вручную, после чего производилось преобразование в цифровую форму отобранных изображений, их передача в ЭВМ и последующий анализ с восстановлением геометрии расположения атомов в исходном ионе. Установлено, что межъядерные расстояния в ионе C_3^+ больше, чем в ионе C_3^- .

Е. Николаев

геометр.
структ.

(H) X

X. 1983, 19,
116

ОТТИСКИ 9844

1980

C₃

12 Д146. Орбитальный угловой момент в трехатомных молекулах. IV. Состояние $\tilde{A}^1\Pi_u$ молекулы C₃.
Orbital angular momentum in triatomic molecules. IV. The $\tilde{A}^1\Pi_u$ state of C₃. Jungen Ch., Merer A. J. *Mol. Phys.*, 1980, 40, № 1, 95—114 (англ.)

С учетом недиагональных матричных элементов электронного орбитального углового момента L и кватртичного члена ангармоничности в потенц. энергии изгибного колебания выполнен расчет энергии первых трех вибронных уровней электронного состояния $\tilde{A}^1\Pi_u$ молекулы C₃. Отмечено, что для получения удовлетворительного согласия с экспериментом следует учесть зависимость среднего значения $\langle L_z \rangle$ от величины валентного угла C—C—C и зависимость длины связи C—C от величины угла C—C—C. Вычислены также значения вращательной постоянной B_v для различных вибронных состояний и факторы Франка—Кондона для полос системы $\tilde{A}^1\Pi_u - X^1\Sigma_g^+$ и сопоставлены с эксперим. данными. Ч. III см. реф. 12Д145. М. Р. Алиев

М. П.

Ф. 1980 № 12

[омтик 9844]

1980

C₃

24 Б59. Орбитальный угловой момент трехатомных молекул. IV. $\tilde{A}^1\Pi_u$ -состояние C₃. Jungen Ch., Merg A. J. Orbital angular momentum in triatomic molecules. IV. The $\tilde{A}^1\Pi_u$ state of C₃. «Mol. Phys.», 1980, 40, № 1, 95—114 (англ.)

417.

На примере описания $\tilde{A}^1\Pi_u$ -состояния линейной молекулы C₃ продемонстрирована возможность строгого рассмотрения эффектов, связанных с угловым моментом трехатомных молекул, характеризующихся большой амплитудой деф. колебаний. В рамках развитой общей теории описание уровней проведено с точностью в ~20 раз превышающей точность описания, достигнутую ранее при использовании станд. модели малых колебаний. Отмечено, что значит. улучшение результатов достигнуто при учете зависимости $\langle L_z \rangle$ от валентного угла. Для перехода $\tilde{A}^1\Pi_u - \tilde{X}^1\Sigma_g^+$ рассчитаны также факторы Франка — Кондона. Проведено сравнение энергетич. уровней линейной и нелинейной молекулы в орбитально вырожденном электронном состоянии. Собщ. III, см. пред. реферат.

Б. И. Жигарский

X. 1980 n 24

1980

C₃обязов.
из C₃H₄

93: 34209k Triatomic carbon radical production, vibrational relaxation and chemical kinetics following IR photolysis of allene. Lesiecki, M. L.; Hicks, K. W.; Orenstein, A.; Guillory, W. A. (Dep. Chem., Univ. Utah, Salt Lake City, UT 84112 USA). *Chem. Phys. Lett.* 1980, 71(1), 72-6 (Eng). IR multiple photon photolysis of allene (C₃H₄) is used to produce C₃(¹Σ_g⁺) which is probed by dye laser induced fluorescence. A kinetic anal. is presented which considers vibrational relaxation and reaction with NO and O₂ as added oxidants.

CA 1980 93 ~ 4

1980

C₃

16 Б191. Теоретическое исследование структуры спектра поглощения C₃. Perić M., Radić-Perić J. Theoretical investigation of the structure of the C₃ absorption spectrum. «Глас. Хем. друшт. Београд», 1980, 45, № 1—2, 145 (англ.)

Проведено теор. исследование колебательной структуры электронного спектра поглощения радикала C₃ (переход $\Pi_u - X^1\Sigma_g^+$) на базе полиномиального представления потенциала для первого возбужденного электронного состояния $^1\Pi_u$ молекулы, полученного методом ab initio ССП и КВ. Результаты расчета хорошо согласуются с экспериментом. В. М. Ковба

Спектр,

М.П.

X 1980 № 16

1980

C₃спектр
поглощ.

8 Б183. Спектральная непрозрачность трехатомного углерода, измеренная в графитовой трубчатой печи в области длин волн 280—600 нм. Snow Walter L., Wells William L. The spectral opacity of triatomic carbon measured in a graphite tube furnace over the 280 to 600 nm wavelength range. «J. Chem. Phys.», 1980, 73, № 6, 2547—2551 (англ.)

В области 280—600 нм измерен спектр поглощения молекулы C₃ (графитовая трубчатая печь с параболическим полем т-р, т-ра центральной зоны 2720—3060 К). Приведена электронно-оптич. блок-схема установки. Результаты измерений представлены графически в виде значений — $\ln T$ (T — пропускание) при т-рах 2720, 2915, 2980, 3015 и 3060 К с интервалом 10 нм. В. М. Ковба

X. 1981 N 8

1980

C₃

1) 3 Д726. Спектральное поглощение трехатомного углерода, измеренное с помощью графитовой трубчатой печи в диапазоне длин волн 280—600 нм. The spectral opacity of triatomic carbon measured in a graphite tube furnace over the 280 to 600 nm wavelength range. Snow Walter L., Wells William L. «J. Chem. Phys.», 1980, 73, № 6, 2547—2551 (англ.)

спектр
поглощ.

В спектральной области 280—600 нм измерено поглощение паров углерода при t -рах 2720—3060° К. Измерения проведены в электрич. графитовой печи, продуваемой потоком Ar. На основе полученных данных определено спектральное распределение оптич. плотности паров углерода, обусловленной поглощением линейных трехатомных молекул C₃. При вычислениях особое внимание обращено на корректный учет потерь света в ближней УФ-области спектра за счет рассеяния на микрочастицах с радиусом около 200 Å. Библ. 15.

С. Литке

ф. 1981 N 3

C₃

1980

check

93: 176472q The spectral opacity of triatomic carbon measured in a graphite tube furnace over the 280 to 600 nm wavelength range. Snow, Walter L.; Wells, William L. (Langley Res. Cent., NASA, Hampton, VA 23665 USA). *J. Chem. Phys.* 1980, 73(6), 2547-51 (Eng). The opacity of linear C₃ was measured in a graphite tube furnace from 280 to 600 nm. Data are presented for a max. centerline temp. range of 2720-3060 K.

C. S. 1980, 93 v 18

ССС

химик 12815

1981

Bohm H. P., Gleiter R.

обзор,
теорет.
расчет.
молекул.
орбитали,
колебания

Theor. chim. acta, 1981,
59(2), 153 - 179.

C₃

Amma 12171 | 1981.

структур.
анализ
3^й ат. вес.

Bershirov A. G., Spirido-
nov V. P.

J. Mol. Structure, 1981,
75, 291-301.

C_3^+

1981

Goldring G., et al.

Ann. Isr. Phys. Soc.

1981, 4, 53-55.

мол.
спрхт.

●
(см. C_3^- ; III).

C₃

1981

Hartford A., et al.

спектроскоп.
свободных
радикалов

Electro-Opt. Syst.
Des., 1981, 13, N 7,
51-54.

●
(сер. MS ; III)

1981

C₃
S₂O

91: 129590n Molecular constants of S₂O and C₃ molecules. Prabhavathy, V.; Nivedita Devi, R.; Ramasamy, R.; Venkateswarlu, K. (Dep. Phys., PSGR Krishnammal Coll., Coimbatore, 641 004 India). *Curr. Sci.* 1981, 50(4), 170-2 (Eng). For S₂O and C₃, the force consts., centrifugal distortion consts., and mean square vibrational amplitudes were calcd. by using the available exptl. vibration frequencies. The free energy, enthalpy, entropy, and heat capacity of S₂O and C₃ at 300-1000 K were calcd. by using the results.

M. N.

T. G. M. p. - G. M.

(43) ☒

O. A. 1981. 91. N16

1981

$C_3(X^1\Sigma_g^+ \rightarrow ^1\Sigma_u^+)$
 в 96.

3 Б1664. Поглощение излучения с длинами волн 135—220 нм углеродом и углеводородными радикалами в ударно нагретых ацетилене и метане. Shinn J. L. Optical absorption of carbon and hydrocarbon species from shock heated acetylene and methane in the 135—220 NM wavelength range. «AIAA Pap.», 1981, № 1189, 6 pp., ill. (англ.)

Исследовано поглощение излучения в диапазоне длин волн 135—220 нм углеродом и радикалами, образующимися при распаде C_2H_2 и CH_4 за ударной волной. Измерения проводились за проходящей ударной волной при т-рах 3000—4400 К. Проведен расчет равновесного состава продуктов распада C_2H_2 и CH_4 . При $3750 \pm \pm 100$ К основное поглощение происходит на C_3 . При уменьшении длины волны от максимума поглощения (при 158 нм) поглощение уменьшается. Исследованные линии поглощения соответствуют переходу $X^1\Sigma_g^+ \rightarrow ^1\Sigma_u^+$.
 С. В. Хомик

Х. 1982, 19, №3.

C₃

Дмитск 11851

1981

11 Д120. Циклические структуры C₃. Cyclic C₃ structures. Whiteside Robert A., Krishnan Raghavachari, Frisch Michael J., Pople John A., Von R. Schleyer Paul. «Chem. Phys. Lett.», 1981, 80, № 3, 547—551 (англ.)

гесметр.

Неэмпирическим методом ССП МО ЛКАО в базисах гауссовых ф-ций ОСТ-3ГФ, -3-21ГФ и -6-31*ГФ (с учетом поляризационных *d*-ф-ций), а также с учетом электронной корреляции в четвертом порядке теории Мёллера—Плессета исследовано электронное строение систем C₃—C=C=C: (I) и циклических — трикарбена (II), в котором на каждом атоме С находится неподеленная электронная пара (НЭП), циклопропинилидена (III), в котором НЭП только на одном атоме С, и циклич. триплета (IV) — циклопропенилидена, в котором на каждом из формально связанных двойной связью атомов С находится по неспаренному электрону (симметрия II и IV — D_{3h} и III — C_{2v}). Приведены

ф. 1981, 18, №11.

равновесная геометрия, энергетич. характеристики, гармонич. частоты. Во всех случаях наиболее стабильной найдена I с конфигурацией $(\sigma_g)^2(\sigma_u)^2(\sigma_g)^2(\sigma_u)^2(\pi_u)^4$, $^1\Sigma_g^+$, остальные структуры существенно менее стабильны. Структура IV в триплетном состоянии является локальным минимумом на поверхности потенц. энергии; III является седловой точкой вырожденной изомеризации I; энергия активации такой изомеризации оценена в 29 ккал/моль (с учетом поправки на разность энергий нулевых колебаний). Отмечено сходство поверхностей потенц. энергии для C_3 и C_3H_2 .

В. Л. Лебедев



Оттиск 11851

1981

C₃

(кв. мех.
расчет)

22 Б78. Циклические структуры C₃. White side Robert A., Krishnan Raghavachari, Frisch Michael J., Pople John A., Schleyer Paul von R. Cyclic C₃ structures. «Chem. Phys. Lett.», 1981, 80, № 3, 547—551 (англ.)

Проведены неэмпирич. расчеты поверхности потенциальной энергии (ППЭ) синглетного и триплетного состояний C₃; исследованы стационарные точки этих ППЭ. Предв. — вычисления выполнены с использованием ОСТ—3ГФ и 3—21ГФ базисов с последующей оптимизацией геометрии на 6—31ГФ* базисе. Корреляция электронов учитывалась до 4-го порядка теории возмущений Меллера—Плессета. Силовые константы и гармонич. частоты колебаний вычислены аналитич. дифференцированием. Наиболее устойчивой на синглетной ППЭ найдена линейная структура C₃. Структура циклопропиницидена отвечает переходному состоянию вырожденной изомеризации линейной структуры (энергия активации ~29 ккал/моль). Предв. вычисления для триплет-

X. 1981w22, 19A5

ного состояния указывают на то, что линейная и циклич. структуры имеют сравнимые энергии. Отмечена чувствительность силовых постоянных к выбору базиса. Вычисл. значения частот сравниваются с экспериментальными.

Н. А. Аникин

C3

[Am. 15798]

1982

15798-15799-1 Vacuum UV absorption of triatomic carbon
 reported in paper by K. Chung, Kok Wan Graham, W. E. M.
 (Dep. Phys., Texas Christian Univ., Fort Worth, TX 76129
 USA). *J. Chem. Phys.* 1982, 77(9), 4300-3 (Engl). The vacuum
 UV absorption spectrum to 1200 Å was obtained for the products
 from the evapn. of graphite at 2700°, trapped in Ar at 8 K.
 Based on correlations with the $1\Pi_u-X^1\Sigma_g^+$ transition of C_3 in the
 near UV, the results of ^{13}C substitution, and other observational
 evidence, it is proposed that a band system originating at 1890 Å
 be assigned to the $1\Sigma_u^+-X^1\Sigma_g^+$ transition of C_3 . Vibrational anal.
 yields $\nu_1' \approx 1080$, $\nu_2' \approx 300$, and $\nu_3' \approx 780$ cm^{-1} for the $1\Sigma_u^+$ state.

 $1\Sigma_u^+ - X^1\Sigma_g^+$

energy

manuscript

C. A. 1982, 97, N26

C₃

Om. 15798 1982

9 B170. Вакуумный УФ-спектр C₃ изолированного в аргоне при 8 K. Vacuum UV spectrum of C₃ trapped in argon at 8 K. Chang Kok Wai, Graham W. R. M. «J. Chem. Phys.», 1982, 77, № 9, 4300—4303 (англ.)

Измерены спектры поглощения в УФ- и вакуумной УФ-области продуктов испарения графита (Та-ячейка, $T \sim 2700^\circ$), изолированных в аргонной матрице ($T = 8$ K). Наблюдались две системы полос (одновременно исчезающие при отжиге матрицы) в области 1700—1900 Å и 4102 Å, отнесенные, соотв., к переходам $X^1\Sigma_g^+ \rightarrow {}^1\Pi_u \rightarrow X^1\Sigma_g^+$ молекулы C₃. В системе ${}^1\Sigma_u^+ \rightarrow X^1\Sigma_g^+$ выделены три прогрессии полос, одна интенсивная и две более слабые. Приведены максимумы полос колебательной структуры для ¹²C₃ и ¹³C₃ и их отнесение. Наиболее интенсивная прогрессия связана с симм. вал. кол. $\nu_1' \sim 1080$ см⁻¹. Из анализа распределения интенсивности полос в этой прогрессии сделан вывод, что межъядерное расстояние C—C молекулы в возбужденном электронном состоянии выше, чем в ос-

M. N.

X. 1983, 19,
N 9

новном. Вторая прогрессия с интервалом $\sim 600 \text{ см}^{-1}$ интерпретирована как $2\nu_2'$. Третья прогрессия связана с колебанием ν_3' , но однозначно не интерпретирована. В зависимости от отнесения, значение ν_3' либо $\sim 780 \text{ см}^{-1}$, либо 1320 см^{-1} . В спектре наблюдался также ряд полос, не принадлежащих C_3 : широкие полосы 1730 и 1693 А, система полос в области 1660 А. Обсуждается их происхождение. На основе значений ν_1' и ν_3' вычислены валентная силовая постоянная K_{11} и силовая постоянная взаимодействия связей K_{12} . В зависимости от выбора ν_3' получены след. два набора значений ($\times 10^5 \text{ дн/см}$): $K_{11}=4,85$, $K_{12}=3,41$ ($\nu_3' \sim 780 \text{ см}^{-1}$) и $K_{11}=6,18$, $K_{12}=2,07$ ($\nu_3' \sim 1320 \text{ см}^{-1}$).

В. М. Ковба

¹²C₃

[Om. 15798] 1982

4 Д553. Вакуумный УФ-спектр C₃ в Ag-матрице при 8 К. Vacuum UV spectrum of C₃ trapped in argon at 8 K. Chang Kok Wai, Graham W. R. M. «J. Chem. Phys.», 1982, 77, № 9, 4300—4303 (англ.)

В области длин волн 1900—1200 Å исследованы спектры поглощения продуктов испарения ($T=2700$ К) графита, изолированных в Ag-матрице при $T=8$ К. Система полос, расположенная в области 1890—1700 Å, приписана переходу $X^1\Sigma_g^+ \rightarrow ^1\Sigma_u^+$ молекулы ¹²C₃. Определены колебательные частоты ν_1' , ν_2' и ν_3' для состояния $^1\Sigma_u^+$ молекулы ¹²C₃ в Ag-матрице (~1080, 300 и 780 см⁻¹ соответственно). Библ. 31. А. В. Н.

$\nu_i, \text{cm}^{-1};$

сб. 1983, 18, №4.

C₃

1982

Ewing D. W., et al.

Chem. Phys. Lett.,

1982, 86, N 4, 365-

-368.

номер,
структ.,

№

(сер. C₂; III)

$C_3^{+,0,-}$

1982

97: 79239u Triatomic carbon (C_3) and $NCO^{+,0,-}$ molecular-ion structure studies by Coulomb explosion. Goldring, G.; Eisen, Y.; Thieberger, P.; Wegner, H. E.; Filevich, A. (Weizmann Inst. Sci., Rehovot, Israel). *Phys. Rev. A* 1982, 26(1), 186-98 (Eng). Coulomb-exploded fragments of $C_3^{+,0,-}$, C_4^- , C_5^- , C_6^- , and $NCO^{+,0,-}$, following stripping of high-energy mol. ions in a thin C foil, were recorded, 1st in plastic sheet detectors, and in later expts. with a new image-intensifying and digitizing system. All of the ions studied in detail, C_3 and $NCO^{+,0,-}$, appear to be formed in states of high bending excitation perhaps close to the dissocn. limit. The intranuclear sepns. for the C_3 species were found to be similar to that of normal neutral C_3 , 2.5(1) Å; and, for the NCO species, rather small, 2.0(1) Å.

структ.
парам.,
вещ, меор.
парамет

(44) 

C_4^- , C_5^- ,  C_6^- , $NCO^{+,0,-}$

@.A.1982, 97, N10

C3

Om. 15455 1982

6 Б1560. Динамика колебательной релаксации состояния $\tilde{X}^1\Sigma_g^+$ C_3 . Gu Y., Lesiecki Michael L., Bialkowski Stephen E., Guillory William A. Vibrational relaxation dynamics of the $\tilde{X}\Sigma_g^+$ state of C_3 . «Chem. Phys. Lett.», 1982, 92, № 4, 443—448 (англ.)

Методом разрешенной во времени оптич. спектроскопии флуоресценции C_3 ($C_3^1\Sigma_g^+$ получали путем ИК-многофотонной диссоциации аллена светом 9,55 мкм в колебательной моде ω_9), возбуждаемой светом перестраиваемого лазера на красителе в полосе перехода $\tilde{X}^1\Sigma_g^+ \rightarrow \tilde{A}^1\Pi_u$, изучена динамика колебательной релаксации $C_3\tilde{X}^1\Sigma_g^+$ в присутствии Ar, He, N_2 , O_2 , C_2H_2 (общее давл. ~ 20 Torr). Установлено, что C_3 имеет колебательную т-пу 850 ± 100 К через ≈ 2 мкс и 280 ± 50 К через 500 мкс после ИК-фотолиза аллена. Перенос энергии между валентными и деформационными колебаниями происходит значительно медленнее, чем установление равновесия в пределах каждого из них. Константы скорости гибели колебательных состояний $C_3^1\Sigma_g^+$, (110) в присутствии Ar, He, N_2 , O_2 , C_2H_4 , C_3H_4

спектр

X. 1983, 19,
N 6

равны $(1,57 \pm 0,06) \cdot 10^4$, $(1,45 \pm 0,16) \cdot 10^4$, $(1,78 \pm 0,07) \cdot 10^4$,
 $(1,84 \pm 0,43) \cdot 10^4$, $(4,64 \pm 0,10) \cdot 10^4$, $(2,0 \pm 0,7) \cdot 10^6$ с⁻¹·Торр⁻¹ соотв. Константа скорости р-ции
 $C_3(\tilde{X}\Sigma_g^+, 000) + C_2H_2$ равна $(2,2 \pm 0,2) \cdot 10^{-14}$ см³/(молекула·с).
 Ю. И. Дорофеев

C3

Dm. 15455

1982

3 Д684. Динамика колебательной релаксации состояния $\tilde{X}^1\Sigma_g^+$ радикала C_3 . Vibrational relaxation dynamics of the $\tilde{X}^1\Sigma_g^+$ state of C_3 . Gu Y., Lesiecki Michael L., Bialkowski Stephen E., Guillory William A. «Chem. Phys. Lett.», 1982, 92, № 4, 443—448 (англ.)

колебательная
релаксация
сост. $\tilde{X}^1\Sigma_g^+$
~~радикала~~
р. 1983, 18,
N3

Исследованы процессы колебательной релаксации радикалов C_3 ($\tilde{X}^1\Sigma_g^+ \nu_1, \nu_2, \nu_3$). Радикалы C_3 получались многофотонной диссоциацией аллена в поле CO_2 -лазера. С целью получения элементарных констант скорости релаксации измерялись временные зависимости поглощения излучения пробного лазера в вибронных полосах системы C_3 ($^1\Pi_u \leftarrow ^1\Sigma_g^+$). Разрешение по времени составляло 10—20 нс. Построена кинетич. модель, включающая 4 колебательных уровня, связь между которыми зависит от рода тушащего газа. Определены константы скорости релаксации C_3 ($^1\Sigma_g^+ 100$ и 110) в Ar, He, N_2 , O_2 и C_2H_4 , а также константа скорости реакции C_3 ($^1\Sigma_g^+, 000$) с C_2H_4 .
Е. П. Смирнов

1982

C_3
 C_3^- , C_3^+

Kühnel W., Gey E.,
et al.

ΔH_f ,
room temp.
cryo.

Z. Phys. Chem. (DDR),
1982, 263, N3, 641-645.

● (ser. C_2 ; II)

C₃

1982

Немухин А.В., Сте-
панов Н.Ф. и др.

84, а.н., Теор. и эксперим.
расчеты Ж. физ., 1982, 18, N5,
608-612.

(Сев. С₂; III)

C₃

1982

Sauer J., Čársky P.,
Zahradník R.

распре-
деление
по

Collect. Czech. Chem.
Commun., 1982, 47,
N 4, 1149-1168.

(cell. SiH₂; III)

C₃

1982

Yoshimine M., Krae-
mer W. P.

Chem. Phys. Lett., 1982,
90, N2, 145-148.

u. n.,

(see CCN^+ ; III)

C3

1983

3 B1187. Вакуумная УФ-спектроскопия малых молекул углерода и кремния при 10 К. Vacuum UV spectroscopy of small carbon and silicon molecules AT 10 K. Bhepherd Richard A., Chang Kok Wai, Graham W. R. M. «Bull. Soc. chim. belg.», 1983, 92, № 6—7: 16th Int. Symp. Free Radicals, Lauzelle-Ottignies, Sept. 12—16, 1983, 671 (англ.)

Сообщается об исследовании вакуумных УФ-спектров поглощения малых молекул углерода и кремния, изолированных в Ar-матрице ($T=10$ К). В спектре продуктов испарения графита наблюдалась система $(\sigma_g^2 \sigma_u^2 \pi_u^3 \pi_g^1)^1\Sigma_u^+ - (\sigma_g^2 \sigma_u^2 \pi_u^4)^X^1\Sigma_g^+$ молекулы C₃ в области 1890 А ($\nu_1' \approx 1080$, $\nu_2' \approx 300$, $\nu_3' \approx 780$ см⁻¹). Аналогичная система полос перехода $^1\Sigma - X^1\Sigma$, как предполагается, должна наблюдаться и в спектре молекулы SiC₂.

В. М. Ковба

м.п., Vi;

X. 1984, 19, n3

C₃

1983

Kaľafi Ĺakya H.,
Haege Robert H., et al.

номер,
сѣрукт.

J. Phys. Chem., 1983,
87, N 5, 797-800.

(сѣ. Si₂C; III)

C3

1983

6 Д474. Исследование спектров углеродсодержащих соединений за фронтом ударной волны. Определение силы осциллятора $A^1\Pi-X^1\Sigma$ перехода молекулы C_3 . Монякин А. П., Кузнецова Л. А. «Оптика и спектроскопия», 1983, 54, № 1, 79—84

За фронтом ударной волны (УВ), распространяющейся в смеси ($C_3F_6 + Ar$) или ($CH_4 + Ar$), исследованы спектры поглощения углеродсодержащих соединений. Как за падающей, так и за отраженной УВ наблюдались полосы системы Свана молекулы C_2 и псевдоконтинуум $A^1\Pi-X^1\Sigma$ -перехода молекулы C_3 , которые накладывались на непрерывное поглощение, увеличивающееся в коротковолн. области. Показано, что непрерывное поглощение обусловлено конденсированным углеродом, образующимся в пристеночном слое. Установлено также, что конденсированный углерод может существовать и в ядре потока за отраженной УВ вследствие отсутствия в системе химич. равновесия. На основании колич. измерений интенсивности псевдоконтинуума определена сила осциллятора перехода $A^1\Pi-X^1\Sigma$ молекулы C_3 $f_e = 0,044 \pm 0,020$. Резюме

Сила осцил-
лятора

$A^1\Pi-X^1\Sigma$ переход

оп. 1983, 18,
№ 6

C3

1983

98: 134579c Spectra of carbon-containing compounds behind a shock wave front. Determination of oscillator strengths of the $A'^1\Pi-X'^1\Sigma$ transition of the carbon C_3 molecule. Momyakin, A. P.; Kuznetsova, L. A. (USSR). *Opt. Spektrosk.* 1983, 54(1), 79-84 (Russ). The oscillator strength of the $A'^1\Pi-X'^1\Sigma$ transition of the C_3 mol. was detd. as $f_e = 0.044 \pm 0.020$ by the anal. of the electronic absorption spectra which were studied over the wavelength range 300-500 nm behind a shock-wave front propagating in mixts. of hexafluoropropylene and methane with Ar. The spectra consisted of a Swan band system of the C_2 mol., a pseudocontinuum of the $A'^1\Pi-X'^1\Sigma$ transition of the C_3 mol., CN and CH band systems, and a continuum absorption increasing towards the short-wave region. The latter was ascribed to a condensed C formed in a boundary layer at the shock tube walls. Alternatively, the C can be formed in a gas flow core behind the reflected shock wave due to a lack of the chem. equil. in the system.

 $A'^1\Pi-X'^1\Sigma$,f_{mn}

C. A. 1983, 98, N 16.

C₃

1983

Perić Miljenko, Peyer-
imhoff Sigrid D.

pacrēē
u. n.

Mol. Phys., 1983, 49,
N2, 379-400.

(● cell. BM₂; III)

C₃ Ommuck 16322 1983

Rakshit A. B., Bohme DK,

Am₁⁺

Int. J. Mass Spectrom.
and Ion Phys., 1983,
49, N2, 275-277.

C₃

Am. 16943

1983

Römel't J.B.,

meop.
pacrim

Phys. Bl., 1983, 39, N 7,
226-232.

C₃

[Om. 17621]

1983

вакуум.
УФ спектр

Shepherd R.A., Chang K.,
et al.,

Bull. Soc. Chim. Belg,

1983, 92, N6-7,

671. ●

C₃

1984

1 Б1072. Пересечения потенциальных поверхностей для трехатомных молекул. Potential energy surface intersections for triatomic molecules. Carter S., Mills I. M., Dixon R. N. «J. Mol. Spectrosc.», 1984, 106, № 2, 411—422 (англ.)

Рассмотрены различные типы пересечений потенциальных поверхностей, появляющихся при переходе к линейным конфигурациям трехатомных молекул: обсужден эффект Реннера — Теллера для состояний симметрии Π , Δ , Φ и др., а также пересечения поверхностей типа Σ и Π , Σ и Δ , Π и Δ . Представлен общий метод моделирования пересекающихся поверхностей по аналогии с ранее развитым методом для случая непесекающихся поверхностей. На примере ряда состояний C₃ и NH₂ отмечены основные этапы применения этого метода.

Н. Ф. Степанов.

пересечение
потенц.
поверхн.

Х. 1985, 19, N1.

СЗ

(om. 20303)

1984

Kraemer W. P., Bunker P. R., et al.

теорет.
исследов.
колебаний -
вращений
уровней
энергии,
с + их
дипольн. момента

J. Mol. Spectrosc.,
1984, 107, N1, 191-
● - 207.

C₃

От. 19672

1984

1 Д96. Теоретическое изучение вертикального сродства к электрону и потенциалов ионизации для C₃. Theoretical study of the vertical electron affinity and ionization potentials of C₃. Sunil K. K., Orendt Anita, Jordan Kenneth D., DeFreese Doug. «Chem. Phys.», 1984, 89, № 2, 245—256 (англ.)

расчет ϵ_i , E_i

Вертикальные потенциалы ионизации и сродство к электрону для C₃ рассчитаны с помощью методов ССП МО ЛКАО, МК ССП и конфигурац. взаимодействия. Использованы различные базисные наборы из сгруппированных гауссовых ф-ций с включением разного числа диффузных и поляризационных ф-ций. При небольших базисных наборах результаты метода конфигурац. взаимодействия сравнены с результатами применения теории возмущений Меллера—Плессета. Показано, что при учете эффектов корреляции состояния $^2\Sigma_u$ и $^2\Sigma_g$ положит. иона C₃⁺ лежат ниже по энергии, чем состоя-

ф. 1985, 18, N1.

ние ${}^2\Pi_u$. Единственным стабильным при данной геометрич. конфигурации состоянием аниона C_3^- является основное состояние ${}^2\Pi_g$. Полученная для этого электронного состояния оценка энергии (2,0 эВ) прекрасно согласуется с эксперим. оценкой (2,05 эВ), найденной на основании экспериментов по фотоприсоединению электрона к молекуле C_3 . Е. А. Ж.

C₃

От. 19672

1984.

1 Б1033. Теоретическое изучение вертикальных сродства к электрону и потенциалов ионизации молекулы C₃. Theoretical study of the vertical electron affinity and ionization potentials of C₃. Sunil K. K., Orendt Anita, Jordan Kenneth D., Defrees Doug. «Chem. Phys.», 1984, 89, № 2, 245—256 (англ.)

Рассчитаны сродство к электрону (основное состояние $^2\Pi_g$ отриц. иона) и потенциалы ионизации (состояния $^2\Sigma_g^+$, $^2\Sigma_u^+$ и $^2\Pi_u$ положит. иона) молекулы C₃ при фиксированной геометр. конфигурации ядер, равновесной для основного состояния C₃ в приближении ССП. Исследована зависимость результатов от выбора орбитального базиса и метода расчета волновой функции. Использован базис сгруппированных гауссовых функций 6—31Г, а также базисы 6—31ГХ, 6—31ГХ* и 6—31ГХ+ (Х означает включение в базис дополни-

и 4
асче

расчет Ae, γ ,
геометр.,
структурн.,
 ϵ_i

Х. 1985, 19, N 1.

тельных диффузных s и p функций, $*$ — однокомпонентных поляризац. d -функций, $+$ — двухкомпонентных d -функций). Расчет проведен методом ССП, методом конфигурац. взаимодействия с учетом одно- и двукратно возбужденных конфигураций по отношению к хартри-фоковскому детерминанту, многоконфигурац. методом ССП и методом конфигурац. взаимодействия с несколькими исходными конфигурациями (КВ НИК). Отмечено, что при использовании теоремы Купменса и при расчете методом ССП основным состоянием C_3^+ оказывается $^2\Pi_u$, тогда как при учете корреляции более низкую энергию имеют состояния $^2\Sigma_u^+$ и $^2\Sigma_g^+$. Получена величина сродства к электрону 1,74 эВ. Не обнаружено возбужденных связанных состояний C_3^- при геометрии, равновесной для C_3 . Рассчитаны также энергии ряда возбужденных состояний C_3 . Сделан вывод, что почти вырожденность занятых орбиталей $3\sigma_u$, $4\sigma_g$ и $1\pi_u$ и низкая энергия виртуальной орбитали $1\pi_g$ приводят к тому, что корреляц. эффекты более важны в процессах ионизации и возбуждения, приводящих к образованию дырки на σ -орбитали, чем при образовании дырки на π -орбитали. Для учета корреляции использована также теория возмущений Мёллера — Плессета; при учете одно-, двух- и четырехкратных возмущений в четвертом порядке теории возмущений получены результаты, близкие к результатам метода КВ НИК.

А. А. Сафонов

C₃

Im. 19672

1984

/ 101: 177865r Theoretical study of the vertical electron affinity and ionization potentials of carbon (C₃). Sunil, K. K.; Orendt, Anita; Jordan, Kenneth D.; Defrees, Doug (Dep. Chem., Univ. Pittsburgh, Pittsburgh, PA 15260 USA). *Chem. Phys.* 1984, 89(2), 245-56 (Eng). The electron affinity and first 3 ionization potentials of C₃ are calcd. using the MC-SCF and CI methods and by Moeller-Plesset perturbation theory. Whereas Koopmans' theorem and SCF calcns. indicate that the first cation state is ²II_u, upon inclusion of correlation effects both the ²Σ_u and ²Σ_g cation states are found to lie lower in energy. CI calcns. indicate that the ground state (²II_g) anion is stable by 1.74 eV. Allowing for the error in the calcd. electron affinity of the carbon atom, C₃⁻ is estd. to be stable by 2.0 eV, in excellent agreement with the 2.05 eV value detd. from recent photodetachment measurements. No excited anion states are bound at the equil. geometry of the neutral mol.

(Ae)

c.A. 1984, 101, ~20

C
3

1985

Bunker P. R.

Mol. Astrophys.: State Art
and Future Dir. Proc. NATO

ser. n. Adv. Res. Workshop, Bad Wind-
sheim, 8-14 July, 1984. Nord-
recht e. a.; 1985, 491-496.

(car.  CH₂; III)

C3

CM. 22938

1985

Jones R.O.,

Энергетич.
поверхн.,
теор.
расчет,
длина
связи.

Phys. Rev. A: Gen. Phys.,
1985, 32, N5, 2589-
-2594.

C₃

От 31093

1985

У 23 Б1042. Поверхности энергии низколежащих состояний C₃. Energy surfaces of low-lying states of C₃. Jones R. O. «J. Chem. Phys.», 1985, 82, № 11, 5078—5083 (англ.). Место хранения ГПНТБ СССР

Методом функционала локальной спиновой плотности рассчитаны сечения Пв потенциальной энергии основного и ряда возбужденных состояний молекулы C₃. Результаты в целом хорошо согласуются с данными расчетов методами ССП и конфигурац. взаимодействия. В частности, воспроизводится низкая частота деф. кол. в основном состоянии молекулы, порядок следования возбужденных электронных состояний, зависимости орбитальных энергий от валентного угла молекулы (диаграммы Уолша). Обсуждены особенности строения двух- и трехатомных молекул, содержащих связи C—C.

А. В. Немухин

(М.П.)

Х. 1986, 19, № 23

C3

Om 31093

1985

103; 27528k Energy surfaces of low-lying states of triatomic carbon, Jones, R. O. (Inst. Festkoerperforsch., Kernforschungsanlage Juelich, D 5170 Juelich, Fed. Rep. Ger.), *J. Chem. Phys.* 1985, 82(11), 5078-83 (Eng). D. functional calcs. were performed for the energy surface of the ground state [$^1\Sigma_g^+(1A_1)$] and low-lying excited states [$^3\Pi_u(^3B_1, ^3A_1)$, $^3\Pi_g(^3B_2, ^3A_2)$, $^1\Pi_u$, $^1\Pi_g$] of the C_3 mol. The exptl. geometries and sym. stretch frequencies of 1A_1 and $^1\Pi_u$ states are reproduced well, and there is good agreement with CI calcs. for the triplet states. The energy surface of the ground state is described qual. better than by CI calcs. and does not show the unusual square-well form found in Hartree-Fock calcs. The splitting of the Born-Oppenheimer surfaces in the Π states (Renner-Teller effect) is discussed, and the qual. features of the bonding presented in terms of the geometry dependence of the one-electron eigenvalues (Walsh diagrams). Together with earlier results for C_2 , the calcs. provide insight into the unique features of the C-C bond.

Кузнецов
А. Сосноцкий,
Номинс,
Норфелдсман

C. A. 1985, 103, N 4

C3

(On 24345) 1985

ab initio
расчет
энергетика
Рейнер-
Темперо

Peric' M., Peyerimhoff S.D.,
et al.,

Int. Rev. Phys. Chem.,
1985, 4, N 2, 85-124.

C3

Omuck 20828

1985

Winnewisser M.,

J. Mol. Struct., 1985,
126, 41-66.

уровни
энергии

L3

(OM-26247)

1986

Beardsworth R., Bunker P.R.
et al.,

кол. вращ.
спектр

J. Mol. Spectrosc., 1986,
118, n1, 50-63.

C3

1986

(уровни квант.)
 программа
 расчета

105: 51000u Rotation-vibration energy levels of water and triatomic carbon calculated using the nonrigid bender Hamiltonian. Beardsworth, R.; Bunker, P. R.; Jensen, Per; Kraemer, W. P. (Max Planck Inst. Astrophys., D-8046 Garching, Fed. Rep. Ger.). *J. Mol. Spectrosc.* 1986, 118(1), 50-63 (Eng). A new computer program was written for diagonalizing the nonrigid bender Hamiltonian, and the program was based entirely on the theory as reviewed by P. Jensen (1983) and P. Jensen and P. R. Bunker (1986). By using this program, the rotation-vibration energy levels can be calcd. for a triat. mol. from the potential energy function. The program is an improvement over an earlier version, particularly in the systematic treatment of all singular terms, and in the allowance made for the dependence of all perturbation energy denominators on the bending quantum no. ν_2 and rotation quantum no. K . The new program can be used for sym. and unsym. triat. mols. The program was tested by applying it to the calcn. of the rotation-vibration energy levels of C_3 from an ab initio potential surface, and of H_2O from ab initio and exptl. potential surfaces.

(H) H_2O

C.A. 1986, 105, N 6

C3

[Dm. 23776]

1986

Мезерле
М.С.С.М.,
ab initio

Chabalowski C.F.,
Buenker R.F., et al.,

J. Chem. Phys., 1986,
84, N1, 268-274.

C_3^+

1986

Geusic M.E., McIlrath
T.J., et al.

Do; J. Chem. Phys., 1986,
84, N4, 2421-2422.

( C_n^+ ; III)

C_3^+

(M. 28695)

1987

12 Б1124. Геометрическая структура C_3^+ . Geometrical structure of C_3^+ . Faibis A., Kanter E. P., Tack L. M., Bakke E., Zabransky B. J. «J. Phys. Chem.», 1987, 91, № 26, 6445—6447 (англ.)

геометрич.
структура

Методом кулоновского взрыва установлено нелинейное строение кластера C_3^+ . Молек. ионы C_3^+ , а также $C_3H_3^+$ и $C_3H_4^+$ получены бомбардировкой газа C_3H_4 электронами. Сделаны выводы о циклич. строении $C_3H_3^+$ и линейном строении $C_3H_4^+$. А. В. Немухин

(42) [X]

X. 1988, 19, N 12.

C_3^+

Am. 28695

1987

6 Д53. Геометрическая структура C_3^+ . Geometrical structure of C_3^+ . Faibis A., Kanter E. P., Tack L. M., Bakke E., Zabransky B. J. «J. Phys. Chem.», 1987, 91, № 26, 6445—6447 (англ.)

С помощью метода кулоновского взрыва исследована фрагментация ионов C_3^+ , $C_3H_3^+$ и $C_3H_4^+$ с энергией 4,5 МэВ при столкновениях с фольгами. По данным о распределении фрагментов по величине и направлению скорости установлена геометрич. структура углеродного кластера. Показано, что основное состояние иона C_3^+ имеет изогнутую структуру, в то время как внутри $C_3H_3^+$ он имеет преимущественно циклич. структуру, а в $C_3H_4^+$ характеризуется линейной геометрией.

Г. Н. Огурцов

(+2) Δ

ф. 1988, 18, № 6

C₃

1987

Kraemer W. P.

Struct. / React. and Thermo-
chem. Ions: Proc. NATO Adv.

Study Inst., Les Arcs, June

ser. n. 30-July 11, 1986. Dordrecht
etc., 1987. C. 247-260.

(cur. HOC^+ ; III)

C₃-

(om. 28270)

1987

Rasanen M., Liu Y. Y.,
et al.,

et al.

Chem. Phys. Lett., 1987,
142, N5, 308-312.

63

1987

108: 194898r A theoretical and experimental study of the lowest excited singlet and triplet states of triatomic carbon. Peric, Miljenko; Radic-Peric, Jelena (Fac. Sci., Univ. Belgrade, YU-11001 Belgrade, Yugoslavia). *J. Serb. Chem. Soc.* 1987, 52(6-7), 389-98 (Eng). The lowest excited singlet and triplet electronic states of the C_3 radical ($1^1\Pi_u$, $1^3\Pi_u$) were investigated by means of the ab initio multiref. double-excitation-CI method. The vibronic energy levels and wave functions are computed by matrix soln. of the corresponding Schroedinger equation. The calcd. probabilities for the transitions between vibronic levels of the electronic ground state ($1^1\Sigma_g^+$) and the $1^1\Pi_u$ state are compared with exptl. obtained intensity distributions.

($1^1\Pi_u$, $1^1\Pi_u$)

C.A. 1988, 108, N 22

ССС

[от. 27553]

1987

Зюбина Т.С., Чаркин О.П.,
Зюбин А.С.,

струк-
тура
и
стабильн.

Же. Неотам. Жилили,
1987, 32, N 11, 2616-
-2624.

C₃

1988

Burdett Jeremy R.,
Marsden Colin F.

u.n.

New J. Chem. 1988. 12,
N/O. C. 797-809.

(Cer. Si₃ ; III)

C₃

lom. 30490

1988

Jacox M.E.,

Ti, Vi; g. Phys. and Chem. Ref.
Data, 1988, 17, N 2,

308

L₃

(OM. 29313)

1988

param
konsum.
freemur

Jensen P., Kraemer W.P.,

J. Mol. Spectrosc., 1988,
129, N 1, 172-185.

A comparison of Perturbative
and Variation γ al Rotation-
Vibration Energies Calculated

for HOC^+ and C_3 using the
Nonrigid Sender and
MORBIA Hamiltonians.



L3

Om. 30583

1988

109: 179403c Infrared diode laser kinetic spectroscopy of the ν_3 band of the triatomic carbon molecule. Matsumura, Keiji; Kanamori, Hideto; Kawaguchi, Kentarou; Hirota, Eizi (Seinan Gakuin Univ., Fukuoka, Japan 814). *J. Chem. Phys.* 1988, 89(6), 3491-4 (Eng). IR diode laser kinetic spectroscopy was applied to reaction intermediates generated by the photolysis of diacetylene and allene at 193 nm. A strong band was obsd. around 2040 cm^{-1} and was assigned to the ν_3 band of C_3 . The obsd. spectrum was analyzed by using an energy level expression for a linear mol.; higher-order centrifugal distortion terms were necessary to be included in the least-squares fit. The band origin was detd. to be 2040.0198 (8) cm^{-1} . The rotational and centrifugal distortion consts. obtained suggest the presence of a potential barrier at the linear configuration in both the ground and ν_3 states.

(V3)



Q.A. 1988. 109. v. 20

63

от 30583

1988

6 Б1336. Инфракрасная полупроводниковая лазерная кинетическая спектроскопия полосы ν_3 C_3 . Infrared diode laser kinetic spectroscopy of the ν_3 band of C_3 . / Matsumura K., Kanamori H., Kawaguchi K., Hirota E. // J. Chem. Phys.— 1988.— 89, № 6.— С. 3491—3494.— Англ.

М.П.

Методом кинетич. полупроводниковой лазерной спектроскопии измерена вращат. структура полосы ν_3 молекулы C_3 в обл. 1900—2100 cm^{-1} . Молекулы C_3 получались при фотолизе ацетилена, дейтероацетилена, диацетилена или аллена излучением эксимерного ArF лазера (193 нм). Начало полосы при 2040,0198 cm^{-1} . Значения (в cm^{-1}) вращат. постоянных и постоянных центробежного искажения (линейная модель молекулы): основное состояние — $B=0,430445$, $D=7,42 \cdot 10^{-7}$, $H=-9,43 \cdot 10^{-10}$; состояние (001) — $B=0,435565$, $D=3,633 \cdot 10^{-6}$, $H=1,11 \cdot 10^{-13}$, $L=-2,214 \cdot 10^{-13}$, $M=2,176 \cdot 10^{-17}$. Полученные данные и, в частности, отриц. величина параметра колебательно-вращат. взаимодействия $\alpha_3=-0,005120$ cm^{-1} , указывают на то, что потенциальный барьер линейности в состоянии $\nu_3=1$ выше, чем в основном состоянии.

В. М. Ковба

Х. 1989, № 6

С3

Ом 30583

1988

2 Л187. ИК-диодно-лазерная кинетическая спектроскопия полосы ν_3 C_3 . Infrared diode laser kinetic spectroscopy of the ν_3 band of C_3 / Matsumura Keiji, Kanamori Hideto, Kawaguchi Kentarou, Hirota Eizi // J. Chem. Phys.— 1988.— 89, № 6.— С. 3491—3494.— Англ.

Методом диодно-лазерной кинетич. ИК-спектроскопии получен спектр промежуточных продуктов газофазной реакции фотолиза диацетилен и аллена излучением с длиной волны 193 нм. В области 2040 см^{-1} обнаружена полоса простой структуры, интерпретированная как полоса ν_3 молекулы C_3 . Частоты зарегистрированных линий приведены в таблице. Анализ структуры наблюдаемой полосы указывает на линейную форму молекулы C_3 . По полученным данным методом наименьших квадратов определены вращательные постоянные C_3 в основном состоянии и состоянии ν_3 , а также частота колебательного перехода ν_3 , равная $2040,0198(8) \text{ см}^{-1}$.
Н. Н. Ф.

М.П.

ср. 1989, № 2

C₃

1988

Smith R. Seth,
Anselment M., et al.

checkmp J. Chem. Phys. 1988,
89 (4), 2591.

(see  C₄H₄O⁺; (iii))

63

1988

16 Б1094. Получение нежесткого гамильтониана для вращения и внутреннего движения большой амплитуды произвольной молекулы. Derivation of the nonrigid rotation — large-amplitude internal motion Hamiltonian of the general molecule. Szalay V. «J. Mol. Spectrosc.», 1988, 128, № 1, 24—61 (англ.)

Для произвольной молекулы предложен метод построения эффективного гамильтониана, описывающего вращение молекулы как целого и внутр. движение большой амплитуды. Метод применим как в случае одной, так и в случае нескольких степеней свободы для движений большой амплитуды и основан на использовании контактных преобразований разл. гамильтониана по борн-оппенгеймеровскому параметру малости. Обсуждены три различных способа введения координат для таких движений. В качестве конкретного примера рассмотрена молекула C₃, для которой построен эффективный Пт для деф. кол. по лит. данным полного неэмпирич. расчета. Б. И. Жилинский

М.П.

Х. 1988, 19, N 16

C3

1989

Bernath P.,

High Resolut. Fourier Trans-
form Spectrosc: Sum, Pap.

u.n. High Resolut. Fourier Trans-
form Spectrosc. Top. Meet.,
Santa Fe, N.M., Feb. 13-15,
1989. - Washington (D.C.)

1989, - C. 92-93.

(all. Sil; III)

C₃

1989

Jensen P.,

равновесн.
структура

Does the C₃ Molecule
Have a Bent Equilib-
rium Structure?

Eleventh Colloquium On
High Resolution  tion May 25

Secular Spectroscopy, Giessen,
September 18-22, 1989, A1, Z25.

C3

1989

420 Б1092. Поверхность потенциальной энергии для молекулы C_3 , определенная по экспериментальным данным. Свидетельство угловой равновесной структуры. The potential energy surface for the C_3 molecule determined from experimental data. Evidence for a bent equilibrium structure / Jensen P. // Collect. Czechosl. chem. Commun.— 1989.— 54, № 5.— С. 1209—1218.— Англ.

С предложенным автором (//J. Mol. Spectr.— 1988. — 128.— С. 478) модельным гамильтонианом MORBID трехатомной молекулы (приближение жестких длин связей для деформационных движений) и ряда по переменным Морзе для вал. кол. интерпретированы новые эксперим. данные по спектрам лазерной флуоресценции молекулы C_3 . Потенциальная ф-ция при определенных по этим данным параметрах отвечает нелинейной равновесной геометрии молекулы с валентным углом $162,5 \pm 1^\circ$. Барьер перехода через линейную форму оценен в $16,5 \pm 3,6 \text{ см}^{-1}$. Отмечено, что в целом результаты согласуются с данными неэмпирич. расчетов Крэмера, Бюнкера и Йошимине. А. В. Немухин

М.П.

X. 1989, N 20

C₃

1989

111:140979m The potential energy surface for the carbon triatomic molecule determined from experimental data. Evidence for a bent equilibrium structure. Jensen, Per (Phys. Chem. Inst., Justus-Liebig-Univ., D-6300 Giessen, Fed. Rep. Ger.). *Collect. Czech. Chem. Commun.* 1989, 54(5), 1209-18 (Eng). The Morse oscillator-rigid bender internal dynamics (MORBID) Hamiltonian for triat. mols. was used to refine the potential energy function for the $X^1\Sigma_g^+$ electronic ground state of C_3 by fitting to exptl. data. In accordance with previous ab initio calcs., C_3 was found to have a bent equil. structure. The MORBID calcn. reported yields a barrier to linearity of 16.5 (3.6) cm^{-1} and an equil. bond angle of 162.5° (1.9°) with one std. error given in parentheses.

смугла

C.A. 1989, 111, N 16

63

DM 32077

1989

11 Д67. Поверхность потенциальной энергии для молекулы C_3 , найденная из экспериментальных данных. Доказательство изогнутой равновесной структуры. The potential energy surface for the C_3 molecule determined from experimental data. Evidence for a bent equilibrium structure / Jensen Per // Collect. Czechosl. chem. Commun.— 1989.— 54, № 5.— С. 1209—1218.— Англ.

Данные по флуоресцентному эмиссионному спектру, индуцированному лазерным излучением (Smith et al. // J. Chem. Phys.— 1987.— 87.— С. 4435). Используются для определения поверхности потенц. энергии основного электронного состояния молекулы C_3 . Подтверждено наличие у C_3 изогнутой равновесной структуры. Найдено, что равновесный угол изгиба равен $162,5^\circ$, а потенц. барьер для линейной структуры равен $16,5 \text{ см}^{-1}$.
А. П. Калинин

М.П.

ф. 1989, № 11

63

011 32938

1989

19 Б1322. Диодная лазерная спектроскопия C_3 : Полосы $\nu_2 + \nu_3 - \nu_2$, $2\nu_2 + \nu_3 - 2\nu_2$ и $2\nu_2 + \nu_3$. Diode laser spectroscopy of C_3 : The $\nu_2 + \nu_3 - \nu_2$, $2\nu_2 + \nu_3 - 2\nu_2$, and $2\nu_2 + \nu_3$ bands / Kawaguchi K., Matsumura K., Kanamori H., Hirota E. // J. Chem. Phys.— 1989.— 91, № 4.— С. 1953—1957.— Англ.

На ИК-диодном лазерном спектрометре в обл. частот $1920-2100 \text{ см}^{-1}$ измерены спектры полосы $(001)\Sigma - (000)\Sigma$, горячих полос $(011)\Pi - (010)\Pi$, $(021)\Delta - (020)\Delta$, $(021)\Sigma - (020)\Sigma$ и комбинац. полосы $(021)\Sigma - (000)\Sigma$ молекулы C_3 . Образец получен в результате пиролиза аллена или в ВЧ-разряде циклопропана или фурана. Анализ ИК-спектров выполнен с учетом квартичного, секстичного и октичного центробежного искажения и l -резонанса. Из данных по l -резонансу оценены частоты ν_2 для состояний (010) и (011) , соотв., 66 и 45 см^{-1} . Полученные результаты представляют интерес для астрофизики и зондирования атмосферы.

С. Н. Мурзин

М.П.


Х. 1990, № 9

C₃

Am 32 938

1989

111:143174F Diode laser spectroscopy of the carbon triatomic molecule: the $\nu_2 + \nu_3 - \nu_2$, $2\nu_2 + \nu_3 - 2\nu_2$, and $2\nu_2 + \nu_3$ bands. Kawaguchi, Koutarou; Matsumura, Keiji; Kanamori, Hideto; Hirota, Eizi (Inst. Mol. Sci., Myodaiji, Japan 444). *J. Chem. Phys.* 1989, 91(4), 1953-7 (Eng.). The ν_3 hot bands (011)-(010), (021)-(020), and the combination band (021)-(000) of C₃ were obsd. by a diode laser spectroscopic method. The C₃ mol. was produced by the photolysis of allene or by the discharge in cyclopropane or furan. Anal. gave mol. const. in each vibrational state and also the energy differences between (020) and (000). The derived vibrational frequencies were compared with the result of a Morse oscillator-rigid-bender internal dynamics (MORBID) calcn.

e.A. 1989, 111, N 16.

1989

24 Б1399. Новые электронные системы полос охлажденного в струе C_3 266—302 нм. New electronic band systems of jet-cooled C_3 : 266—302 nm / Lemire G. W., Fu Z., Hamrick Y. Mi, Taylor S., Morse M. D. // J. Phys. Chem.—1989.—93.—С. 2313—2319.—Англ.

В области 266—302 нм наблюдались новая сложная или новые сложные системы полос в спектре резонансной двухфотонной ионизации молекул C_3 охлажденных в сверхзвуковой струе. Испарение в-ва с графитовой Пв (^{12}C или смесь ^{12}C и ^{13}C) осуществлялось лазерным нагревом. Анализ вращат. структуры показал, что полосы принадлежат переходу $\Sigma_u^+ \rightarrow \Sigma_g^+$ с общим началом для всех полос (уровень 00⁰0 состояния $X^1\Sigma_g^+$). Измерены времена жизни (τ) для ряда полос (τ меняются в пределах 0,4—2,5 мкс). Эти данные согласуются с отнесением верхних уровней к состояниям $\dots 4\sigma_g(3\sigma_u^2 1\pi_u^4 1\pi_g(1\Pi_g))$ или $\dots 4\sigma_g^2 3\sigma_u^2 1\pi_u^3 1\pi_g(1\Delta_u)$. В любом случае переход индуцирован за счет вибронного взаимодействия Герцберга—Теллера с электронным состоянием $1\Sigma_u^+$, переход в к-рое разрешен. По границе обрыва спектра (в красную сторону) оценен верхний предел адиабатич. Пт ионизации молекулы C_3 ; 12,0 эВ.

В. М. Ковба

X.1989, n24

C3

1989

/ 110: 144060g New electronic band systems of jet-cooled carbon trimer: 266-302 nm. Lemire, George W.; Fu, Zhenwen; Hamrick, Yoon Mi; Taylor, Scott; Morse, Michael D. (Dep. Chem., Univ. Utah, Salt Lake City, UT 84112 USA). *J. Phys. Chem.* 1989, 93(6), 2313-19 (Eng). A complicated new band system or systems was obsd. in jet-cooled C_3 a 266-302 nm with use of resonant 2-photon ionization. Rotational anal. showed the bands to be of $\Sigma_u^+ - \Sigma_g^+$ vibronic structure, with all bands originating from the 00⁰ vibronic level of $X^1\Sigma_g^+ C_3$. Lifetimes of 0.4-2.5 μs are reported for several bands. These observations are consistent with an assignment of the upper state as either ... $4\sigma_g^2 3\sigma_u^2 1\pi_u^4 1\pi_g$, $^1\Pi_g$, or ... $4\sigma_g^2 3\sigma_u^2 1\pi_u^3 1\pi_g$, $^1\Delta_u$. In either case, the transition is induced by Herzberg-Teller vibronic coupling to a $^1\Sigma_u^+$ electronic state, for which the $^1\Sigma_u^+ \leftarrow X^1\Sigma_g^+$ transition is strongly allowed. An abrupt cutoff of the spectra toward the red provides evidence of an adiabatic ionization potential for C_3 of 12.0 eV, which is in any case an upper limit. Vaporization of mixed ^{12}C and ^{13}C powders produces mixed isotopomers of C_3 , demonstrating that C_3 is not solely produced by intact ejection that the laser-heated C surface.

$(\Sigma_u^+ - X^1\Sigma_g^+)$
(99)

C.A. 1989, 110, N 16

63

1989

9 Л177. Лабораторные наблюдение колебательно-вращательного спектра C_5 в газовой фазе. Laboratory observation of the rotation-vibration spectrum of gas-phase C_5 / Moazzen-Ahmadi N., McKellar A. R. W., Amano T. // Chem. Phys. Lett.— 1989.— 157, № 1-2.— С. 1—4.— Англ.

Самое высокочастотное асимметричное фундаментальное валентное колебание ν_3 цепей C_3 и C_5 наблюдалось в лабораторных условиях в смесях $C_2H_2 + He$ и $C_2H_4 + He$ (1:100), помещенных в полый катод для создания разряда. Исследования, проводимые с использованием спектрометра на перестраиваемом диодном лазере, предварялись экспериментами по матричной изоляции и астрономическими наблюдениями. Всего измерено 59 линий с γ от 0 до 72. Наблюдались небольшие локальные возмущения в области $\gamma=41$. На основе анализа результатов измерений получены точные значения положения полосы 2169 см^{-1} C_5 и вращательные параметры основного и возбужденного колебательных уровней.

И. Г.

М.П.

(4) 12

ср. 1989, № 9

1989

24 Б1425. Наблюдение спектров вынужденной лазерной флуоресценции молекул NCS и C_3 , охлажденных в сверхзвуковой струе. Observation of stimulated emission pumping spectra of jet-cooled NCS and C_3 / Northrup F. J., Sears T. J. // Chem. Phys. Lett.— 1989.— 159, № 5—6.— С. 421—425.— Англ.

Сообщается о наблюдении спектров вынужденной лазерной Фл охлажденных в сверхзвуковой струе молекул C_3 и NCS, к-рые образовывались при лазерном УФ-Фт молекул фурана и C_2H_5NCS , соотв. Отдельные вращат. линии в спектрах обычной лазерной Фл и стимулированной лазерной Фл возбуждались с помощью двух лазеров на красителях, накачиваемых одним эксимерным (XeCl) лазером. Для основного $\tilde{X}^1\Sigma_g^+$ состояния молекулы C_3 получены колебат. и вращат. постоянные. Отмечается, что рассматриваемая методика позволяет изучать вибронные уровни основного состояния малых свободных радикалов с высокими колебат. квантовыми числами.

А. В. Столяров

41

Х. 1989, № 24

63

М.П.