

1952

CO

Herzberg G.

Trans. Roy. Soc. Can.

46, 1 (1952)

CO

15

Kistiakowsky, Knight H., Malin M

1952

J. Chem. Phys., 1952, 20, 876

измерение диссоциации N_2 и CO.

Do

$\delta = 9,76$

расчет скорости деформации



CO

Q. Lovera Nuovo
Simento 9, 541-3 (италиан)

1952

Колебательные системы
2^е атомных молекулы,
образ. атомами 4, 5, 6 и 7 гр.

см. С₂.

1952

CO

ИК

32 Plyler E.K., Benedict W.S., Silverman S.
 J. Chem. Phys., 1952, 20, 175
 Прецизионные измерения в ИК-спектре CO

линии $C_2H_2 + O_2$; $CO + O_2$

$\pm 0,02 \text{ см}^{-1}$ 2-0; 3-0; - усиленные
 2-0; 3-1; 4-2; 5-3 - поглощенные

$$\omega_e = 2169,81$$

$$\omega_e x_e = 13,284$$

$$\omega_e y_e = 0,010$$

$$B_e = 1,93130$$

$$B_0 = 1,92253$$

$$\alpha = 0,017543$$

$$\gamma = 4,5 \cdot 10^{-6}$$

$$\beta_e = 5,95 \cdot 10^{-6}$$

$$\beta = 0$$

$$H_e = 5,8 \cdot 10^{-2}$$

$$2-0^1 (v_0^1 = 4263,84 \text{ R})$$

$$v_0 2-0 + v_0 4-2 = 8414,44$$

$$v_0 4-0 = 8414,46$$

$$\text{В полосе центра } v_0 4-0 = 8414,40$$

	V_0	$B^+ - B^-$	$B^+ - B^-$	$2(B^+ + B^-)$	$\delta^+ - \delta^-$
2-0	4260,063	3,81000	- 0,035060	$2,38 \cdot 10^{-5}$	0
B-1	4207,17	3,77495	- 0,035042	"	0
4-2	4154,38	3,73992	- 0,035024	"	0
5-3	4101,73	3,70491	- 0,035006	"	0
3-0	6350,47	3,79249	- 0,052576	"	0

10452,20

$y_v - y_0$

$V=1$	2143,27
2	4260,07
3	6350,44
4	8414,44
5	10452,18

Hadu
 2143,38 (Langermann, Nielsen, Sichel, Phys. Rev, 1947, 72, 28)
 2143,16 (Rao Astrophys. J. 110, 304 (1949))
 4260,06 (uzm)
 6350,47 (uzm)
 8414,16 (Herzberg, Rao J. Ch. Ph, 1949, 17, 1099)

CO

G. Lovera Nuovo
Simento 9, 541-3 (итальян)

1952

Колебательные системы
2^е атомных молекул,
образ. атомами 4, 5, 6 и 7 гр.

см C₂.

1952

V
CO

33

Plyler E.K., Bull J.J.

J. Chem. Phys., 1952, 20, 1178

ИК излучен

ИК эмиссионный спектр OH, CO и CO₂

от 3 до 5,5 м



1952

CO

Lo

Rosen B.

Mem. soc. roy. sci. Liege, 1952, 12, 317

Знаменье Давидово NO

F. Bedard.

IV-190

1953.

J. Gallagher

Phys. Rev. 92, 1440.

C. Johnson

7 микроволн. измерение $D_0(\text{Co})$.

$\chi_0(\text{C}^{12}\text{O}^{16}) = 189.0 \pm 0.7 \text{ ккал/моль.}$

$D_0(\text{Co})$

CA. 9.59.

7747-IV

1953

Ar, Kr, N₂, CO (I)

Fox R.E., Hickam W.M., Kjeldaa T., Grove D.J.
Natl. Bur. Standards (U.S.), 1953, Circ. No. 522
211-16.

Direct measurement of appearance potential
and ionization probability using a mass
spectrometer.

Ch.A., 1953, IO342 h

J

comb p. r.

CO

оттиски 3168

1453
~~1562~~

Байовон

По

книга, часть IX и X

Жермен дессоуна.

V

CO

39

Goldberg L, Müller E.A.

1953

 $X^1_2^+$

в спектре солнца

Astrophys. J., 118, 397 (1953)

Орбита Умеренная в центре

1-11-229-IV

$w_e = 2169,83$
 $w_{ex} = 13,297$
 $w_{ey} = 0,0115$
 $B_e = 1,93141$
 $\alpha_e = 0,017520$
 $\gamma_e = 2,96 \cdot 10^{-6}$
 $\delta_e = 6,18 \cdot 10^{-6}$
 $\beta_e = -1,76 \cdot 10^{-9}$

		$B_{v,2} + B_v$
2-0	4200,05	3,81029
3-1	4207,14	3,77527
4-2	4154,37	3,74027
5-3	4101,73	3,70527
6-4	4049,24	3,67029
7-5	3996,88	3,63532

2143,27
 420714
 410173
 -5214

13463,66
 14449,07

BP-III-5352; 500 - IV - BP

1953

$H_2, HJ, JBr, J_2, N_2, NO, OH, O_2, P_2, S_2, SO, Se_2$

$As_2, Br, CH, ClBr, Cl_2, ClF, ClJ, CO, HBr (De, we, Xe)$

Lippincott E.R.

J.Chem.Phys., 1953, 21, 2070-I.

A new relation between potential energy
and internuclear distance.

Ch.A., 1954, I74^Uf.

10

Chem. p.r.

CO

VI

McCulloch, Glover Y.

Phys. Rev., 1953, 89, 145-7Электронный спектр $C^{13}O^{16}$ Вращ. анализ 0-1, 0-2, 0-3, 0-4 и 0-5 и $\frac{1}{2}$ -1 $C^{12}O^{16}$ $C^{13}O^{16}$

ишос

Австралия

 $\omega_e = 2169,84 ; 2121,47$ A $C^{12}O^{16}$ B $\omega_e x_e = 13,301 ; 12,712$ Te = 65076,5; 86927,6 $\omega_e y_e = 0,0123 ; 0,0115$ $\omega_e = 1515,61 ; 2160,7$ Постоянные $C^{13}O^{16}$ полученные пере- $\omega_e x_e = 17,250 ; 39,3$ том, с учетом верх-
них уровней (Чего....),

где были отмечены погрешности ошибки

на 2 см⁻¹

44-249

265-10 1953
CO (B' , B'' , B_e , D' , D'' , w_e , $x_e w_e$, N_i)

Mills Y. L., Thompson H. W.

Trans. Faraday Soc., 1953, 49, N3, 224-227 (anne.)

The fundamental vibration-rotation bands of $^{13}\text{C}^{16}\text{O}$ and $^{12}\text{C}^{18}\text{O}$.

Pryor, 1954, N11, 28452. 10

АН

CO

34

1953

Рылов Е.К., Вэине Л.Р., Ванек Ж.А.

Ж. Opt. Soc. Am., 1953, 43, 822

маленькие постоянные CO

кр. соотв. от 4,5 до 5,2 мкм

В посылке и прилагаются материалы

по-метановое плече: 1-0, 2-1, 3-2

зависимости пост. нейт.

CO (y).

291-IV

1953

Sahni R. C.

Trans. Faraday Soc., 1953, 49, N11, 1246-
1253 (abbr)

The structure of carbon monoxide.

J. Chem. Phys., 1954, N12, 30202.

10

2
✓ 4

M. S. Sodha

$D_0(\text{CO})$
судн. с

1953.
Science and Culture
(India) 19, 45-6.

$D_0(\text{CO})$, величина судн. с, атомная величина
образ. метана и соэф. атомов с в
молекуле метана

$$L = D_0(\text{CO}) - 85.78 \text{ ккал}; D_0(\text{CH}_4) = L + 222.47 \text{ ккал.}$$

Калькуляция затрат. $D_0(\text{CO}) = 256.19 \text{ ккал/м.}$

$$L(\text{C}) = 170.4 \text{ ккал/мол}$$

$$D_0(\text{CH}_4) = 392.8 \text{ ккал.}$$



с CH_4 (1D)

X-55-8-13373

CA. 0.54

Bop-156-IV

1953

CD

Singh Sodha M.

No

Sci and Culture
1953, 19, N1, 45, 46

PX. 1955, 13373

L(c)

C

Sodha H.S.,

Science and Culture (India) 1953, 19, 45

Tenison Procotolazine CO, L(c),

D(CH₄) = coenzyme a over C 0

incoenzyme CH₄

Shayar

170

$$L = D_0(CO) - 85,78$$

$$D_0(CH_4) = L + 222,47$$

Amelny 4* bymumix belumix

D(CO)



not determined

X-55-8-13 373

C.A. 1854-3134d

Величина запаса 256,18. Тогда

$L = 170,4$ и $D(CH_4) = 352,8$ и все с в

CH_4 находится в $L.D$ состоянии.

C C₁₁H₄

темное
субстанция,

CO

энергия

диссоциации

C₁₁H₄

энергия

диссоциации

Codex
Mahendra Singh Sodhe 1953
Science and Culture (India) 19,
45-6 (1953)

Темное вещество, источник
энергии, скрытая темная суб-
станция энергии, темное обрече-
нное вещество и
состояние атом энергии в
полном смысле слова.

C.A. 1954-3134d,e

CO
(7)

BP-291-IV | 1953

Sahni R.C.

Trans. Faraday Soc.,
1953, 49, N11,
1246-1253

1953

V

CO

$\lambda_0 = 6,9 \mu$

~~14~~

Valatin J.Y.

Proc. phys. Soc., 1953, A66, 1185

Предисоединение и энергия диссоциации CO.

1
Bp-318-1V

Автор сотрудничает с Кэджаном относительно $D_0(\text{CO})$, заимствовал данные Уэбба и Schmidt'a.

PHX-55-13-25579

CO

Aroeste H.

J. Chem. Phys., 22, 1273

Correlation between infrared intensities, dissooiation energies, and equilibrium intermolecular distance for diatomic molecule.

V

CO

ИК

1954

Salby F.W., Dickey F.P., Williams S.

Phys. Rev., 1954, 93, 364^AИК эмиссионный спектр CO в
области 2,4 м

кр. сообщ.

Источ. смеси $O_2-C_2H_2$ и O_2-CO

III-5-2
CO (I)

7746 - IV

1954

CO^+ (Te)

N_2 (I)

N_2^+ (Te)

Fox R.H., Hickam W.R.

J.Chem.Phys., 1954, 22, N 12,

2059-2063 (amm)

Study of carbon monoxide,
nitrogen, propylene, and benzene
ionization probability
curves

PX., 1956, 6112

10

ECTE 4. v:cp

1954

CO

W. Goeckel

У. Phys. cadium 15, 521-3

Спектроскопия в области
длин волн 1-5 микрон.

Результаты для CO.

CO (D)

BP- IV-264

1954

C (ΔH_S)

A.P. (CO^+ , O^+ , C^+)

Lindholm E.

Arkiv.fys., 1954, 8, N 5, 433-440()

Ionization and fragmentation of CO by bombardment with atomic ions. Dissociation of CO.

PX, 1956, 38675

B, B, H, M

Rec'd 9-12.

1954

CO

Vincent. Yessie J.

Compt. Rend., 1954, 239, 251

Измерение интенсивности и ширины
линий в ИК-спектре газов и паров

CO

HK

Blaine L.R., Plyler E.K., Tidwell E.D.
 J. Res. Nat. Bur. Stand. USA, 1955, 55, 183

HK спектр нормализован и измерен
 CO в обл. 4-6 μ

Разделение линий 0,2-0,3 см⁻¹

2-1 $\nu_0 = 2116,80$ см⁻¹

3-0 $\nu_0 = 6350,42$ (а не 6350,47 как у Plyler, ...). Ch. Ph. 20,
 175 (1952)

хорошее совпадение с результатами

Goldberg, Müller Astrophys. J. 118, 397 (1953) наблюд.
 CO в спектре солнца

2. нет

$$\nu_0 = 2143,274 \pm 0,003$$

$$B_1 = 1904994 \pm 0,000036$$

$$B_0 = 1,922523 \pm 0,000037$$

$$J_0 = 6,26 \pm 0,025 \times 10^{-6}$$

$$J_1 \cdot J_0 = -2,93 \cdot 10^{-9}$$

Twef.	Goldberg Müller	Flaquesius. Fischer
w_e	2169,83	$2169,830 \pm 0,004$
$w_{ex e}$	13,297	$13,297 \pm 0,012$
$w_{ey e}$	0,0115	$0,01150 \pm 0,00014$
B_e	1,93141	$1,93130 \pm 0,00005$
α_e	0,017520	0,017520
γ_e	$2,96 \cdot 10^{-6}$	$4,5 \cdot 10^{-6}$
δ_e	$6,18 \cdot 10^{-6}$	$6,26 \cdot 10^{-6}$
β_e	$-1,76 \cdot 10^{-9}$	$-2,99 \cdot 10^{-9}$

CO

НЧ, НФ
спектр

Coulon R., Vodar B.

1955

Nuovo Cimento 1955, suppl 53, al 2,
670-674.

Вращ.-колеб. спектр НЧ, НФ и СД
возмущение поперечными газами
под токовым воздействием

✓ перевод

N_2 (CO)

$D_0 = 9,756$

ВФ-211-12

ВФ-1268-III

Douglas A.E

J. Phys. Chem., 1955, 59, 109-110

Новые спектралн. исследования
простых молекул.

$D_0(CO)$ не может быть опре-
делена однозначно из
спектр. данных

РМХ.55.33812

1955



CO

Do.

предисказание
в шифре

Вор-219-IV

A.E. Douglas, C.K. Möller

1955

Canad. J. Phys. 33, 13-4, 125

Предисказание в шифре

$C^{12}O$ и $C^{13}O$.

Состояние Амигрен $C^{12}O$ и $C^{13}O$

(35 фт рунга) пропорционально давлению на микрограде
с борной дисперсией 0,7А/м и
заказу 1016 предисказание.

Предислов. дано параше док-ва того же
 диссертационный предсказание
 на $89595 \pm 30 \text{ см}^3$ Вывод над уровнем $V=0$
 основного содержания. Частично извлечен
 понос (А'П-Х'Э) и извлечен с него
 и показано, что предислов. в А'П сего
 не наблюдается (добавить надл. в 3 см^3 параше
 30% ширины $0,23 \text{ л/мин}$).

Данные из таблицы:

	V_0	δ'	δ'
0-1	20712.50	1.863	$5.4 \cdot 10^{-1}$
0-2	19297.00	1.863	
1-1	22419.76	1.837	

Наблюдения
 диссерт. предислов.
 понос сего, (в со-
 разности (о 89595
 $90 \pm 3684 \text{ см}^3$) в зави-
 сии с соотв. домов-предислов.

CO

Bongartz A., Möller C.

Canad. J. Phys., 1955, 33, 125

до
предиссоц
Амстрема
IV полонит

Предиссоциация в спектре C¹²O и
C¹³O и ~~возможное значение до~~

Результат 25.17

$\delta_0 = 89595 \pm 30 \text{ см}^{-1}$ шг. Амстрема 0,7 Å/мм
IV полонит. 0,23 Å/мм

Полосы Амстрема C¹³O

	ν_0	ν_1	δ'
0-1	20712,50	1,863	$5,4 \cdot 10^6$
0-2	19297,00	1,863	-11-
1-1	22749,76	1,837	-11-

Биссоц. предиссоц.
молет шг. в. зм.
темпе от 89595
до 73684 см⁻¹ в
зависимости от
атомов - предиссоц.
диссоциация.

РХХ.55.54406

CO?

P. Radzi, A. Novak

1955

Trans. Farad. Soc. 51, 1614-20.

U.K. strength much stronger

V

CO

58

Хопфилд-Барнха

IV-246 11955

Hertzberg G., Hugo T.J.

Canad. J. Phys., 1955, 33, 757

Запрещенные переходы в 2-й атомной
молекулах. IV. $a'^3\Sigma^+ \leftarrow X'^1\Sigma^+$ и $e^3\Sigma^- \leftarrow X'^1\Sigma^+$

новые измерения CO

0,63 и 0,50 Å/mm

$$B_0'' = 1,92265$$

$$D_0'' = 6,45 \cdot 10^{-6}$$

$$\lambda + \frac{1}{2} \gamma = \begin{matrix} -1,13 \\ +0,84 \end{matrix}$$

$$a'^3\Sigma^+ \rightarrow \begin{cases} v_0 = 55823,07 + 1230,65_1(v + \frac{1}{2}) - 11,013_0(v + \frac{1}{2})^2 + 0,07378(v + \frac{1}{2})^3 - 0,00115(v + \frac{1}{2})^4 - 1081,74 \\ B_v = 1,3453 - 0,0187_2(v + \frac{1}{2}) + 0,00020_5(v + \frac{1}{2})^2 - 0,000005_1(v + \frac{1}{2})^3 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} v_0 = 65340,05 + 1093,99_3(v + \frac{1}{2}) - 9,578(v + \frac{1}{2})^2 + 0,0058_2(v + \frac{1}{2})^3 - 1081,74 \\ e^3\Sigma^- \end{cases}$$

РХХ: 56.67622

$$B_v = 1,2663 - 0,0179(v + \frac{1}{2}) + 0,0001(v + \frac{1}{2})^2$$

$a^1 \varepsilon^+ - x^1 \varepsilon^+$ *н. п. у. т.* $e^2 \varepsilon^- - x^2 \varepsilon^+$ $v^1 - v^{11}$ V_0 B_v V_0 B_v

0-0	<u>5535391</u>	<u>1,3360</u>	<u>6480291</u>	<u>1,2574</u>
1-0	<u>5656277</u>	<u>1,3177</u>	<u>6587782</u>	<u>1,2399</u>
2-0	<u>5775016</u>	<u>1,2995</u>	<u>66933,26</u>	<u>1,2221</u>
3-0	<u>58916,49</u>	<u>1,2823</u>	<u>67970,31</u>	<u>1,2048</u>
4-0	<u>60062,64</u>	<u>1,2658</u>	<u>68987,86</u>	<u>1,1878</u>
5-0	<u>61187,65</u>	<u>1,2478</u>	<u>69986,39</u>	<u>1,1720</u>
6-0	<u>62293,64</u>	<u>1,2307</u>	<u>70966,21</u>	<u>1,1542</u>
7-0	<u>63379,44</u>	<u>1,2140</u>	<u>71926,47</u>	<u>1,1360</u>
8-0	<u>64446,9</u>	<u>1,1950</u>	<u>72868,84</u>	<u>1,1214</u>
9-0	<u>65492,28</u>	<u>1,1816</u>	<u>73792,28</u>	<u>1,1052</u>
10-0	<u>66520,39</u>	<u>1,1655</u>	<u>74696,06</u>	<u>1,0894</u>
11-0	<u>67529,5</u>	<u>1,1470</u>	<u>75581,47</u>	
12-0	<u>68519,71</u>	<u>1,1334</u>	<u>76448,12</u>	<u>1,0737</u>
13-0	<u>69491,25</u>	<u>1,1176</u>	<u>77296,07</u>	<u>1,0582</u>
14-0	<u>70444,37</u>	<u>1,1014</u>	<u>78125,33</u>	<u>1,0429</u>
15-0	<u>71378,91</u>	<u>1,0854</u>	<u>78935,95</u>	<u>1,0278</u>
16-0	<u>72295,14</u>	<u>1,0692</u>	<u>79727,95</u>	<u>1,0129</u>
17-0	<u>73192,54</u>	<u>1,0532</u>	<u>80501,36</u>	<u>0,9982</u>
18-0	<u>74071,60</u>	<u>1,0369</u>		<u>0,9837</u>
19-0	<u>74932,04</u>	<u>1,0206</u>		
20-0	<u>75773,91</u>	<u>1,0037</u>		
21-0	<u>76597,06</u>	<u>0,9869</u>		
22-0	<u>77401,27</u>	<u>0,9698</u>		
23-0	<u>78184,8</u>	<u>0,958</u>		

O (A)

B9 241-IV
B9-2209a-III

1955

NO, N₂, O₂, CO (D)

Hagstrum H.D.

J. Chem. Phys., 1955, 23, N 6, 1178-1179
(англ.)

Новая интерпретация опытов по электрон-
ному удару в CO, N₂, NO и O₂.

РЖХ, 1957, № 9, 29554

10



CO

1953
Jarmain W Fraser P.
Nicholls P.
Astrophys. J. 122, 55-61

Вероятности переходов
в колеб. спектре
 N_2 , NO , O_2 , O_2^+ , OH , CO
и CO^+ .



CO

Книжка R.H. A.S. Gordon
J. Ch. Ph., 23, 2007.

1953

Смесь CO-O₂ воздуха
I Вулканов. облака.

University
of Colorado
Boulder

Penner, J.S., Broeste H.

1955

J.Ch.Ph. 25, 2244

Determination of absolute
intensities from single beam
single- and multiple-path
absorption measurement.

U.K. map CO.

✓

CO

35

Blaine, Connor W.S. 1955

Plyler E.K., и др.

J. Am. Opt. Soc. Am., 1955, 45, 102.определение скорости света по
молниевым постановкам CO.

$$V_0 = 2143,274 \pm 0,0016$$

В air 4,57 м

$$B_1 = 1,904994 \pm 0,000036$$

$$B_0 = 1,922523 \pm 0,000037$$

$$b_0 = 6,26 \pm 0,025 \cdot 10^{-6}$$

Step-1

CO

Plyler R. K., Blaine L. R., 1955
Tidwell R. H.

Y. Res. Natl. Bur. Std., 55, 183.

Infrared absorption and
emission spectra of carbon
monoxide in the region from
4 to 6 microns.

CO

Sun. H., Weissler G. L.,

1955

J. Chem. Phys., 23, 1625, 1955

Резонансное взаимодействие между
2 лантанидами в кристаллах
от 955 до 1306 Å

Судн.
Лепеткина

1955

102

Tinkham M. Strandberg
M.W.P.

Phys. Rev. 97, (4) 937-951

Монка циркуля
невозможности создания
молекул  O₂.

CO

Vareshni Y.P.,
Majumdar K.

1955

Секундокопир. постое-
нное дел-л.

(Сел. SiO) III

1309-195-V/1356

L(c)
D/co

Bracelett T. E.

Y. Ch. Ph., 1956, 24, 1103

измерения расстояния
измерения

Температура воздуха 25°

$D/co = 11,128$ и $L(c) = 170$ км

измерения расстояния ~~667~~

$X/co = 9,6$ и измерены по формуле

Langer и др. (с. 43, 2182 h), сдв

из объема и измерены

C.A., 1956, 105073

$e^- + CH_4 \rightarrow C^+ + 4H + 2e^-$. Но если в результате
ионизации процесс $e^- + CH_4 = C^+ + 2H^- + 2H$, то
тогда ионизационный потенциал $D(CO) = 11,12 eV$.

CO

T. E. Brackett | Bp-195-IV | 1956

Do.

J. Ch. Ph. 24, 15, 1103

$\Delta_o = 11.1 \text{ eV}$.

Энергия диссоциации CO.

Возможно разрешение противоречия между результатами последней работы (8055/1955) показавшей, что $\Delta_o(\text{CO}) = 11.1 \text{ eV}$.

и результатами, полученными

многом эксперименте удаче
 $D_0(\text{CO}) = 9.6 \text{ эВ}$ (Р.А. 1011 / 1955).

Предпологалась реакция:
 $e^- + \text{CH}_4 \rightarrow \text{C}^+ + 4\text{H} + 2e^-$; если же
вместо нее взор

$e^- + \text{CH}_4 \rightarrow \text{C}^+ + 2\text{H}^- + 2\text{H}$, то
энергия диссоц. CO должна
состав. $D(\text{CO}) = 11.1 \text{ эВ}$, в согласии
с результатами первой работы.

ω

D

BQP-188-LV

Barrow R.F., Gretzer W.B.

1956

Malherbe J.F. R. Ph. Soc. 69A, 574

Умножение точек на сфере $b^2 \bar{z} + a^2 \bar{z}$

$$\phi_0(\omega) \leq 10,94 ?$$

Fig. II, 24-25

Энергия диссоциации

В99 - 188 - IV

CO

Barrow R.F., Gratzel W.B., Malherbe Y.F. 1956
Proc. Phys. Soc. 1956, B69A, 574⁰

Изучение пре-
дела диссо-
циации

Изучение вращ. полос $b^3\Sigma^+ - a^3\Pi$ системы CO

$D_0(CO) \leq 10,95 \pm 6$? Гейдон в 1953 (монография) отметил, что
если обнаружен, полос с $v' \geq 2$ в системе
 $b^3\Sigma^+ - a^3\Pi$ обусловлено диссоциацией
диссоциационный предел CO лежит ниже 10,95

Хотя не-
Пир. V, 24. полос вообще не возбуждается, изучение

интенсивности понос системы показывает что их
интенсивности очень малы...

CO

R.F. Barrow, W.B. Gatzert, 1956
J.F. Malherbe.

$D_0 \leq 10$, 94 > Proc. Phys. Soc. A69, 574-6

11-881-668

Исслед. итермивности новое в
сфере $b^3\Sigma^+ - a^3\Pi$ и их уперд

Золота с $v'=2$ в сфере $b^3\Sigma^+ - a^3\Pi$
если вообще и не существует,
Ph. Abs. 60 знаменитый слабее, чем
1177 отсюда. Если записано

связан с предельной функцией, где

$$\Phi_0(C_0) \leq 10,94 \text{ еб}.$$

Возможно однако, что этот эквивалент
связан с возмущениями.

НТ (Be, 20 , 22)

206-17

1956

CO (до-вращ. пер.)

Cowan M., Gordy W.,

Phys. Rev., 1956, 104, 551-552 (англ).

Наибольшее распространение методов
микроволновой спектроскопии
на субмиллиметровый диапазон.

МЖХ, 1957, 15, 50-58

CO

Kostkowski H.J., Bass A.M. 1956

Spectrochim. acta, 1956, 8, 314

Line-widths and shapes in CO at pres.
sures above one atmosphere

hp. cooduz

Co
D₀

Lagergren C. R.


1956

Dissert. Abstracts XVI, 54, 240.

Определение $D_0(\text{Co})$ и электр. свойства
улерода изотопов - электронное
удара.

$$D(\text{Co}) = 11.1 \text{ эв.}$$

свойства к атом. C $1.1 \pm 0.2 \text{ эв.}$



C

Lagergren C.R.

1556

Diss. Abst. 1956, 16, 770.

Access.

Microfilm

E-type

Do (co) = 14, 160

93

CO (5)

267-IV

1956

Monigny J.,

J. Chem. Phys., 1956, 25, 54, 487 (англ).

Измерение потенциалов возбуждения
маленькой при помощи тонкого перометра

РЖХ, 1957, No, 33521.

60

✓ Φ

2

(1956)

Palik E.D., Rad K.N.

J. Chem. Phys., 1956, 25, 1174Чисто вращательный спектр CO,
NO и N₂O между 100 и 600 м. $C^{12}O^{16}$ $B_0 = 1,92252$ $D_0 = 6,26 \cdot 10^{-6}$ (JOSA 45, 102)ИК: 20-600 м $\square$ набл. $J=3$ $D_0 \cdot 23$

CO
CH.
1

J. Vincent
Cahiers de Phys., 173, 28-31.
4956

Apparent absorption and real
absorption in the vibration-
rotation spectra of gases

Polymère except CO et
CH₄.

P.D. 60
51.55

CO

Васильевский К.П.,

1956

к-вр. спектр
поглощения

Дуг. и спектр. 1, 587

Качеств.-врем. спектр
поглощения и кинетика
нагрева окиси углерода.

369

1957

$\text{CO}^{16}\text{O}^{18}$ } (ν_i , силовые постоянные)
 N_2O }

Eggers D.F., Arends C.B.

J.Chem.Phys., 1957, 27, N 6,
 1405-1410 (англ.)

Интенсивности в инфракрасном
 спектре $\text{CO}^{16}\text{O}^{18}$ и моменты связей

РХ., 1958, N 12, 38543

10

Hartack P., Dondos S.

1957

Peaking
CO + O₃

J. Chem. Phys., 1957, 26, 1734.

Peaking CO u Ozone.

исследования при 35°, 100°, 180°, 258°

CO

Ommen 3171 1957

C. Herzberg.

(do)

Mem. Soc. Roy. Sci., Lieja
1957, 18, 397-418.

CO ($\Delta E_{vap.}$, ΔS_s) ¹⁴⁻²⁴⁰ 1957

Marcus Rudolph J.

J. Chem. Phys. 1957, 26, N 6,
1765-1766 (mmu.)

Estimation of energies and
entropies of vaporization

PA., 1953, N 5,

13730

6

✓

CO

72

Онака Р.

1957

A'Π
возм.

1V-240A

J. Chem. Phys., 1957, 26, 1763(4)
 Возмущение при $v=6$ A'Π состоя-
 ния CO.

A'Π → X'Σ спектрограф разр. сила 170000
 дисперсия 3,3-3,8 Å/mm

использ 6-13 и 6-14

$$T_{v=6}(A'\Pi) = 74197,44 + 1,46167(j+1)$$

$$T_{v=17}(a'^3\Sigma^+) = 74274,28 + 1,0532 k(k+1)$$

277-IV

CO (Bo, Do, Le, Ve, Be, Be, We, Xe We, Ge We)¹⁹⁵⁷

Rank D.H., Guenther A.H., Saksena G.D.,

Shearer J.H., Wiggins T.A.

J. Opt. Soc. America, 1957, 47, II 8,
686-689 (ana.)

Tertiary in interferometric
wavelength standards for some lines of
the 1-0 band of carbon monoxide. The
velocity of light derived from a band
spectrum method

PX., 1958, 69795

CO

D.H. Rauk, A.H. Guenther,
~~G.D. Salzman, J.W. Shewer,~~
 T.A. Wiggins.

1987

JOEA, 48, 686-9

14-244

Известно, что изобретение 3333333
 2-0 посылка сд при 4260000
 описано, формула 1 part in 197.

LAST

14415

Кроме того изобретение 3-0
 известно. Для анализа. Анализ с.

результаты групп измерений при след. знач.

$$B_0 = 1,922511 \pm 0,0000035 \quad D_0 = 6,117 \cdot 10^{-6} \pm 0,01 \cdot 10^{-6}$$

$$B_2 - B_0 = -0,035908; \quad D_2 - D_0 = -1,9 \cdot 10^{-3}$$

$$B_c = 1,931235; \quad d_c = 0,017535 \quad \gamma_c = 1,01 \cdot 10^{-5}$$

$$\beta_c = -1,0 \cdot 10^{-3} \quad \omega_c = 2169,829; \quad \gamma_c \omega_c = 13,295; \quad \gamma_c \omega_c^2 = 0,0115.$$

Знач. B_0 в сравн с измерен. м.в. сдвинутым
приблиз к знач.

$$C = 299,793,7 \pm 0,7 \text{ км/сек.}$$

CO

1957

Rank D.H., Ynenther A.H., Saksena Y.D., Shearer J.N.,
Wiggins T.A.

J. Opt. Soc. Am, 1957, 47, 686

11-244

Изм. интерферометрически 2-0 и 3-0 порядков
CO с точн. 10^7 . Вместе с резуль. друг. изм. даны
след. знач. погрешностей

$$\omega_e = 2169,829$$

$$B_0 = 1,922521 \pm 0,0000035$$

$$\omega_e x_e = 13,295$$

$$d_0 = 6117 \cdot 10^{-6} \pm 901 \cdot 10^6$$

$$\omega_e y_e = 0,0115$$

$$B_2 - B_0 = ~~1,93~~ - 0,035008$$

$$d_2 - d_0 = -1,9 \cdot 10^{-9}$$

$$B_e = 1,931285$$

$$d_e = 0,017535$$

$$x_e = 1,01 \cdot 10^{-5}$$

$$y_e = -1,0 \cdot 10^{-9}$$

P.A. 1957, 11714, 9065

$$C = 299793,7 \pm 0,7 \frac{\text{км}}{\text{сек}}$$

Bp - 317-1v

1957

Tanaka Y., Jursa G.S., LeBlanc F.

J. Chem. Phys., 1957, 26, 862.

Спектр поглощения CO в ваку-
умной г.-г. области.в спектрах α -X, α' -X, δ -X и ϵ -Xизмерены процессы $(v', 0)$ ($v' = 5, 21, 21$ и 17)и в том же. измер. δ -X $(v', 0)$ и $(v', 1)$ со $v' = 20$ и 13 Нек. данные δ -X, ϵ -X и ϵ -X.возбужденные состояния $D_0(CO) = 11, 111$ и т.Кос. напр. из  симметрия

перевод

Co Y. Tanaka & S. Jurse, 1957
F. LeBlanc B90-317-10

J. Ch. Ph., 26, 862.

Смесь изотопов Co в вакууме
под воздействием

$(E'\Sigma^+, C'\Sigma^+, B'\Sigma^+)$ — $X'\Sigma^+$ излуч.

$A'\Pi - X'\Sigma^+$

a $\Pi_u - X'\Sigma^+$

a' $^3\Sigma^+ - X'\Sigma^+$

d $^3\Pi_u - X'\Sigma^+$

b $^3\Sigma^+ - X'\Sigma^+$

e $^3\Sigma^- - X'\Sigma^+$ излуч.

перевод

CA 51

11850 h

CO

1957

Toennies J. P., Green E. F.

Две точки

J. Chem. Phys., 1957, 27, 981(4).

расстояние

Две точки расстояния CO и N₂

1

по численности атомов в группе

CO

278

-111

по Роулу [J. Chem. Phys., 1957, 26, 655]

N₂

Норматива.

Б. 92

-278

-111

Б. 92-9136-111

1952

✓
 (CO)
 $\frac{1}{2}$
 D_0

Toennies J.P., Green E.F.

J. Chem. Phys., 1957, 26, 655

Энергии диссоциации CO и N_2 ,
 найденные на основании измерений
 отраженной волны.

$$D_0 = 9,76 \text{ (} N_2 \text{)}$$

$$D_0 = 11,1 \text{ (CO)}$$

См. поправку: J. Ch. Ph, 1957, 27, 981



323 - IV

CO, O_2 , NO, Cl_2 , Br_2 , I_2 , HCl, HBr, HI, H_2O , H_2S , I957

CO_2 , SO_2 , CS_2 , N_2O , NO_2 , O_3 , NH_3 , CH_4 , C_2H_6 , CH_3Cl ,

CH_3Br , CH_3I , C_2H_5Cl , C_2H_5Br , C_2H_5I , CH_2Cl_2 ,

$CHCl_3$, CCl_4 , C_2H_4 , C_2Cl_3H , C_2H_2 , CH_3OH , $C_2H_5OH(I)$

Watanabe K.,

J. Chem. Phys., I957, 26, N 3, 542-547 (англ.)

Потенциалы ионизации некоторых молекул.

РЖХ, I957, № 24, 76390.

Вст гр. к.

5598

-IV

1958

SiO_2 , SiC, CO, Si, C, SiC (C)
CO (P)

Baird J.D., Taylor J.
Trans. Faraday Soc., 1958, 54, N 4,
526-533

Reaction ...

M,J

CO

Burrows C. A.,

1958

J. Chem. Phys., 28, 427, 1958

Взвешивание изотопно-очищенного
чистого газообразного окиси CO,
 $\mu = 0,112 \pm 0,005$ D.

Сист.
чистота

CO

11958

Emissivity of the 4.3- μ band of carbon monoxide. Gilbert N. Plass (Aeronutronic Systems, Inc., Glendale, Calif.). *U.S. Dept. Com., Office Tech. Serv., PB Rept 138,860*, 35 pp. (1958).—The spectral emissivity of CO₂ in the 4-5- μ region is calcd. as a function of temp., pressure, and amt. of emitting gas. The elec.-moment matrix element can be calcd. by using the harmonic oscillator approxn. to represent the vibrational states. The emission of the isotopic mol. C¹³O₂ was taken into account. In the choice of a proper model to represent the CO₂ emission, at room temp., the Elsasser model was a good representation of the spectral band, but at higher temps. this was changed to the random Elsasser model as more vibrational bands overlap. At approx. 2000°K. the statistical model was used. The emissivities were calcd. on an electronic computer which took into account up to 890,000 spectral lines at 2400°K. The shift of the emission to lower frequencies as the temp. increased is quant. explained. The emission from any flame in the 4-5- μ region was readily calcd. from the results. K. L. C.

C.A. 1961, 55, 14
16141 Be

~~82~~ IV-227
CO (длина связи, До)

1958

Glockler G.,
J. Phys. Chem., 1958, 62, N 9,
1049-1054 (англ.)

Энергии и длины связей углерода
с кислородом

РХ., 1959, N 8, 26104

М.Ю

1957

$\text{C}=\text{O}$

Sidman J. W.,

J. Chem. Phys., 1957, 27, 429.

спектр
раствора

Электронный спектр и структура
карбонильной группы.

C
CO
—
(20)

Knight H.T., Rink J.-R.

J. Chem. Phys., 1957, 29, 449.

Менюга чов. змєрєжє и змєрєжє
зв'язуємє CO на основаннє рєзульт.

Даннє рєзульт. свєдєннєм змєрєжє волн

Радє етє на основє, що рєзульт
в полєх вимєрєнє

Узрємєнє ΔE_{CO} нєрєрєжє
 $\Delta E_{CO} = 256 \text{ см}^{-1}$ и $\Delta E_{CO}(C) = 170 \text{ см}^{-1}$

1958

CO

Mulliken R.S.

Can. J. Chem., 36, 10 (1958).

На основании данных ряда
 изотопных соединений и флуоресценции,
 что в соединении двойная связь
 имеет 3Δ . Отмечается, что увеличе-
 ние значения $\nu_{\text{C-H}}$ этого соеди-
 нения $\nu_{\text{C-H}}$ необходимо отнести
 к C-H замещению, а
 значения $\nu_{\text{C-H}}$ и $\nu_{\text{C-H}}$ замещения.

CO

G. Milazzo
Metallurgia Ital. 50, 317-18

1958

Синтетические газы
изготавливаются
в химической промышленности.

CA 53
W17
15754 d.

Синтетический газ.
CO в обл. 1725,9 - 1576,7 d

2V-329

1958

H_2O , Cl_2 , HCl , H_2 , N_2 , CO , CO_2 (Cv)

Cl_2 , H_2 , F_2 , Cl_2 , ClF , H_2O (энергия дисс./

Медведев В.А.

Исследование термодинамических
свойств веществ методом взрыва в сферической бомбе

М.физ.хим., 1958, 32, 8, 1851-58

Σ 2 ф.к.

W

E.K. Plyler, H.C. Allen, S.D. Tidwell. 1958

J. Res. NBS 61, 53-6.

Uncertainty in ν_0 to

cm⁻¹. 2,3-25

4000 - 4360 cm⁻¹ (2-3)(3-4)(4-5)(5-6)(6-7)

$$\nu_0 = 1,922511 \pm 0,000025$$

$$\nu_0 = (6,13 \pm 0,02) \cdot 10^{-6}$$

large c



M. B. ... 20 days

$$c = 299,792 \pm 3 \text{ m/s}$$

CA-53, 1959
WZ, 5864a

CO (Be, α e, γ e, De)

286-IV

1958

Rosenblum B., Nethercot A.H., Townes C.H.

Phys. Rev., 1958, 109, 52, 400-412 (англ.)

Изменение масс изотопов, магнитные моменты и знак электрического дипольного момента окиси углерода

РЖФ, 1959, 58, 26171.

10

+2

Co

Rosenblum B., Townes C. H.,
Geschwind S.

1958

Rev. Mod. Phys., 30, 409, 1958

Субмоз.
Упр. Сержа.

CO

Toennies J. P.

1958

Dissert. Abstr., 18, N.2, 423

Исследование термий диссоциации N_2 и CO и ионизации аргона с помощью отраженной ударной волны.

$$D_0(CO) = 11,1 \text{ эВ} \left(256 \frac{\text{ккал}}{\text{моль}} \right)$$

☒

Co

Berkowitz J.

1959

J. Chem. Phys., 30, 858.

Do

Корреляционная связь
гиперконъюнктивных анионов

(cont.)

⊗

III 210

1959

CD

Zascomb J., Pham Van Hung,
Jorien M. Z.

Колебательно-вращатель-
ная структура в спектрах
некоторых простых молекул
в растворе. — Bull. Soc. chim.
France, 1959, n° 7-8, 1175-1180.

р. 1961. 43169

1960

CO

Bernard J. Ransil

Re. Do

ReVs. Mod. Phys., 32, 239

Studies in molecular structure. I.
Scope and summary of the diatomic
molecule program.

Can.

Ch. 2. X

f-1.1

CO

Brion H. Moser C.

1960

молек.
раств.

J. Chem. Phys., 1960, 32, 1194-99

Электронная структура мо-
лекулы углерода

Растворенный в жидком азоте
и в жидком азоте, газе с
экспериментом

Вспышка d- вспышка 25

17-951-007

1960
M J Cowan

Dissert. Abstr., 20, 4139-440, 1960

X M. G. microphallum 6 sp.
0.5-1.5 mm.

H. J. A. L., B. B., J. J. C. W.

CA 54

13862-4

CO (Tm)

201-IV

1960

Clusius K., Presbergen U., Vardé E.

Helv. chim. acta, 1960, 43, N7, 2059-2063 (Krm.)

Ergebnisse der Tieftemperaturforschung. XXXIII. Die
Schmelzkurve von Kohlenoxyd. bis 250 Atm.
und sein Volumensprung am Schmelzpunkt.

PM Krm., 1961,

21534/

5

gp

2

1960

CO

Baton D. R.

1429

ommuck

Canad. J. Phys., 1960, 38, 390

Infrared temperature and
line strength measurements
on carbon monoxide excited
in a radio-frequency discharge.
ge.

ommuck

CO

III-1211-III
Bq - 1121-III

Gustafsson G., Lindholm E. 1960
Arriv Fysik 18, 219-39, 1960.

Ionization and dissociation
of H_2 , N_2 , and CO in charge
exchange collisions with
positive ions.

C.A. 1961.55.18

1722.3i

1722.4a

(Coll. H_2) III

CO

Р.

ВФР-249-11

Р.1961.2

2В77. Электронная структура и энергия связи окиси углерода. Hurley A. C. Electronic structure and binding energy of carbon monoxide, «Revs Mod. Phys.», 1960, 32, № 2, 400—411 (англ.).—Методом валентных связей (ВС) с учетом ионных структур при эксперим. значении межатомного расстояния $R_e = 2,1319$ ат. ед. рассчитана энергия связи D_e и дипольный момент μ окиси углерода. В качестве двухцентровых одноэлектронных ф-ций использовались ортогонализированные (по Шмидту) слейтеровские АО атомов С и О. Эффективные заряды этих АО выбирались из условия минимизации энергий основных состояний $s^2p^4, ^3P$ и $s^2p^2, ^3P$ атомов О и С соответственно. При расчете учитывались только те ВС, которые дают вклад в электронную конфигурацию $\sigma^{10}\pi^4$. Это дало возможность свести вычисление матричных элементов векового определителя (48×48) к расчету определителей (6×6) (число π -структур) и (8×8) (число σ -структур). Вычисленное значение $D_e = 7,50$ эв. Уменьшение числа структур до 23 немного изменяет эту величину (7,45 эв). Указано, что учет всех других структур, дающих вклад в $^1\Sigma^+$ -состояние и возникающих из конфигураций π^2 , π^6 и π^8 , изменил бы энергию менее чем на $\sim 0,1$ эв. Учет межэлектронной корреляции по Моффиту существенно уве-

1960

см.
4/05

личивает D_e , давая для ее нижней границы 11 эв. В соответствии с этим из трех возможных значений энергии диссоциации, полученных спектроскопически (9,28; 9,74; 11,24 эв), по мнению автора, следует принять наибольшее (что согласуется также с термодимич. данными). Рассчитанная величина $\mu = 1,00$ ед. Дебая (метод ВС) и $-0,37$ ед. Дебая (ВС + корреляция Моффита), причем первая правильного знака, но слишком велика, а вторая по абс. величине существенно ближе к эксперим. значению ($\mu_{\text{эксп}} = 0,12$ ед. Дебая), но противоположного знака. Анализ расчета, при котором выясняется очень большой вклад атомного момента С, показывает, что расхождение между теорией и экспериментом связано с большими погрешностями, вводимыми при аппроксимации АО Хартри — Фока слейтеровскими АО.

Е. Пшеничнов

Co

B 9p-249-IV

1960

ЗБ98. Электронная структура и энергия связи окиси углерода. Hurley A. C. Electronic structure and binding energy of carbon monoxide. «Revs Mod. Phys.», 1960, 32, № 2, 400—411 (англ.).—Методом суперпозиции валентных схем рассчитана энергия связи $^1(D)$ молекулы окиси углерода при эксперим. межъядерном расстоянии. Использовались ортогонализированные слейтеровские АО, эффективные заряды которых выбирались из условия минимума энергий основных состояний ($s^2p^4\ ^3P$ и $s^2p^2\ ^3P$) атомов O и C. При расчете учитывались только структуры типа $\sigma^{10}\pi^4$. Вычисленная с учетом 48 (а также 39) структур энергия связи равна

см. н/об

x.1961.3

7,5 эв. Уменьшение числа структур до 23 слабо изменяет эту величину (7,45 эв). Учет всех других структур, дающих вклад в состояние $^1\Sigma^+$ и возникающих из конфигураций $\sigma^{12}\pi^2$, $\sigma^8\pi^6$ и $\sigma^6\pi^8$, изменило бы энергию менее чем на $\sim 0,1$ эв. Учет корреляции электронов по Моффитту существенно увеличивает энергию связи, давая для ее нижней границы 11 эв. В соответствии с этим из трех возможных спектроскопич. значений энергий диссоциации (9,28, 9,74 и 11,24 эв) следует принять наибольшее. Рассчитан также дипольный момент $\mu = 1,00 D$ (без учета корреляции) и $-0,37 D$ (с учетом корреляции по Моффитту). Первая величина имеет правильный знак, но слишком велика, а вторая ближе к эксперим. величине (0,12 D , $C-O^+$), но имеет неверный знак. Отмечается очень большой вклад атомного дипольного момента C ($\sim 3 D$) в μ : расхождение между теорией и экспериментом связано с большими погрешностями, обусловленными использованием слейтеровских АО.

Е. Никитин

1960

2Б49. Факторы Франка — Кондона и r -центроиды для некоторых полос ($A^1\Pi - X^1\Sigma$) четвертой положительной системы CO. Jarman W. R., Ebisuzaki Ruby, Nicholis R. W. Franck-Condon factors and r -centroids for some bands of the CO fourth positive ($A^1\Pi - X^1\Sigma$) band system, «Canad. J. Phys.», 1960, 38, № 3, 510—512 (англ.).— Методом, предложенным ранее (РЖХим, 1955, № 14, 28259), рассчитаны факторы Франка—Кондона $q_{n''n'}$ и элементы r -центроида $r_{q''q'}$ для четвертой положительной системы полос CO, соответствующих спектральной области 1500-2000 Å ($v', v'' < 7$).
Е. Никитин

ж. 1961.2

1960



7Б50: Гибридизация в окиси углерода. Jaffe H. H., Orchin M. Hybridization in carbon monoxide: «Tetrahedron», 1960, 10, № 3—4, 212—214 (англ.).— Проведено качеств. рассмотрение МО в изoeлектронных молекулах N_2 и CO . В молекуле (ось z — линия связи) АО s и p_z имеют одинаковую симметрию и гибридизованы, давая две гибридные σ -орбиты (нижняя σ_1 и верхняя σ_2). В случае N_2 энергии АО обоих атомов одинаковы; неподеленные пары электронов N находятся на орбитах σ_1 , имеющих преимущественно s -характер, а в образовании σ -связи принимают участие σ_2 -орбиты, имеющие преимущественно p -характер. В случае CO АО кислорода лежат ниже соответствующих АО углерода. Поскольку эффективная связь.

Jaffe

см. н/об

ж. 1961. 7

образуется только между АО, близкими по энергии, то σ -связь в молекуле СО образуется из σ_1 -орбиты атома С и σ_2 -орбиты атома О. Неподделенная пара электронов атома О занимает σ_1 -орбиту, имеющую преимущественно s -характер, а неподделенная пара электронов атома С занимает высоколежащую σ_2 -орбиту, имеющую преимущественно p -характер. Последнее объясняет нуклеофильный характер СО. Указано также, что в СО первая свободная МО (π^*) близка по энергии к p_{π} -орбиталям изолированного атома С, но не атома О. Поэтому π^* должна в основном состоять из p_{π} -орбиты атома С, что объясняет способность СО быть акцептором электронов. Полученные результаты согласуются с колич. расчетами N_2 (РЖХим, 1956, № 13, 38639) и СО (РЖХим, 1954, № 12, 30202).

Е. Шусторович

1960

CA

Zaffé H.H., Orchin II.
в Издательстве
оценки —

Tetrahedron, 1960, 10, № 3-4,
212-214.

с. 11, № 2

2.1961. 7550

N_2
 CO

Kohin B.G.

1960

J. Chem. Phys., 1960, 33, N° 3, 882-889.

Молекулярное вращение в
кристаллах N_2 и CO .

х.1961.13
136250



(Cell. N_2) III

CO

1960

- W-269
-) The $1\Sigma^+$ excited states of carbon monoxide. H. Lefebvre-Brion, C. M. Moser (Centre mécanique ondulatoire appliquée, Paris), and R. K. Nesbet. *J. Chem. Phys.* 33, 931-2 (1960).—The addn. of functions from the *M* shell improves the correspondence between theory and expt. for the ultraviolet spectrum of CO much more than does doubling the no. of *L*-shell functions, although doubling the *L* shell gives a significantly greater improvement to the total energy of the ground state.

Henry Leidheiser, Jr.

C.A. 1961-55-8-70276

CO

W-264

x.1961.11

11B54. Возбужденные $^1\Sigma^+$ -состояния окиси углерода. Lefebvre-Brion H., Moser C. M. The $^1\Sigma^+$ excited states of carbon monoxide. «J. Chem. Phys.», 1960, 33, № 3, 931—932 (англ.).—Отмечается непригодность одноконфигурационного приближения метода самосогласованных МО, построенных из АО L -слоя, к рассмотрению высших возбужденных состояний двухатомных молекул элементов второго периода: рассчитанные энергии возбуждения лежат выше энергий ионизации. Рассмотрено 2 возможных пути уточнения метода расчета: 1) использование АО L -слоя с различными экспонентами; 2) использование АО M -слоя. На примере расчета вертикальных энергий возбуждения состояний $B^1\Sigma^+$, $C^1\Sigma^+$ и $E^1\Sigma^+$ молекулы CO (эксперим. значения которых ~ 11 эв) показано, что 1-й путь неэффективен (рассчитанные энергии возбуждения ~ 20 эв). В то же время расчет в 6-конфигурационном приближении с учетом $1s$ -, $2s$ -, $2p$ -, $3s$ - и $3p$ -АО (со слейтеровскими эффективными зарядами) приводит к разумным энергиям возбуждения цифры в скобках — эксперим. значения в эв): $B^1\Sigma^+$ 11,12 (10,78); $C^1\Sigma^+$ 11,78 (11,40); $E^1\Sigma^+$ 13,32 (11,52).

Т. Ребане

1960

CO

Loewenstein, R. V. | 1960

J. Opt. Soc. Am., 50, 1163.

Interferometric spectra of
ammonia and carbon monoxide
in the far infra-
red

(cm. NH_3 , $\bar{\mu}$)

1960

Merriman P., Moser C. M.,

Kestel R. K.,

J. Chem. Phys., 1960, 32, 631

Кислые. Возбужденные электрон-
ные состояния монокислот углерода
 $^3\Sigma^+$, $^3\Pi$, $^3\Sigma^-$ и $^1\Pi$ состояний и их
связи с возбужденными состояниями.

CO, H₂CO, Mould H.M., Price W.C., 1960
H₂CO H₂O. Wilkinson G.R.,
молекулы. Spectrochim. acta, 1960, 16,
постоянные. № 4, 479-492.

Излучение в инфракрасной
области газов, возбужденных
радиочастотным разря-
дом.

Л. 1962.3
36137

1960

CO

Nicholls R. W., Fraser T. B.

Jacmain W. R., McEachron R. P.

Вероятности колебатель-
ных переходов двухатомных
молекул, исходя результатов.
IV. BeO , BO , CN^+ , CO , NO , SH , O_2 , O_2^+ -
Astrophys J., 1960, 131, 12.
399-406

ф. 1961. 2Б106

IV-8576

1960

Спектры

N₂ (CO)

2-ю.

3Н99. Интерпретация распределения интенсивности в системах Лаймана — Бёрджа — Хопфилда N₂ и четвертой положительной системы CO. Nicholls R. W. Interpretation of intensity distributions in the N₂ Lyman — Birge — Hopfield and CO fourth positive band systems. «Nature» (Engl.), 1960, 186, № 4729, 958—959 (англ.). — На основании старых фотографич. данных по распределению интенсивности в полосах системы $a^1\Pi_g^+ - X^1\Sigma_g^+ N_2$ (Birge R. T., Hopfield J. J. «Astrophys. J.», 1928, 68, 257) и $A^1\Pi - X^1\Sigma^+ CO$ (Headrick L. B., Fox G. W. «Phys. Rev.», 1930, 35, 1033) и использования рассчитанных факторов Франка — Кондона и компонент $r_{vv'}$ — центроида для этих переходов показано, что для 19 полос шести прогрессий ($v' = 0 \div 5$) N₂ и 11 полос четырех прогрессий ($v' = 0, 1, 3, 4$) CO дипольный момент перехода можно считать не зависящим от межъядерного расстояния.

Е. Никитин

фр. 1961. 3

CO

(1960)

4В47. Соотношения между порядком, энергией и длиной связи для связей углерод — кислород. Pilar Frank L. Bond-order(bond-length and bond-energy) bond-length relations for carbon-oxygen bonds. «J. Molec. Spectrosc.», 1960, 5, № 1, 72—77 (англ.).—На основании выполненных ранее расчетов порядков связей в фуране, H_2CO , CO_2 , CO и CO^+ , эксперим. длин и энергий связей CO в этих соединениях построены корреляционные диаграммы между порядком, энергией и длиной связи CO . Из этих диаграмм следует, что кислород фурана незначительно участвует в сопряжении и отношение обменных интегралов $\beta_{\text{CO}}/\beta_{\text{CC}}$ порядка 0,1. Такое представление об электронной структуре фурана согласуется с его реакционной способностью.

Е. Никитин

00.1961.64

ω_i (CO_2 , CO, HCl , HBr , NH_3 ,
 C_2H_2 , CH_4 , N_2O , H_2O .)

450-IV I960

Plyler E.K., Danti A., Blaine L.R.,
Tidwell E.D.

J. Res. Nat. Bur. Standards, I960, A64, NI,
29-48 (AH2N.)

Vibrationrotation structure in absorption bands for the calibration of spectrometers from 2 to 16 microns.

PX, I962,
I5I26

to

III-515-28

1960

Richardson James W.

Угнетение борноле-
опышения в неинже ионизу-
лярных средах и ядерная
кварцонная среда в CO,
N₂ и Li₂ - Revs. Mod. Phys.,
1960, 32, v2, 461-465.

ж. 1961. 36107

CO

1960

✓ В779. Влияние N_2 на интенсивность полос CO в тлеющем разряде. Радиков Д. Н., Моспанов В. С. «Научн. ежегодник за 1958 г. Черновицк. ун-т». Черновцы, 1960, 493—494

Экспериментально исследованы изменения относительной интенсивности полос третьей положительной системы спектра излучения CO в тлеющем разряде переменного тока в присутствии различных кол-в N_2 . Исследование проводилось при силе разрядного тока 50 ма и плотности тока $0,1 \text{ а/см}^2$, при постоянном парц. давлении CO 0,2 мм рт. ст. и различных парц. давлениях N_2 0,6; 1,0 и 1,4 мм рт. ст. Интенсивности некоторых полос CO увеличиваются пропорционально парц. давлению N_2 в газовой смеси. По мнению авторов, это можно объяснить только передачей энергии молекулам CO от возбужденных молекул N_2 путем соударений II рода.

Ю. Емельянов

X. 1964.7

1960

КС

СО

5B173. Очень точные длины волн в инфракрасной области. Rank D. H., Skorinko George, Eastmann D. P., Wiggins T. A. Highly precise wavelengths in the infrared. «J. Molec. Spectrosc.», 1960. 4 № 6, 518—533 (англ.).—Критически пересмотрены результаты измерений частот колебательно-вращательных спектров некоторых молекул, сделанных в лаборатории авторов за последние годы. Приводятся значения волн. чисел для вращательных линий полос 001—000, 101—000, 002—000 и 0110—000 молекулы NC^{12}N вплоть до $J = 30$ и полос 2—0 и 1—0 молекулы CO до $J = 51$. Таблицы содержат результаты измерений и частоты, рассчитанные с помощью молекулярных постоянных, определенных из положения линий, наиболее свободных от наложения. Даны соответствующие значения длин волн, измеренные в вакууме и приведенные к стандартной атмосфере. Приведены использованные значения молекулярных констант.

Н. Орлова

ор. 1961. 5

CO

1960

ВЧ
разряд

4B212. Изучение спектра окиси углерода при помощи высокочастотного (33 Мгц) разряда. С. а. о. К. «Бунко кэнкю, Bunko kenkyu, J. Spectroscop. Soc. Japan», 1960, 8, № 3, 145—149 (японск.; рез. англ.).—Применение ВЧ-разряда (33,3 Мгц) позволило получить чистый спектр триплетного состояния молекулы. СО. Частоты наблюдавшихся спектральных линий сравнены с частотами линий, найденных другими авторами.

11-290

рр. 1961. 4

1960

CO

21Б108. Исследование спектра монооксида углерода при возбуждении в разряде с частотой 33 Мгц. Sato Kenzo. «Бунко кэнкю, Bunko kenkyu, J. Spectroscop. Soc. Japan», 1960, 8, № 3, 145—149 (японск.; рез. англ.).—Изучение спектров испускания триплетных полос молекулы CO, возбуждаемых в различных условиях, показало, что характер спектра испускания сильно зависит от условий эксперимента. При использовании в качестве источника возбуждения спектра ВЧ-разряда с частотой 33,3 Мгц. получены спектры триплетных полос CO в широкой области длин волн.

Из резюме автора

IV-290

x. 1961.21

CO

1960

14-290

A study of the spectrum of carbon monoxide by a high-frequency discharge. Kenzo Sato (Univ. Chiba). *Bunko Kenkyu* 8, 145-9(1960).—Fine structure of the CO band of the triplet band series was compared with the aid of various excitation methods. A 33.3-Mc. discharge coming from a quartz oscillator gave a very distinctive spectrum and enabled the measurement in a wide range. Kazuo Saito

C.A.1962.56.13
15057c

СО

1960

Иваннирадзе Р. Р.,
Оганезов К. А.,
Чикладзе Б. З.

Оптика и спектроско-
пия, 8, 452

Изомноженное свечение дис-
посе в экстронно-ко-
лебательных спектрах ме-

Co

1960

Potential energy curves for CO. Irwin Tobias, Robert J. Fallon, and Joseph T. Vanderslice (Univ. of Maryland, College Park). *J. Chem. Phys.* 33, 1638-40(1960).—Potential energy curves for the $X^1\Sigma^+$, $a^3\Pi_r$, $a'^3\Sigma^+$, $d^3\Delta$, $e^3\Sigma^-$, $A^1\Pi$, and $B^1\Sigma^+$ electronic states of the CO mol. were calcd. by the Rydberg-Klein-Rees method (Rydberg, *CA* 26, 2375; Klein, *CA* 26, 5803; Rees, *CA* 42, 1771f). The curve for the $A^1\Pi$ state must bend sharply at 1.9-2.1 Å. or it must pass through a max. in order to reach the proper dissociation limit.

Henry Leidheiser, Jr.

C.A. 1961. 55. 18

17194d

CO

1960

8B44. Кривые потенциальной энергии CO. Tobias Irwin, Fallon Robert J., Vanderslice Joseph T. Potential energy curves for CO. «J. Chem. Phys.», 1960, 33, № 6, 1638—1640 (англ.). — Методом Клейна — Ридберга по эксперим. спектрам молекулы CO определены кривые потенц. энергии электронных термов $X'\Sigma^+$, $a^3\Pi$, $a'^3\Sigma^+$, $d^3\Delta$, $e^3\Sigma'$, $A'\Pi$, $B'\Sigma^+$ (последний из них соответствует диссоциации на возбужденные атомы). При межъядерных расстояниях до $R \sim 2 \text{ \AA}$ терм $A'\Pi$ в исследуемой области R приближается к диссоциационному пределу значительно быстрее других, так что при $R > 2 \text{ \AA}$ соответствующая кривая либо должна круто менять свой ход, либо проходить через максимум.

Е. Никитин

оп. 8.1961

1960

CO
15Б62. Кривые потенциальной энергии молекулы CO. Tobias Irwin, Fallon Robert J., Vandervlice Joseph T. Potential energy curves for CO. «J. Chem. Phys.», 1960, 33, № 6, 1638—1640 (англ.).—Методом Клейна — Ридберга по эксперим. спектрам молекулы CO определены кривые потенциальной энергии для электронных термов $X^1\Sigma^+$, $a^3\Pi$, $a'^3\Sigma^+$, $d^3\Delta$, $e^3\Sigma^-$, $A'\Pi$ и $B'\Sigma^+$ (последний из них соответствует диссоциации на возбужденные атомы) до межъядерного расстояния $R \approx 2A$. Терм $A'\Pi$ в исследуемой области R приближается к диссоциационному пределу значительно быстрее других, так что при $R > 2A$ соответствующая кривая либо должна круто менять свой ход, либо проходить через максимум.
Е. Никитин

2.1961.15

IV-324

1960

Co

2B174. Изучение вращательной температуры полос Ангстрема $^1\Sigma - ^1\Pi$ окиси углерода, испускаемых в полном катоде. Weniger Schame. Étude sur la température de rotation des bandes d'Angström $^1\Sigma - ^1\Pi$ de l'oxyde de carbone, émises dans une cathode creuse, C. r. Acad. sci., 1960, 250, № 11, 2001—2003 (франц.).—Фотографич. путем исследовано распределение интенсивностей вращательных линий в полосах 0—0, 0—1 и 0—2 системы $^1\Sigma - ^1\Pi$ молекулы CO. Исследования производились при обычной т-ре и при т-ре жидкого азота. При обычной т-ре получены значения вращательной т-ры 324; 321 и 315° K, соответственно, для полос 5198; 4511 и 4835 Å (0—2, 0—0, 0—1). При т-ре жидкого азота получены соответственные значения, равные 240; 232 и 232° K. Отмечается, что точки для малых значений J не ложатся на прямую, построенную по большим значениям J , как это было обнаружено ранее другими авторами для OH.
Г. Неуймин

2 ж

сп. 1961.2

1960

CO

Замосочный И.Ф., Килико С.И.

О функциях возбуждения
молекулы азота и окиси
углерода при столкновении
с электронами - Изв. АН ССР,
Сер. физ., 1960, 24, № 9, 953-955.

р. 1961. 20173

(См. N₂) III

210-17

1961

A.P. Al_2 , NO , CO , CO_2 , HCl , SBr ,
 HI , NH_3 ✓

Bornen P.H., Morrison J.D.

J. Chem. Phys., 1961, 35, II 2, 575-58.

(AMM.)

Double and triple ionization in
molecules induced by electron impact.
PI, 1962, 6581.

M, 10

278-IV
HCN, co (Vi, Bi, Di)

1961

Rank D.H., Eastman D.P., Rao B.S.
Wiggins T.S.

J. Opt. Soc. America, 1961, 51,
n. 9, 929-936 (*anal*)

Highly precise wave lengths in
the infrared. II. HCN, N₂O, CO.

PX., 1962, 24 211

1

orig

CO

1961

11-187

19586. Триплетные полосы монооксида углерода: система $e^3\Sigma^- - a^3\Pi$. Barrow R. F. Triplet bands of carbon monoxide: the system $e^3\Sigma^- - a^3\Pi$. «Nature» (Engl.), 1961, 189, № 4763, 480—481 (англ.). — Показано, что триплетная система в области 4270—5430 Å спектра CO, открытая ранее (Herman L., Herman R., «C. r. Acad. sci.», 1947, 225, 230; «J. phys. et radium», 1948, 9, 160) и отнесенная к переходу из состояния $d^3\Pi$ в новое состояние, лежащее около состояния $a^3\Pi$, а на самом деле принадлежит переходу $e^3\Sigma^- - a^3\Pi_r$ и состоит из полос прогрессии $v' - 0$ ($2 \leq v' \leq 7$). В. Юнгман

Оттиск 1172

Р.тс. Кнмшя
1961-19586.

CO

11-187

1961
1172

10B100. Триплетные полосы окиси углерода: система $e^3\Sigma^- - a^3\Pi$. Barrow R. F. Triplet bands of carbon monoxide: the system $e^3\Sigma^- - a^3\Pi$. «Nature» (Engl.), 1961, 189, № 4763, 480—481 (англ.).—Путем сопоставления известных данных о различных системах полос CO показано, что система полос в области 4270—5430 Å, обнаруженная Герман Л. и Герман Р. (Herman L., Herman R. «С. г. Acad. Sci.», 1947, 225, 230; «J. phys. et radium», 1948, 9, 160), в действительности должна быть приписана переходу $e^3\Sigma^- - a^3\Pi$, а не $d^3\Pi - a^3\Pi$, как предполагалось ранее. Г. Неуймин

всп. отщек

ф.10.1961

CO

IV-187; recm. 11/22

1961

Triplet bands of carbon monoxide: the system $e^3\Sigma^- - a^3\Pi$. R. F. Barrow (Univ. Oxford, Engl.). *Nature* 189, 480-1(1961).—The bands previously observed by Herman and Herman for CO (CA 42, 8644f), were identified as being due to the $v'-0$ progression in the transition $e^3\Sigma^- - a^3\Pi$.

P. H. Lewis

C.A.1961.55.14.13045c

CO

BP-278-12

Bank D.H., Eastman D.P.,
Rao B.S., Wiggins T.F.

1961

"J. Opt. Soc. America", 1961, 51,
no. 9, 929.

Длины волн высокой мощ-
ности в инфракрасной об-
ласти. II. HCl , H_2O и CO .
(см. HCl)

CO

Вар-7656-IV

1961

24Б209. Инфракрасный спектр твердой монооксида углерода. Ewing George E., Pimentel George C. Infrared spectrum of solid carbon monoxide. «J. Chem. Phys.», 1961, 35, № 3, 925—930 (англ.).—В ИК-спектре поглощения твердой СО при 20° К наблюдались резкие полосы (в см^{-1}) 2088,4; 2092,2; 2112,3; 2138,1 и 4253,5, отнесенные к основным частотам $\text{C}^{12}\text{O}^{18}$, $\text{C}^{13}\text{O}^{16}$, $\text{C}^{12}\text{O}^{17}$, $\text{C}^{12}\text{O}^{16}$ и первому обертону $\text{C}^{12}\text{O}^{16}$ соответственно, а также широкая полоса 2208 см^{-1} , состоящая, по-видимому, из нескольких полос, соответствующих комбинациям основного колебания СО с поступательными и либрационными движениями кристаллич. решетки. Отмечается удовлетворительное согласие (за исключением $\text{C}^{12}\text{O}^{16}$) эксперим. и вычисленных по теории Букингэма (РЖ-Хим, 1961, 12Б128) величин сдвига основных частот изотопных молекул СО в твердом состоянии по сравнению с газом.

В. Юнгман

2.1962.24.

CO

Fineman M. A., Petrocelli A. W. 1561

Planet. Space Sci, 1961, 3, 187.

Исследования молекул
с помощью аппарата
лозы для электрического
удара.

(см. методика измере-
ний потенциала
ионизации)

1961.

CO

молек.

расст.

переход.

кривых

11-2622

Lefebvre-Brion H., Moser C. M.,

Nesbet R. K.,

J. Chem. Phys., 1961, 34, 1950 (16)

Рассчитаны кривые поглощения энергии некоторых электронных переходов моноксида углерода.

Отмечается, что $d^3\Pi$ состояние принадлежит d^3A ; возможно, что имеется еще одно $d^3\Pi$ состояние.

W-262a

A calculation of the potential-energy curves for some electronic states of carbon monoxide. Hélène Lefebvre-Brion, C. M. Moser (Centre mécanique ondulatoire appliquée, Paris), and R. K. Nesbet. *J. Chem. Phys.* 34, 1950-7 (1961).—The L.C.A.O-M.O.-S.C.F. orbitals for the $1\Sigma^+$ ground state of CO constructed from $1s$, $2s$, and $2p$ atomic functions, have been calcd. for 11 internuclear distances between 1.5 and 4.0 at. units. By using the unoccupied S.C.F. orbitals a number of lower excited states have been calcd. The equil. distances, force consts., and ν_{00} energies have been calcd. from the curves of E vs. R for these various states. As these calculated curves do not separate at infinity into the atoms in their proper spectroscopic states, configuration interaction has been carried out with functions which cross the computed curves and separate into the atoms in their 3P states.

P. M. B.

C.A. 1961.55.20
194564

11961

5Б22. Расчет кривых потенциальной энергии некоторых электронных состояний окиси углерода. LeFebvre-Brion Hélène, Moser C. M., Nesbet R. K. A calculation of the potential energy curves for some electronic states of carbon monoxide. «J. Chem. Phys.», 1961, 34, № 6, 1950—1957 (англ.).—В рамках метода самосогласованных МО ЛКАО рассчитаны кривые потенциальной энергии молекулы СО для ряда электронных состояний в интервале межъядерных расстояний $1,50 < R < 4$ ат. ед. Однодетерминантные волновые функции строились из слейтеровских $1s$ -, $2s$ - и $2p$ -АО, орбитальные экспоненты которых считались не зависящими от R и равными величинам, минимизирующим энергию разделенных атомов (5,67, 1,67 и 1,57 для С и 7,66, 2,25 и 2,23 для О). При больших межъядерных расстояниях учитывалось взаимодействие тех конфигураций, потенциальные термы которых пересекались. Таким путем удавалось правильно передать корреляцию состояний при диссоциации. Рассчитанные величины силовых констант k и энергий переходов $0-0$ для состояний $X^1\Sigma + a^3\Pi$, $a'^3\Sigma +$, $c^3\Sigma -$, $A'\Pi$ несколько уменьшаются при учете взаимодействия конфигураций, приближаясь к эксперим. значениям. Существен-

сч. н/д

X. 1962.5

CO
11-262a

но, что энергии переходов $\nu(0-0)$, вычисленные даже в одноконфигурационном приближении и равные для указанных выше состояний 5,13, 4,70, 6,62 и 7,59 эв (экспериментальные 6,04, 6,92, 8,10, 8,07 эв), подтверждают проведенную ранее интерпретацию электронного спектра СО. Кроме того, величины ν_{00} и k для состояния ${}^3\Delta$ с той же точностью совпадают с эксперим. параметрами состояния d , симметрия которого (${}^3\Pi$ или ${}^3\Delta$) не была твердо установлена. Термы других рассчитанных состояний ($b^3\Sigma^+$, $B^1\Sigma^+$, $C^1\Sigma^+$, $F^1\Pi$) существенно отличаются от эксперим. величин, что связано, по-видимому, с весьма ограниченным базисом использованных АО. Рассчитанные полные энергии СО во всех состояниях примерно на 1 ат. ед. превышают эксперим. величины. Наибольшее различие в ходе теоретич. и эксперим. термов наблюдается в случае малых (или отрицательных) энергий связи, что обусловлено весьма ограниченным учетом взаимодействия конфигураций.

Е. Никитин

CO

У-8

1961

5 В81. Ультрафиолетовый спектр молекулы окиси углерода. Lefebvre-Brisq Н., Moser Carl. Ultraviolet spectra of carbon monoxide. «J. Chem. Phys.», 1961, 35, № 5, 1702—1707 (англ.)

Вычислены вертикальные энергии возбуждения для 14 электронных переходов в УФ спектре СО. В расчете использовались самосогласованные МО ЛКАО, построенные из трех различных наборов базисных АО на каждом центре: (I) $1s, 2s, 2s', 2p$ и $2p'$; (II) $1s, 2s, 2p, 3s, 3p$ и (III) $1s, 2s, 2s', 2p, 2p', 3s, 3p$. При наличии программы счета коэф. ЛКАО, матричных элементов основных и самосогласованных операторов и всех

РЖСР 1962

5 В 81

См. на обороте.



2-электронных интегралов расчет типа III на IBM 704 требовал ~ 5 час. Для всех расчетов табулированы значения орбитальных экспонент, коэф. ЛКАО, энергии возбужденных состояний и полные энергии. Уже результаты расчета II хорошо согласуются с опытом (данные расчета I почти не отличаются от результатов Бриона и Мозера (РЖФиз, 1961, 1В43)). Указывается, что вычисления подтвердили классификацию электронных переходов в СО, данную ранее Маллиkenом и заключающуюся в разделении всех переходов на два класса: переходы между МО, построенными в основном из АО L-оболочки ($n=2$), и переходы между МО, нижняя из которых построена из L-АО, а верхняя — из M-АО ($n=3$). Приходится таблица чисел k электронов в M-оболочке (по данным атомных заселенностей) для изученных возбужденных состояний, из которой видно, что все состояния делятся на два класса: с $k \sim 0,2$ (6 состояний) и с $k \sim 1,2$ (7 состояний). Результаты расчета III хорошо согласуются с энергией основного состояния и вполне удовлетворительно — с энергиями обоих типов возбужденных состояний (при этом для класса с $k \sim 1,2$ несколько хуже).

В. Быховский

1961

12 Б63. Ультрафиолетовый спектр молекулы окиси углерода. Lefebvre-Brion H., Moser Carl. Ultraviolet spectra of carbon monoxide. «J. Chem. Phys.», 1961, 35, № 5, 1702—1707 (англ.)

CO

УФ спектр

Вычислены вертикальные энергии возбуждения для 14 электронных переходов в УФ-спектре CO. В расчете использовались самосогласованные МО ЛКАО, построенные из трех различных наборов базисных АО на каждом центре: 1) $1s, 2s, 2s', 2p$ и $2p'$; 2) $1s, 2s, 2p, 3s, 3p$ и 3) $1s, 2s, 2s', 2p, 2p', 3s, 3p$. При наличии программы счета коэф. ЛКАО, матричных элементов основных и самосогласованных операторов и всех 2-электронных интегралов расчет типа 3 на IBM 704 требовал ~5 час. Для всех расчетов табулированы значения орбитальных экспонент, коэф. ЛКАО, энергии возбужденных состояний и полные энергии. Уже результаты расчета 2 хорошо согласуются с опытом (данные расчета 1 почти не отличаются от результатов Бриона и Мозера). Указывается, что вычисления

X.1969.12

подтвердили классификацию электронных переходов в СО, данную ранее Малликем и заключающуюся в разделении всех переходов на два класса: переходы между МО, построенными в основном из АО L -оболочки ($n = 2$), и переходы между МО, нижняя из которых построена из L -АО, а верхняя — из M -АО ($n = 3$). Приводится таблица чисел K -электронов в M -оболочке (по данным атомных заселенностей) для изученных возбужденных состояний, из которой видно, что все состояния делятся на два класса: с $k \approx 0,2$ (6 состояний) и с $k \approx 1,2$ (7 состояний). Результаты расчета 3 хорошо согласуются с энергией основного состояния и вполне удовлетворительно — с энергиями обоих типов возбужденных состояний (при этом для класса с $k \approx 1,2$ несколько хуже). В. Быховский

CO

269a-IV; 269-IV

1961

24Б212. Инфракрасные спектры монооксида углерода в твердом состоянии и в матрицах. Maki Arthur G. Infrared spectra of carbon monoxide as a solid and in solid matrices. «J. Chem. Phys.», 1961, 35, № 3, 931—935 (англ.).—Выполнено исследование ИК-спектра поглощения CO в матрицах N_2 , Ar и CH_4 , а также свободной CO при T -рах порядка $20^\circ K$ в области основной частоты и первого обертона. Наблюдавшиеся полосы отнесены к различным изотопным молекулам CO и показано, что соотношения между колебательными постоянными изотопных молекул, имеющие место для молекул газа, остаются справедливыми в случае разб. твердых р-ров. В. Юнгман

X. 1962. 24.

CO

269A-IV; Bq-269-IV

11961

U.K.

Infrared spectra of carbon monoxide as a solid and in solid matrixes. Arthur G. Maki (Natl. Bur. of Standards, Washington, D.C.). *J. Chem. Phys.* 35, 931-5(1961).— The fundamental infrared absorption frequencies of several isotopes of CO were observed in solid CO and in the solid matrixes N, Ar, and CH₄. The overtone was also measured in solid CO. Frequency shifts due to isotopic substitution in the solid state follow the formulas developed for the gas phase only when mols. of the same isotopic species are not adjacent to each other, i.e., only in dil. solns.

Henry Leidheiser, Jr.

C.A. 1962, 56, 9
9591d

CO

Rank D.H., Eastman D.P.,
Rao B.S., Wiggins T.A.

1961

Spectrochim. Acta, 1961, 17, 1124.

Инспекционные газы в атмосфере
в, их абс.: HCl , H_2O и CO .

CO
CH₄
C₂H₂
H₂O

1961
1 Д266. Некоторые результаты измерений в ИК-области спектра с новым прибором высокого разрешения. Rath G. Einige Ergebnisse von Messungen im Infrarot mit einem neuen Gerät höchster Auflösung. «Instrum. and Measur. Vol. I». New York — London, Acad. Press, 1961, 489—497 (нем.)

Приведены некоторые результаты измерений ИК-спектров с высоким разрешением, проведенные на коммерческом спектрофотометре IR-7 фирмы Beckman IR-7 — двойной монохроматор с призмой предварительного разложения из NaCl и дифракционной решеткой. Теоретич. разрешающая способность (РС) прибора $\nu/\Delta\nu_{\text{миним}}$ при $\nu=1000 \text{ см}^{-1}$ (1 порядок) равна 3300, что соответствует разрешению $\sim 0,3 \text{ см}^{-1}$. Практич. РС несколько меньше, но значительно превосходит теоретич. РС $\nu/\Delta\nu_{\text{миним}} = 1000$ прибора IR-4. На примере спектров молекул газов с различной симметрией (ν в см^{-1}): CO ($\nu=2140$), CH₄ ($\nu_3=3018$), C₂H₂ ($\nu_5=730$, $\nu_4+\nu_5=1328$, $\nu_3=3287$) и H₂O ($\nu_2=1595$) обсуждены возможности решения ряда структурных и теоретич. вопросов. Указывается, что высокая РС прибора позволяет проводить точные измерения интенсивностей полос поглощения жидкостей. Высокие

4.1.14.1
ф. 1963. 1А.

ссылка
на ф. 1963

эксплуатационные качества прибора делают возможным также его применение для точных качеств. и количеств. рутинных анализов.

А. Александров



СО

5Б71. Относительные интенсивности полос триплетной системы СО. Singh N. L., Jain D. C. Relative intensities in the triplet system of CO bands. «Proc. Phys. Soc.», 1961, 77, № 3, 817—818. (англ.).—Методом численного интегрирования (РЖХим, 1960, № 23, 91260) с использованием волновых функций Морзе вычислены интегралы перекрывания для триплетных полос СО в широком интервале длин волн (4580—12 090 Å). На основании полученных данных найдены относительные интенсивности полос в предположении одинаковой заселенности всех колебательных уровней верхнего состояния, т. е. что $T \rightarrow \infty$. Для сравнения приведены относительные интенсивности, вычисленные Пиллоу и Роулаттом (РЖХим, 1960, № 14, 55914) по методу Пиллоу (Pillow M. E., «Proc. Phys. Soc.», 1951. A64. 772). В. Юнгман

-X-

1962.5

2
 (CO, CS)
 рачет
 м.в.

2 В91. Определение энергии диссоциации двухатомных молекул из микроволновых вращательных спектров. Wesselago V. G. Bestimmung der Dissoziationsenergie zweiatomiger Moleküle aus Mikrowellen-Rotationsspektran. «Hochfrequenzspektroskopie». Berlin, Akad. Verl., 1961, 228—230 (нем.).

Используя ф-цию Морзе для двухатомной молекулы выведена ф-ла для зависимости межатомного расстояния в двухатомной молекуле от времени. Эта ф-ла применена для вычисления усредненного за период колебания значения вращательной постоянной B_v . Ф-ла для среднего значения B_v содержит энергию диссоциации D . Сопоставление двух таких ф-л для двух изотопич. молекул позволяет выразить D через средние значения B_v и другие известные постоянные обеих молекул. Значения B_v для молекул CO и CS известны из микроволн. спектров этих в-в, и для D получены значения 9,0 и 6,9 эв.

М. Ковнер

ф. 1962. 2л

20(10)

I96I

Wesselago V.G.

Hochfrequenzspektroskopie, I96I, 228

Определение энергии диссоциации
двухатомных молекул из микроволно-
вых вращательных спектров.

CO

3 Д192. Интенсивности, ширины и формы линий в колебательно-вращательной полосе CO. Benedict William S., Herman Robert, Moore Gordon E., Silverman Shirleigh. The strengths, widths, and shapes of lines in the vibration-rotation bands of CO. «Astrophys. J.», 1962, 135, № 1, 277—297 (англ.)

Описанные ранее авторами методы применены для определения интенсивностей («сил») и ширины линий в основной колебательно-вращательной полосе CO. Пользуясь точно измеренными ранее значениями частот линий 1—0 полосы $C^{12}O^{16}$, определены частоты отдельных линий 2—1 полосы $C^{12}O^{16}$ и 1—0 полос изотопич. молекул $C^{13}O^{16}$, $C^{12}O^{18}$ и $C^{13}O^{18}$. Ряд спектров CO в области 1900—2200 cm^{-1} получен в излучении CO—O₂ и других пламен. Определены значения частот большинства линий 2—1, 3—2, 4—3, 5—4 и 6—5 полос $C^{12}O^{16}$. Отмечается, что наблюдаемые положения линий для $C^{12}O^{16}$ и других изотопич. молекул CO прекрасно согласуются с вычисленными на основе молекулярных постоянных, определенных Гольдбергом и Мюллером. Интенсивности и ширины линий определены по методу «кривой роста». Общая интенсивность 1—0 полосы CO, полученная непосредственным суммированием интенсивностей всех линий, равна 214,8 $cm^{-2} at^{-1}$ при 300° K и находится в хо-

1962

ф. 1963. 30

Сое
Мед

рошем согласии с результатами других исследований. Полученные значения интенсивностей линий 1—0 полосы хорошо согласуются с вычисленными по ф-ле жесткого ротатора, что указывает на малое влияние колебательно-вращательного взаимодействия на относит. интенсивность линий этой полосы. Вычислены также значения интенсивностей линий 2—1 полосы молекулы $\text{C}^{16}\text{O}^{32}$ и 1—0 полос изотопич. молекул. Измеренные для отдельных линий этих полос интенсивности согласуются с вычисленными в пределах $\pm 20\%$. Найденные значения для полуширин линий 1—0 полосы показывают постоянное их уменьшение с ростом вращательного квантового числа $|m|$, начиная от значения $0,085 \text{ см}^{-1} \text{ ат}^{-1}$ для линии с $|m|=1$ до $0,038 \text{ см}^{-1} \text{ ат}^{-1}$ для линии с $|m|=30$. Диаметр оптич. столкновений соответственно уменьшается от $5,5 \text{ \AA}$ до значения $3,7 \text{ \AA}$ (равного газокинетич. диаметру). Получено экспериментально среднее значение интенсивности 2—0 полосы, равное $1,5 \pm 0,3 \text{ см}^{-2} \text{ ат}^{-1}$. Вычисленные значения полуширин линий для полосы 2—0 совпадают с полуширинами соответствующих линий в 1—0 полосе. Из измерений пропускания в промежутках между линиями установлено, что при частотах, отстоящих больше чем на 4 см^{-1} от центров линий, поглощение будет меньше, чем ожидаемое для линий лорентцовской формы. Библи. 31 назв. К. Василевский

CO
спектр

1962
2 Д148. Структура триплетных полос CO. Саг-
goll P. K. Structure of the triplet bands of CO.
«J. Chem. Phys.», 1962, 36, № 11, 2861—2869 (англ.)

Получен при высоком разрешении спектр полосы
3—0 системы «триплетных» полос CO и произведен вра-
щательный анализ. Показано, что верхнее состояние яв-
ляется $^3\Delta$ -состоянием, а не $^3\Pi$ -состоянием, как считалось
ранее. Такое отождествление соответствует предска-
занию теории электронных конфигураций. Изучена спино-
вая структура $^3\Delta$ -состояния и обсуждено распределение
интенсивностей в ветвях. Приведены уточненные констан-
ты $^3\Delta$ -состояния.

ф. 1963. 28

1962

CO

Carroll P. K.

 $d^3\Delta$ J. Chem. Phys., 1962, 36, 2861исполн.
исполн.

Структура приращенных колеб CO.

Верхнее состояние приращенных колеб 3Δ , а не 3Π , как считалось ранее.

Параметры $d^3\Delta$ -колебания (cm^{-1}):

$$\nu_e = 1,3099; \nu_e = 0,01687; \nu_e = 5,8 \cdot 10^{-6}; \nu_e = 7,0 \cdot 10^{-7}, \nu_e = \text{[hole]}, \nu_e = 15,6$$

CO

1962

4Б74. Структура триплетных полос CO. Carroll P. K. Structure of the triplet bands of CO. «J. Chem. Phys.», 1962, 36, № 11, 2861—2869 (англ.)

Полоса 3,0 триплетной серии CO сфотографирована в излучении при высоком разрешении (разряд переменного тока; в поток гелия добавлены следы CO). Обнаруженная структура полностью согласуется с трактовкой перехода как $^3\Delta \rightarrow ^3\Pi$, причем состояние $^3\Delta$ является обращенным и приближается к случаю *a* связи при малых *j* и к случаю *b* — при больших *j*. Этот результат согласуется с выводами теории электронной конфигурации и опровергает прежнюю трактовку перехода ($^3\Pi - ^3\Pi$). Подробно рассматривается распределение интенсивностей в ветвях полосы, а также величина спинowego расщепления. Приведены уточненные мол. константы для верхнего состояния.

В. Дпанов-Клоков

X-1963-4.

CO

1962

Structure of the triplet bands of CO. P. K. Carroll (Univ. of Chicago). *J. Chem. Phys.* 36, 2861-9(1962). The 3-0 band of the CO triplet system was photographed under high resolution and a rotational analysis was carried out. The upper state is $^3\Delta$, in agreement with the electron configuration theory, and not $^3\Pi$. The spin structure in the $^3\Delta$ state was studied and the intensity distribution in the branches was discussed. Revised consts. for the $d^3\Delta$ state were given.
Henry Leidheiser, Jr.

CA. 1962.57.9

10662

7

7482 — 12

CO, N₂O, H₂O, N₂O₂, CH₃D, ClO₃F (S) 1962

Chipman J.,
Pure Appl.Chem., 1962, 5, 669-82
Molben metals, slags, and ...

CA., 1963, 58, N 6,
5106a

File Opened

1962

CO

Collins J. E.

"Canad. J. Chem."

1962, 40, N 11, 2172-75

noting

from

BP-5178-1

(see HF⁺; III)

M 1912

CO, CO⁺ (A.P., J)

Cunthbert J., Farren J., Rao B.S.P.,
Preece E.R.

Proc.Phys. Soc., 1966, 88, N 1, 91-100
Appearance potentials and transition
probabilities for electron impact
ionization of CO and CO⁺

J

F

PF., 1967, 5D138

CO

спектр в
континууме

Dressler K.

1962

J. Quantit. Spectrosc. and
Radiat. Transfer., 1962, 2,
683.

Абсорбционная спектрос-
копия конденсированных
газов при низких T -рах

(см. H_2O)

№. 1263.9A.

CO

Юр-208-IV

1962

5 Д63. $I^1\Sigma^-$ -Состояние окиси углерода. Deutsch J. L., Barrow R. F. The state $I^1\Sigma^-$ of carbon monoxide. «Proc. Phys. Soc.», 1962, 80, № 2, 561—563 (англ.)

На основании вращательных возмущений между состояниями $A^1\Pi$ и $I^1\Sigma^-$ в молекуле CO определены спектроскопич. постоянные последнего состояния: $G_v = 1044,8 \pm 5(v + 1/2) - 9,5 \pm 0,5(v + 1/2)^2$, $B_v = 1,217 \pm 0,01 - 0,018 \pm 0,002(v + 1/2)$ $T_{00} = 66678 \pm 10$; все величины в см^{-1} .
В. Быховский

90.1963.50

CO

ВФ-208-IV

1962

6Б69. Состояние $1\Sigma^-$ окиси углерода. Deutsch J. L., Barrow R. F. The state $1\Sigma^-$ of carbon monoxide. «Proc. Phys. Soc.», 1962, 80, № 2, 561—563 (англ.)

На основании вращательных возмущений в возбужденном электронном состоянии $A^1\Pi$, $v=2$, окиси углерода определены спектроскопич. константы близлежащего электронного состояния $1\Sigma^-$, возникающего из конфигурации $\pi^3\sigma^2\pi^*$. Колебательные термы, вращательная константа и энергия 0—0-перехода в это состояние равны (в см^{-1}) $G_v = 1044,8 \pm 5(v + 1/2) - 9,5$, $B_v = 1,217 \pm 0,01 - 0,018 \pm 0,002 (v + 1/2)$; $T_{00} = 66\,678 \pm 10$.
Е. Никитин

X. 1963.6

CO

11962

18Б39. Исследование CO методом электронного удара с использованием прибора Лозье. Fineman Morton A., Petrocelli Americo W. Electron impact study of CO using a Lozier apparatus. «J. Chem. Phys.», 1962, 36, № 1, 25—32 (англ.).—На приборе типа Лозье, использующем тормозящее электрич. поле для анализа ионов по начальным кинетич. энергиям, исследованы процессы, происходящие при электронной бомбардировке молекул CO. Ионизация производилась электронами, монохроматизированными методом разностей задерживающих потенциалов Фокса. Зарегистрированы кривые эффективности ионизации как для положительных, так и для отрицательных ионов. В отличие от более ранних исследований CO, авторами обнаружены ионы C^+ , образующиеся при пороговой энергии электронов $22,57 \pm 0,20$ эв, и O^+ , образующиеся при пороговой энергии $24,78 \pm 0,23$ эв. Опираясь только на собственные результаты, авторы рассчитали энергию диссоциации $D(CO)$ (их значение согласуется с 11,11 эв) и сродство атома O к электрону (согласуется с величиной 1,465 эв). Расчеты авторов, осно-

ж. 1962. 18

см. м. 05.

ванные на двух системах потенциалов появления различных ионов, приводят к двум значениям сродства к электрону атома С (1,34 и 1,74 эв). Анализ литературных данных позволяет принять меньшее из этих значений.

Е. Франкевич



CO

1962

7 В47. Изучение СО методом электронного удара на аппарате Лозье. Fineman Morton A., Petrocelli Americo W. Electron impact study of CO using a Lozier apparatus. «J. Chem. Phys.», 1962, 36, №1, 25—32 (англ.)

Методом электронного удара на масс-спектрометрич. приборе Лозье (РЖФиз, 1961, 12В99) проведено детальное исследование молекулы СО. Найденные потенциалы появления (ПП) ионов C^- , C^+ , O^- и O^+ хорошо согласуются с известными данными, если для калибровки шкалы энергии электронов используется ПП CO^+ , равный 14,01 эв. Вычисленные по этим значениям ПП энер-

См. на обороте

РЖФ 1962

7В47

гия диссоциации CO и сродство к электрону кислорода оказались равными $11,23 \pm 0,13$ эв и $1,70 \pm 0,22$ эв соответственно. В предположении, что в процессе диссоциации на два иона C⁻ находится в основном электронном состоянии и что сродство к электрону тем больше, чем более электроотрицателен элемент, сродство к электрону углерода оказалось в пределах 1,32—1,76 эв, причем меньшее значение ближе подходит к результатам других независимых расчетов. Отмечается, что реакцию образования C⁺ с ПП 22,57 эв можно трактовать как обычный процесс диссоциативной ионизации: $CO + e^- = C^+ + O + 2e^-$, а не как процесс двухступенчатой автоионизации.

Ю. Беляев

1962

D₀(CO)

A(O)

A(C)

Electron impact study of CO using a Lozier apparatus. Morton A. Fineman and Americo W. Petrocelli (Providence Coll., Providence, R. I.). *J. Chem. Phys.* 36, 25-32 (1962). A Lozier app. modified in that a quasimonoenergetic electron beam is used, was employed to study CO. Ionization efficiency curves for both pos. and neg. ions were collected. A detailed treatment of these data gives the ions produced, the appearance potentials for ions formed with zero kinetic energy, the processes in which they were produced, and the states of excitation of the fragments formed. The dissocn. energy of CO and the electron affinity of oxygen were detd., in agreement within exptl. error with the spectroscopic value of $D(\text{CO})$ 11.11 e.v. and electron photodetachment value for $EA(\text{O})$ of 1.465 e.v. By using the accepted values for $D(\text{CO})$ and $EA(\text{O})$, the electron affinity of C was detd. from 2 different sets of data to be between 1.34 and 1.74 e.v. The lower value is in better agreement with other exptl. detns. and with most of the recent empirical calcs. for the $EA(\text{C})$. CA

C. A. 1962-57. 4

4190ab

CO

Frada S., Kausil B. M.

1962

МФР. 1108

У. Спен. Phys., 1962, 36, N5, 1124-
- 1142

расч.

11-11-98

Изучение строения молекулы.

VIII. Ограниченное конфигурацион-
ное взаимодействие для нубран-
ных двухатомных молекулы
первого ряда.



X. 1963.24

CO

~~Exp-203-117~~

1962

) Infrared spectra of liquid and solid carbon monoxide. George E. Ewing (California Inst. of Technol., Pasadena). *J. Chem. Phys.* 37, 2250-6(1962). A low-temp. cell suitable for the study of infrared spectra of pure liquids in the fundamental region is described. Selection rules are derived, based on the assumption that diat. mols. in the liquid state can undergo hindered rotation. The infrared absorption band shape is predicted to resemble the *P*- and *R*-branch envelope of the gas-phase mol. in the wings, but to have an intense *Q* branch at the band center. The observed spectra of CO as a liquid is in reasonable agreement with these selection rules. A considerable fraction of mols. in the liquid state can undergo nearly free rotation. The spectrum of CO just below its f.p. suggests that the rotatory motion of the mols. in the solid can best be described as librational. CA

C.A. 1963. 58. 1.

152 f

CO

Groth W., Pessara W

1962

"Z. phys. Chem" (BRD), 1962, 32,
N 3-4, 192-211 (нем.)

Фотониконическое исследование
вращений в муравьиной
Ж-область спектра. Г.Н.

Фотониконическое исследование
разно-  H_2 и CO под

действительный свет резонанс-
ных линий кванта и
криптона. (см. №2) III

1962

оттиск 1039

4 Д217. Молекулярные спектры в вакуумной УФ-области. Herzberg G. Molecular spectra in the vacuum ultraviolet. «Advances Molec. Spectrosc. Vol. 1». Oxford — London—New York—Paris, Pergamon Press, 1962, 29—33 (англ.)

Кратко изложены результаты обширной программы исследований электронных спектров молекул в вакуумной УФ-области, проводимых в лаборатории автора. Для двухатомных молекул заново изучены полосы Лаймана ($B^1\Sigma_u^+ - X^1\Sigma_g^+$) молекулярного водорода; определен предел непрерывного поглощения водорода, дающий наиболее точное значение энергии диссоциации водорода, равное $(36113,0 \pm 0,3)$ см⁻¹; в спектре поглощения СО обнаружены новые запрещенные переходы и установлена их природа ($^3\Sigma^+ - ^1\Sigma^+$, $^3\Sigma^- - ^1\Sigma^+$, $^3\Delta - ^1\Sigma^+$); установлено несколько высоко возбужденных состояний СН. Изучены спектры поглощения стабильных многоатомных молекул HCN, CF₃J, CH₂N₂; обнаружено, что очень часто симметрия молекулы в возбужденном состоянии отлична

ф. 1963. 4А

См. и/об.

CO

CH

HCN

CF₃JCH₂CH₃

(6)

от основного состояния. В этой же области исследованы спектры поглощения свободных многоатомных радикалов CH_3 , CH_2 и их дейтерозамещенных; определены структура и молекулярные константы радикалов.

Ф. Ортенберг

CO

1 12 Б174. Дипольные моменты возбужденных электронных состояний. Возможные значения для CO и CO⁺. Korelman Raoul, Klemperer William. Dipole moments of excited electronic states: possible values for CO and CO⁺. «J. Chem. Phys.», 1962, 36, № 6, 1693—1694 (англ.)

Из полос Ангстрема в спектре CO и полос, наблюдаемых в спектрах кометных хвостов и относящихся к CO⁺, получены следующие значения для дипольных моментов в различных состояниях этих молекул: CO $X^1\Sigma$ $0,112 \pm 0,005$, $A'^1\Pi$ $0,08 \pm 0,08$, $B^1\Sigma$ $0,15 \pm 0,15$ D; CO⁺ $X^2\Sigma$ $0,1 \pm 0,1$, $A^2\Pi$ $0,1 \pm 0,1$ D. Столь низкие значения, по мнению автора, трудно объяснить. М. Ковнер

X. 1964.12

C.O; CS; OCS ($\mu, \angle$) $\rightarrow$ 11-260

1962

Laurie Victor W., Herschbach Dudley R.

The determination of molecular
structure from rotational spectra.

"Internat Sympos. Molec. Struct. and
Spectrosc. Tokyo. 1962". S.1., S.A.,
C309/1-C309/4 (ann.)

Rp., 1963, 4D156

10

60

4 Д81. Последние достижения в расчете возбужденных состояний двухатомных молекул. Lefebvre-Brion H., Moser C. M., Nesbet R. K., Yamazaki M. Recent developments in the calculation of the excited states of diatomic molecules. «Internat. Sympos. Molec. Struct. and Spectrosc. Tokyo, 1962». S. 1., s. a., B118/1 — B118/3 (англ.)

Обычным методом МО ЛКАО с ограниченным учетом конфигурац. взаимодействия при привлечении в качестве АО $1s$ -, $2s$ -, $2p$ -, $3s$ - и $3p$ -атомных ф-ций Слейтера рассчитаны волн. ф-ции $B^1\Sigma^+$, $c^1\Sigma^+$, $E^1\Sigma^+$, $b^3\Sigma^+$, $c^3\Sigma^+$, $F^1\pi$, $G^1\pi$ и $^3\pi(b)$ возбужденных состояний молекулы CO. Результаты расчета основного $X^1\Sigma^+$ -состояния и техника вычислений были опубликованы ранее (РЖФиз, 1962, 1Е151). С помощью волн. ф-ций, найденных для четырех значений межатомного расстояния $R=1,8; 2,0; 2,2; 2,4$ ат. ед., определены силовые константы k , величины r_e и v_{00} для всех указанных состояний. Согласие рассчитанных и эксперим. значений k , r_e и v_{00} удовлетворительное.

С. Ветчинкин

1962

ф. 1963. 48

СО

8 Б37. Последние достижения в расчете возбужденных состояний двухатомных молекул. Lefebvre-Brion H., Moser C. M., Nesbet R. K., Yamazaki M. Recent developments in the calculation of the excited states of diatomic molecules. «Internat. Sympos. Molec. Struct. and Spectrosc. Tokyo, 1962». S. 1, s. a., B118/1—B118/3 (англ.)

1962

Автоматическая программа для IBM 704 использована для расчета основного состояния $X^1\Sigma^+$ молекулы СО, где самосогласованные МО получены из базисного набора функций $1s$, $2s$, $2p$, $3s$ и $3p$ каждого атома. С учетом ограниченного числа взаимодействующих конфигураций вычислены верхние возбужденные состояния молекулы $B^1\Sigma^+$, $C^1\Sigma^+$, $E^1\Sigma^+$, $b^3\Sigma^+$, $c^3\Sigma^+$, $F^1\pi$, $G^1\pi$ и второе состояние $^3\pi$ (лежащее выше $a^3\pi$). Для каждого состояния табулированы силовые постоянные, величины r_0 и энергии возбуждения V_{00} . Найдено, что второе состояние $^3\pi$ лежит на 11 эв выше основного состояния.

В. Шусторович

к. 1963.8

CO

1962

Смелов
Мальцев

4 Б56. Интенсивность линий поглощения полосы 2—0 окиси углерода. Oppenheim U. P., Goldring Hanna. The strengths of absorption lines in the 2—0 band of carbon monoxide. «J. Quantit. Spectrosc. and Radiat. Transfer», 1962, 2, July-Sept., 293—295 (англ.)

При атмосферном давлении и т-ре 300° К снят спектр поглощения полосы 2—0 CO. Полученная интенсивность полосы $S_{2-0}^0 = 1,51 \text{ см}^{-1} \text{ атм}^{-1}$ ниже, чем в ранее опубликованной работе (РЖХим, 1963, 2Б117), и хорошо согласуется с другими данными. А. Мальцев

X. 1964-4

I962

CO

RanK D.H.

Rev. Mod. Phys., 34, 577

Precision infrared spectroscopy.

CO

(Cuep)

IV-9852

1962

Studies on spectrum of carbon monoxide by 33-Mc. discharge. Kenzo Sato (Hitachi Ltd., Tokyo). *Proc. Intern. Symp. Mol. Struct. Spectry., Tokyo 1962*(D306), 4 pp. The Angstrom band system ($B'\Sigma-A'\Pi$), the Herzberg band system ($C'\Sigma-A'\Pi$), and the conspicuous ($d^3\Pi-a^3\Pi$) triplet system were investigated. The latter was compared with observations of other investigators. Five band series were observed which correspond to vibrational quantum no. $V'' = 0, 1, 2, 3, 4$ of lower state $a^3\Pi$. There are no strict selection rules for the ($V'-V''$) combinations, which means that the occurrence of the band spectrum is comparatively free. More than 100 bands were observed for the triplet band system. The use of high-frequency discharge and high pressure makes the ($d^3\Pi - a^3\Pi$) transition clearly observable, with no part of the spectrum missing in the wide wavelength region. The $d^3\Pi - a^3\Pi$ vibrational transitions appear somewhat abnormal, owing to mol. collisions or forced oscillations resulting from the high-frequency field.

Ralph A. Zingaro

C. I. 1964 G1 N3 2612 e

IV-9852

1962

CO, спектр
выс. част. разряда

8 Д120. Изучение спектра монооксида углерода с помощью высокочастотного разряда (33 МГц). Sato Kenzo. Studies on spectrum of carbon mono-oxide by high frequency 33 Mc discharge. «Internat. Sympos. Molec. Struct. and Spectrosc. Tokyo, 1962». S. I., s. a., D 306/1—D 306/4 (англ.)

Кратко описаны эксперим. условия, в которых ставился опыт по изучению спектра монооксида углерода с помощью высокочастотного разряда (33 МГц). Длина разрядной трубки 100 мм, радиус 30 мм, в трубке циркулировал воздух при атмосферном давлении. В видимой области (7000—3500 Å) были наблюдаемы системы полос ($B'\Sigma - A'\Pi$), ($C'\Sigma - A'\Pi$), ($d^3\Pi - a^3\Pi$). Триплетная система полос дана в таблице, в которой также проведено сравнение с результатами других авторов. Приведены графики распределения интенсивности для каждой из систем полос.

А. Машинский

Ф. 1963. 80

1962

CO

Sholette W.P., Muschlitz, Z. Z.

J. Chem. Phys. 1962, 36, 3586.

Компьютерное моделирование
механических свойств
алюминия в газе
(с. А. А.)

1962

CO

Steele D., Lippincott E.R., Vanders-
lice J.T.

Revs. Mod. Phys., 34, No2, 239

$Z_e, W_e, D_e,$

B_e, W_e, D_e

Сравнительное изучение эмпирически
межъядерных потенциальных функций.

BQ-9238-IV; Omm. 782

1962

C₂, CH, CN, CO, NH, NO, O₂, OH

(концентрации и простран. распределение)


Wallace L.

Astrophys J., Suppl. Ser. 1962, 7, 165-290.

Band-head wavelengths...

CA, 1963, 58, 7505b

10.



CO(A) R.K. Asundi, G.D. Progg, 1913

CO₂(A) M.V. Kuzov
Proc. Phys. Soc. 82 16, 967

Задача Дробови и соавтор,
мол. O₂, CO и CO₂.

11 O₂

IV-7177

1963

O₂, CO, CO₂, Ar (J)

Asundi R.K., Kurepa M.V.

J.Scient.Instrum, 1963, 40, N 4,
183-186

The calibration of the ...

J

C-0

1963

в межи-
карбонилар
ИК-помощь.

10 D250. Исследование ИК-спектров металлкарбонильных соединений. III. Отнесение полностью симметричного C—O валентного колебания металлкарбониллов и исследование спектров тетракобальтдодекакарбонил и дикообальтоктакарбонил. Вop G. Infrared spectroscopic studies on metal carbonyl compounds. III. Assignment of the totally symmetric C—O stretching bands of the metal carbonyls, with special respect to the spectra of tetracobalt-dodecacarbonyl and dicobalt-octacarbonyl. «Spectrochim. acta», 1963, 19, № 7, 1209—1224 (англ.)

Исследованы ИК-спектры ряда металлкарбонильных соединений и проведено их теоретич. рассмотрение. Показано, что слабая полоса 2110 см^{-1} относится к пол-

ф. 1966.108

носимметричному вал. кол. С—О в металлкарбонилах с симметрией C_n , C_{nv} , C_s или S_4 . На примере спектров $Co_2(CO)_8$ и $Co_4(CO)_{12}$ показана важность рассмотрения этой полосы для трактовки связей и установления структуры молекул. В случае $Co_2(CO)_8$ показано существование двух структурных форм. Библ. 55 назв. Ч. II см. Bor G. «Acta Chim. Acad. Sci. Hung.», 1962, 34, 395. Э. Броун

7467-IV

1963

HCl, LiH, CO, HF (mol.konst.)

Cashion J.K.

J.Chem.Phys., 1963, 39, N 7, 1872-
1877

Testing of ...

J



1963

J. H. Callomon, A. C. Gilby

CO
creep

The carbon monoxide flame
spectrum under high resolution.
J. Chem. Soc., 1963, pp. 1471

CO

1963

спектр
поглощ.

12 Д144. Фотоионизация и спектр поглощения CO и CO₂ в вакуумной УФ-области спектра. Соок G. R., Metzger P. H. The photoionization and absorption spectra of CO and CO₂ in the vacuum ultraviolet. Abstract. «Sympos. Molec. Struct. and Spectrosc., Columbus, 1963», Columbus, Ohio, s. a., 74—75 (англ.)

Измерены абс. значения выхода фотоионизации и спектр поглощения CO и CO₂ в области 600—1000 Å с разрешением 0,5 Å. Полосы поглощения окиси углерода наблюдались в интервале 1000—716 Å, ниже 716 Å лежит область сплошного поглощения. Полосы поглощения CO₂ наблюдались в интервалах 1000—920 Å и 840—690 Å. Области сплошного поглощения CO₂ лежат в интервалах частот 920—840 Å и 690—580 Å.

Д. Глебовский

ф. 1964. 120



CO

BQP - 7467 - IV | 1963

Cashion f. K.

(u.n.)

"f. Chem. Phys", 39, N7, 1963.

CO

1963
Clinton W. L., Frattali S. D.

139p-5068-III
J. Chem. Phys., 1963, 39, n 12, 3516.

Синтез в молекулах. III. Ана-
лиз эмпирической поведен-
ческой функции.

ф. 1964. 68 116

CO (W., mon. res; (?)) 7603 1263
CO₂ (TC, L x 47)
Dixon R.N.

Disc. Faraday Soc., 1963, v 85, 105-112 (auss.)

Carbon monoxide flame bands.

Proc Roy. Soc. 1964, 28226

W

Co (LOCO, 2co, molecular oxygen) Doc-7602-IV | 7602 | 1963

Dixon R. N.

Proc. Roy. Soc., 1963, A275, v1362, 431-446
(auth)

The carbon monoxide flame bands. 20

Proc Roy, 1964, 40293

100% OPTICAL

IV-208

1963

CO (молек. вес.)

Deutsch J.L., Barton R.P.

The state 1^1 - of carbon monoxide.
"Proc. Phys. Soc.", 1962, 80, 1 2, 561-
563 (Англ.)

РХ., 1963, 6, 669

10

Егг Оринг

7798 - IV

1963

CO(D₀)

Giese C.F., Majer W.B.II

J.Chem.Phys., 1963, 39, N 1, 197-200
()

Dissociative ionization of ...

P .., 1964, 2D95

J

Есть оригинал.

1963

CO

спектр

✓ 16 Б139. Инфракрасная люминесценция окиси углерода, возбужденной активированным азотом. Legay Francois, Legay-Sommaire Nicole. Luminescence infrarouge de l'oxyde de carbone excité par l'azote activé. «C. r. Acad. sci.», 1963, 257, № 18, 2644—2646 (франц.)

Получен спектр испускания в области $4,7 \mu$ окиси углерода, возбужденной азотом, активированным высокочастотным полем, с разрешением, достаточным для разделения вращательных полос. Наблюдаемые полосы соответствуют колебательным переходам $1 \rightarrow 0, 2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 2$ и $4 \rightarrow 3$ молекулы CO. Предполагается, что колебательное возбуждение молекул CO осуществляется путем передачи им энергии колебательно-возбужденными молекулами активированного азота. Резюме авторов

Ж. 1964-16

1963

CO
cnekeup

Infrared luminescence of carbon monoxide excited by activated nitrogen. Francois Legay and Nicole Legay-Sommaire (Fac. Sci., Orsay, France). *Compt. Rend.* 257(18), 2644-6 (1963). The mixing of CO with a flux of N activated by a high-frequency discharge (2450 Mc.) caused an emission spectrum towards 4.7μ of sufficient resolution to sep. the rotation lines. The bands observed corresponded to the $1 \rightarrow 0$, $2 \rightarrow 1$, $3 \rightarrow 2$, $4 \rightarrow 3$ vibrational transitions of CO. It is theorized that the vibrational excitation of CO is effected by the transfer of energy from the vibrationally excited N mols., since activated N contains vibrationally excited N mols. of very long lifetime. This vibrational energy can be transferred rapidly by resonance to the CO mol. since their vibration frequencies are very close [$\nu(\text{N}_2) = 2331 \text{ cm.}^{-1}$, $\nu(\text{CO}) = 2143 \text{ cm.}^{-1}$]. An equil. is established between the N and the CO, and deexcitation occurs in a purely radiative manner. This explains the insensitivity of the relative emission to variations in CO pressure, since the quantity of this gas is sufficient to assure a rapid conversion of vibrational energy into luminous energy.

Kathleen S./Erb

C.A. 1964. 60.5
4955gh

CO

ИК-спектр

V11'D279. ИК-спектр CO в аргоне. Leroi George E., Ewing George E., Pimentel George C. The infrared spectrum of CO in argon. Abstract. «Sympos. Molec. Struct. and Spectrosc. Columbus, 1963». Columbus, Ohio, s. a., 21 (англ.)

ИК-спектры CO в твердом состоянии или на различных инертных матрицах довольно сложны. В последнем случае относит. интенсивность спектральных проявлений сильно зависит от условий подачи образца. Спектры CO в аргоне, наблюдаемые при различных разбавлениях, т-рах окна кюветы и скоростях подачи, показали, что CO образует агрегаты на матрице аргона, но не вращается. Сдвиг в матрице мономера тот же самый как для $C^{12}O$, так и для $C^{13}O$, тогда как сдвиг по частоте полимера $C^{12}O$ гораздо больше, чем у соответствующих полос изотопа C^{13} из-за колебательных сочетаний.

Ф. 1964. 118

1963

$H_2, CO, O_2, H_2O, H_2S, C_2H_4, C_2D_4$

01* (анекдоты)

2. Sullivan R.S.

Index (Nat'l. Aeron. Space Admin.)


Doc. # 63-10100, 1963, 16pp

Spectroscopic research

CA., 1964, 61, p. 8,
90370

10

CO

~~флуоресценция~~

X.1964.4

4 B122. Колебательная флуоресценция окиси углерода. Millikan Roger C. Vibrational fluorescence of carbon monoxide. «J. Chem. Phys.», 1963, 38, № 12, 2855—2860 (англ.)

1963

При комнатной т-ре и давлении CO ~ 1 мм рт. ст. обнаружена резонансная колебательная флуоресценция (Ф) окиси углерода. Рассчитанное на основании спектроскопич. данных радиационное время жизни CO по отношению к переходу $v''=1 \rightarrow s''=0$ равно 0.033 сек. Эта величина была получена также экспериментально при исследовании затухания Ф CO в потоке при большом разбавлении в атмосфере инертного газа. Время жизни в чистом CO значительно больше этой величины в результате диффузии и захвата излучения. Определенные вращательной т-ры по распределению интенсивности вращательных компонент приводит к значению $T=273^\circ \text{K}$, что очень близко к т-ре поступательного движения 286°K . В то же время эффективность колебательного возбуждения соответствовала т-ре $\sim 1000^\circ \text{K}$. Определенные по тушению Ф средние числа дезактивирующих столкновений CO с молекулами различных газов изменяются от $2 \cdot 10^6$ для CO— H_2 до 10^{-9} — 10^{-10} для CO—CO. Отмечается очень большая эффективность кислорода в тушении Ф CO. Е. Никитин

CO

W. Maier

1963

1037

"Berichte der Bunsengesell".

u. b.

chemp :

1963, 67, N 6, 549-554.

1963

CO

7 Б168. Собственное расширение линий в полосах 2v и 3v окиси углерода. Plyler Earle K., Thibault Robert J. Self-broadening of carbon monoxide in the 2v and 3v bands. «J. Res. Nat. Bur. Standards», 1963, A67, № 3, 229—231 (англ.)

С помощью спектрометра с решеткой 4000 *штрих/см* в первом и втором порядках изучено собственное расширение линий полос 2—0 и 3—0 CO при давлениях до 3,5 *атм*. Спектральная ширина щели ($0,08 \text{ см}^{-1}$) была достаточно мала, и поправки, связанные с нею, не превышали 3—20% в разных случаях. Полуширина линий γ° уменьшается от $0,089 \text{ см}^{-1} \text{ атм}^{-1}$ для вращательного числа $|m|=1$ до $0,053 \text{ см}^{-1} \text{ атм}^{-1}$ для $|m|=2$. При измерениях в полосе 2—0 использовались слои от 4 до 100 *см*, а в полосе 3—0 400 *см*. В. Дианов-Клоков

X. 1964. 7

1963

CO
Смещ

№ 4 Д234. Самоуширение линий окиси углерода в 2v- и 3v-полосах. Plyler Earle K., Thibault Robert J. Self-broadening of carbon monoxide in the 2v and 3v bands. «J. Res. Nat. Bur. Standards», 1963, A67, № 3, 229—231 (англ.)

С помощью спектрометра высокого разрешения выполнены непосредственные измерения полуширин линий (γ^0) в 2v и 3v-полосах CO. При спектральной ширине щели $0,08 \text{ см}^{-1}$ поправки на конечную ширину щели были относительно малы (от 3 до 20% для различных условий измерений). Значения γ^0 , полученные с точностью $\pm 5\%$, уменьшаются с ростом квантового числа m от $0,089 \text{ см}^{-1} \cdot \text{атм}^{-1}$ для $|m|=1$ до $0,053 \text{ см}^{-1} \cdot \text{атм}^{-1}$ для $|m|=21$ и хорошо согласуются с данными, полученными ранее в других лабораториях (наибольшее расхождение 8% для $|m|=7$). Предполагается, что наибольший вклад в самоуширение линий CO вносят квадруполь-квадрупольные и анизотропные дисперсионные силы.

К. Василевский

ф. 1964. 48

CO

1963

Оценки
исполн.

Stutman J. M., Lippincott E. R.,
Steele D.

наблюд.

J. Chem. Phys., 1963, 39, 564 (n: 3)

2-й этап

исполн.

Расчет энергетических на-
пряжений вращающегося
молекулы с помощью метода
анализа функций.

CO, CO⁺, F₂, Fe, Li₂, N₂, NO, Na₂, O₂, AlN,
K₂, D₂, KF, DCl, H₂O⁺, LiH, LiH₂, NaH
и др. и др., Fe и др.

19 мф

1963

CO
Cuey
11-11-64B

1-0, 2-0, 3-0 absorption bands of dense forms of pure CO and its solutions in N_2 and Ar. H. Vu, M. R. Atwood, and B. Vodar (C.N.R.S., Bellevue, France). *J. Chem. Phys.* 38, 2671-7(1963). The 1st overtone and the 2nd overtone bands of pure CO as well as the 1st overtone band of CO in soln. in the gaseous, liquid, and solid states of N and Ar were studied. A principal band due to $C^{12}O^{16}$ and a weak satellite due to $C^{13}O^{16}$ and $C^{12}O^{18}$ were found, and displacement of the max. of the principal band and, this satellite were measured. The results are compared with those found for the fundamental by the condensed matrix method. The form of the band, in particular its half-width as a function of temp. and d., is discussed.

RCJQ

C.A. 1963.59.1
125h-126a

Одзор

9209 - IV

(6p aus. nom.

)-H₂, HCl, HBr, CO,

1963

CO₂, CH₄, H₂O u gp.

Vodar B., Vu H.

J. Quantt. Spectrosc. and Radiat.
Transfer, 1963, 3, N 4, 397-433

Intensites absolues des transitions

...

Ref., 1964, 8D163

M-398 -

IV
 CH_4 ; CO (Kp)

1964

Gadariusi J., Schönberger E.
Studia Univ. Babes-Bolyai. Ser. chem.,
1964, 9, N 2, 71-76

Термодинамическое рассмотрение реак-
ции метана с окисью углерода.

M

orig.

F

РХ, 1965, 21 394

ЕСТЬ ОРИГИН.

9629 - IV

1964

CO, CN

(mol.post., ω_i)

Fishburne G.S., Weinberg J.M.,
Edse R., Rao K.N.

J.Opt.Soc.America, 1964, 54, N 10,
1288

$C_2N_2+N_2O$ flame as ...

J

CO

Перловин Я. И.,
Орлова И. И.

1964

Тр. Комис. по спектроскопии,
АН СССР, 1964, Т. 3, вып. 1,
205-213.

Определение вероятности
спонтанного излучения
 N_2O , CO и CO_2 . (см. N_2O)

CO

коэф.

поглощения

1 B65. Коэффициент поглощения окиси углерода в области длин волн 1006—600 Å. Huffman R. E., Lagabee J. C., Tanaka Y. Absorption coefficients of carbon monoxide in the 1006—600-Å wavelength region. «J. Chem. Phys.», 1964, 40, № 8, 2261—2269 (англ.)

При использовании гелиевого континуума Гопфильда как источника непрерывного спектра фотоэлектрич. методом измерены коэф. поглощения k или поперечные сечения CO в области 600—1006 Å. В области от 1006 до ~715 Å обнаружены сильные полосы (значения k до ~4500 см^{-1}) и ряд слабых полос в коротковолновой области. Положение и относительная интенсивность этих полос хорошо согласовывались с имеющимися спектрами поглощения. Непрерывное поглощение начиналось при ~960 и продолжалось до 600 Å. Отмечен интенсивный ионизационный континуум при длинах волн, меньших первого ионизационного потенциала (884,7 Å). Один из максимумов в континууме при 870 Å ($k=710 \text{ см}^{-1}$) связан с состоянием $\text{CO} + X^2\Sigma^+$, другой при 724 Å ($k=950 \text{ см}^{-1}$) — с $\text{CO} + A^2\Pi_i$. Проведено сравнение спектров поглощения изоэлектронных молекул CO и N_2 .

Ф. Ортенберг

X. 1965.1

1964

CO

✓ 12 Д145. Коэффициент поглощения окиси углерода в области длин волн 1006—600 Å. Huffman R. E., Lagrabee J. C., Tanaka T. Absorption coefficients of carbon monoxide in the 1006—600-Å wavelength region. «J. Chem. Phys.», 1964, 40, № 8, 2261—2269 (англ.)

При использовании гелиевого континуума Гопфильда как источника непрерывного спектра фотоэлектрич. методом, описанным ранее (РЖФиз, 1964, 6Д222), измерены коэф. поглощения k (поперечные сечения) CO в области 600—1006 Å при разрешении 0,5 Å. В области от 1006 до ~715 Å обнаружены сильные полосы (значения k до ~4500 см⁻¹) и ряд слабых полос в коротковолн. области. Положение и относит. интенсивность этих полос хорошо согласуется с известными спектрами поглощения. Непрерывное поглощение обнаружено между 960 Å и 600 Å. Отмечен интенсивный ионизационный континуум при длинах волн, меньших первого ионизационного потенциала (884,7 Å). Один из максимумов в континууме при 870 Å ($k=710$ см⁻¹) связан с состоянием CO⁺ X² Σ⁺, другой при 724 Å ($k=950$ см⁻¹) — с CO⁺ A² Π_i. Проведено сравнение спектров поглощения изоэлектронных молекул CO и N₂. Ф. Ортенберг

1964

W-M-460

помощные

ф. 1964. 12А

CO

Женѣс F.

1964

попытки
кривые

Collect. Czechosl. Chem.
Commun. , 29 , N 8, 1745.

Приведенные попыткам
кривые для возбужденных сос-
тояний  двухатомных ком-
бинаций атомов C, N и O.

(см. N₂) III

CO

Bp-M1474-IV | 1964.

Jene F.

M.N.

Collect Czechosl. Chem.
Commun.

1964, 29, N12, 2869-80.

C¹²O¹⁶

ВФ-9696 - XIV

1964

✓ 14 Б242. Распространение субмиллиметровой микроволновой спектроскопии на область длин волн, меньших половины миллиметра. Jones Gordon, Gordy, Walter. Extension of submillimeter wave spectroscopy below a half-millimeter wavelength. «Phys. Rev.», 1964, 135, № 2A, 295—296 (англ.)

Методы микроволновой спектроскопии с высокой разрешающей силой распространены на область вплоть до λ 0,43 мм. Измерен вращательный переход $J=5 \rightarrow 6$ молекулы C¹²O¹⁶ и определены вращательные постоянные $D_0 = 0,18390 \pm 0,00014$ и $B_0 = 57635,970 \pm 0,003$ Мгц. Измерены три компоненты сверхтонкой структуры перехода $J=0 \rightarrow 1$ молекулы HCl³⁵ при λ 0,48 мм и получены значения $\nu_0 = 625919,24 \pm 0,52$ и $B_0 = 312991,30 \pm 0,26$ Мгц. По B_0 определено спектральное значение скорости света $C = 299792,8 \pm 0,4$ км/сек. Значение хорошо согласуется с непосредственно измеренной величиной скорости света.

И. Милевская

X.1965.14



C¹²O¹⁶

смерр

Зр - 9696 - XIV (XIV)

1964

7 Д246. Расширение субмиллиметровой спектроскопии в область полумиллиметровых волн. Jones Gordon, Gordy Walter. Extension of submillimeter wave spectroscopy below a half-millimeter wavelength. «Phys. Rev.», 1964, 135, № 2A, 295—296 (англ.)

Методы микроволн. спектроскопии с высокой разрешающей способностью применены до значения длин волн λ 0,43 мм. Измерены $J=3 \rightarrow 4$; $4 \rightarrow 5$; $5 \rightarrow 6$ переходы для молекулы C¹²O¹⁶. Отмечается, что линия $J=5 \rightarrow 6$ ($691472,60 \pm 0,60$ МГц) в 3 раза выше шумов. Из определения сверхтонких компонент $J=0 \rightarrow 1$ вращательного перехода для молекулы HCl¹⁵ при 0,48 мм найдено значение $B_0 = 312991,30 \pm 0,26$ МГц. При сравнении его с величиной B_0 , взятой из ИК-измерений, получено значение скорости света $c = 299792,8 \pm 0,4$ км/сек, хорошо совпадающее с лучшими результатами измерений. Библиографическое название: Б. Н. 9 назв.

ф. 1965. 7А

CO

ОИИИ 52/2 (в науке
Ковалев)

1964

Ковалев Г.

Акта Phys. Acad. Sci. Hung.

1964, XVII

вып. 1-2, 67-74

Некоторое новое результаты
микроскопич. исследован. двухат.
молекул.



CO

| BQ - 9722 - IV | 1964

(A. P. ЧОНОВ)

Lassette E. N.,
Silverman S. M.

J. Chem. Phys., 1964,
40, N 5, 1256-61

6 Д75. Ридберговские уровни молекулы окиси углерода. Lefebvre-Brion H., Moser C. M., Nesbet R. K. Rydberg levels in carbon monoxide. «J. Molec. Spectrosc.», 1964, 13, № 4, 418—429 (англ.) 196

В рамках метода конфигурац. взаимодействия исследуются ридберговские состояния молекулы CO. Результаты, полученные для ридберговских состояний симметрии $^1\Sigma^+$, $^3\Sigma^+$, $^1\Pi$ и $^3\Pi$, хорошо согласуются с имеющимися эксперим. данными, за исключением состояний $E^1\Sigma^+$ и $E^1\Pi$, отнесение которых, по-видимому, следует пересмотреть. Первое состояние, вероятно, имеет симметрию $^1\Pi$, второе состояние может иметь симметрию $^1\Pi$ или $^1\Sigma^+$. Вычисленные волн. ф-ции анализировались по Малликену с целью определения атомных электронных заселенностей, которые далее использовались для оценки величины квантового дефекта. Найденные таким образом квантовые дефекты ридберговских состояний хорошо согласуются с соответствующими эксперим. величинами. Делается вывод, что приближение самосогласованных МО ЛКАО позволяет удовлетворительно описать характеристики ридберговских молекулярных состояний.

В. Быховский

СВ
(Уровни
энергии)

ф. 1965. 68

CO

1964

14 Б21. Ридберговские уровни в окиси углерода. Lefebvre-Brion H., Moser C. M., Nesbet R. K. Rydberg levels in carbon monoxide. «J. Molec. Spectrosc.», 1964, 13, № 4, 418—429 (англ.)

В рамках метода конфигурационного взаимодействия исследуются ридберговские состояния молекулы CO. Электронные волновые функции возбужденных состояний CO, соответствующих возбуждению внешних электронов, строились на основе самосогласованных МО ЛКАО, рассчитанных для основного состояния CO с использованием расширенного базисного набора АО, содержащего вплоть до 18σ - и π -АО. В качестве орбитальных экспонент слейтеровских АО применялись экспоненты, найденные с помощью правил Слейгера. Весь расчет произведен с помощью автоматич. программы, написанной Несбитом. Результаты, полученные для ридберговских состояний симметрии $1\epsilon^+$, $3\epsilon^+$, 1π и 3π , хорошо согласуются с имеющимися эксперим. данными за

x. 1965. 14

исключением состояний $E^1\epsilon^+$ и $F^1\pi$, отнесение которых, по-видимому, следует пересмотреть; что касается первого состояния, то оно, вероятно, имеет симметрию $^1\pi$, второе состояние может иметь симметрию $^1\pi$ или $^1\epsilon^+$. Вычисленные волновые функции анализировались по Мелликену с целью вычисления атомных электронных заселенностей, которые далее использовались для оценки величин квантового дефекта; найденные квантовые дефекты ридберговских состояний хорошо согласуются с соответствующими эксперим. величинами. На основании изложенного делается вывод, что приближение самосогласованных МО ЛКАО позволяет удовлетворительно описать характеристики ридберговских мол. состояний.

В. Быховский

1964

CO

7 Б121. Инфракрасные спектры окиси углерода в аргоновой матрице. Leroi George E., Ewing George E., Pimentel George C. Infrared spectra of carbon monoxide in an argon matrix. «J. Chem. Phys.», 1964, 40, № 8, 2298—2303 (англ.)

ИК-спектр

Исследован ИК-спектр поглощения CO в матрице из аргона при $T=20^{\circ}\text{K}$. Смеси газообразного CO и Ar осаждались на охлажденную до 20° пластинку CsJ. Обнаружены сильные полосы $2148,8$ и $2138,0\text{ см}^{-1}$ с полуширинами $1,5$ и $3,5\text{ см}^{-1}$ соответственно. Их относительные интенсивности сильно зависят от различных эксперим. условий (конц-ии образца, т-ры пластинки, скорости осаждения и др.). Полоса $2148,8\text{ см}^{-1}$ принадлежит молекуле CO, изолированной в аргоновой матрице, и не имеющей возможности вращаться. Вторая полоса связана с агрегатами из молекул CO. Исследования спектров изотопич. молекул $\text{C}^{13}\text{O}^{16}$ показывают, что между идентичными по изотопич. составу партнерами в агрегате имеется взаимодействие колебаний, заметно меняющее частоты молекул в агрегате по сравнению с мономерными молекулами.

В. Дзюнов-Клоков

2. 1965. 7

1964-1965

CO

IV-9726

1964

ИК-спектр

✓ 12 Д182. ИК-спектр окиси углерода в твердом аргоне. Leroi George E., Ewing George E., Pimentel George C. Infrared spectra of carbon monoxide in an argon matrix. «J. Chem. Phys.», 1964, 40, № 8, 2298—2303 (англ.)

Измерен ИК-спектр поглощения окиси углерода в смеси с аргоном при 20° К в интервале частот 2125—2155 см^{-1} . Отношение аргона к окиси углерода менялось в смеси от 105 до 8000. Найдены полоса поглощения при 2148,8 см^{-1} , отвечающая колебаниям CO, и полоса 2138 см^{-1} , связанная с поглощением агрегатов CO.

Д. Глебовский

ф. 1964-128

CO

Vi

сукрпб

лиатрпче

1964
3) Infrared spectra of carbon monoxide in an argon matrix. George E. Leroi, George E. Ewing, and George C. Pimentel (Univ. of California, Berkeley). *J. Chem. Phys.* 40(8), 2298-303(1964). The infrared absorption spectrum of CO in an Ar matrix shows prominent bands at 2148.8 and 2138.0 cm^{-1} with half-widths, resp., 1.5 and 3.5 cm^{-1} . The relative intensities of these bands are extremely dependent on a variety of exptl. conditions, including sample concn., window temp., and deposition rates. The variability shows that CO isolated in Ar absorbs at 2148.8 cm^{-1} and that it does not rotate. The lower frequency absorption is due to aggregates. The frequency shift of the Ar-isolated CO absorption relative to that of gaseous CO shows that CO fits tightly in the Ar lattice. In contrast, the CO aggregates absorb at lower frequency than gaseous CO. Isotopic studies using $^{13}\text{C}^{18}\text{O}$ reveal vibrational coupling of 1.1 cm^{-1} between isotopically identical mols. in an aggregate. An increase in matrix cavity diam. would be needed if a stationary CO mol. begins to rotate in Ar. This site expansion, which could be as much as 0.4 Å., may be an important factor inhibiting rotation. RCJQ

16-9426

C.A. 1964 CO N11 127894

=CO

19/24

6 Д138. Молекулярные параметры и строение связей. III. Связи углерод — кислород. Ladd J. A., Orville — Thomas W. J., Cox Bertram C. Molecular parameters and bond structure. III. Carbon-oxygen bonds. «Spectrochim. acta», 1964, 20, № 12, 1771—1780 (англ.)

Составлена таблица значений силовой постоянной связи CO и длины этой связи в молекулах CO₂, OCS, H₂C=C=O, HNCO и в различных электронных состояниях молекулы C¹²O¹⁶ и иона (C¹²O¹⁶)⁺. Построены кривые зависимости силовой постоянной от длины связи и частоты вал. кол. связи CO от силовой постоянной. Вычисление по ф-ле Кларка приводит к лучшим результатам в сравнении с ф-лой Бэджера. По методу наименьших квадратов установлено соотношение: $\log f(\text{CO}) = 5,79 \log r(\text{CO}) + 6,55$ или $f(\text{CO}) = 35,5 r_{\text{CO}}^{-5,79}$ мдн/А. Последнее уравнение использовано

Силовые
пост.

$r_{\text{C-O}}$

Ф. 1966-6 Ж

для вычисления силовой постоянной связи СО в ионе CO_3^{2-} . Получено значение 7,33 мдн/А. По этому значению и частотам колебаний найдены остальные 5 силовых постоянных этого иона. Связь СО является промежуточной между одинарной и двойной связями. Этот вывод согласуется с вычисленным по методу молекулярных орбит порядком связи (1,58). По значениям длин связей вычислены силовые постоянные связей СО в 12-многоатомных молекулах Ч. I см. РЖХим, 1966, 10Б125. Ч. II см. Jones R., Ladd J., Orville-Thomas W. «Spectrochim. Acta», 1964, 20, 1697. М. Ковнер

иниэтопо

Phys Rev 1965, 138, N 5A, 1495-1499.
gallium arsenide.

Evidence for a considerable nonlinear dipole absorption in Geick R.

539.2

Физ. 10

CO

1964

1 Б107. Инфракрасная флуоресценция окиси углерода. Mc Caa David J., Williams Dudley. Infrared fluorescence of carbon monoxide. «J. Opt. Soc. America», 1964, 54, № 3, 326—330 (англ.)

Найдено, что при облучении CO в области перехода $V=0 \rightarrow 2$ (2,3 μ), возникает излучение, соответствующее переходам $V=1 \rightarrow 0$. Возникновение состояний $V=1$ объясняется резонансным переносом энергии при столкновениях $CO(V=2) \rightarrow CO(V=0)$, в результате которых возникают две молекулы $CO(V=1)$. Их дезактивация происходит с излучением на длине волны 4,6 μ .

В. Ковалев

ж. 1965.1

3917 -

IV

1964

N₂; CO; BF (De, re,)

Nesbet R.K.

J.Chem.Phys., 1964, 40, N 12,
3619-3633

Electronic structure ...

J

1964

~~253~~
Wex (взгн. OH, NH, CH, SiH, CD,
C=C, CO, в 60 молекулах)

Papousek D.

Collect. Szchosl.Chem.Communs, 1964,
29, 2274-82

Characteristic anharmonic effects in
the vibrational spectra of ...

J
PX, 1965, 13546

1964

Wh. sup.
pacer
Max. 1
CO

Quantum mechanical study of molecules. Electronic states of diatomic molecules. Roop C. Sahni. NASA Accession No. N64-25713, Rept. No. NASA-TN-D-2363. Avail. OTS, 49 pp. (1964)(Eng). The theory of the mol. orbital method for ground, ionized, and excited states of mols. is outlined. A brief summary of the interaction integrals and their tabulation is given. An automatic program designed for the computation of various states of mols. is outlined. Examples of the study of ground, ionized, and excited states of CO, BH, and N mols. where the programs of automatic computation and mol. integrals were used are presented. From *Sci. Tech. Aerospace Rept.* 2(17), 2378(1964).

TCSL

C.A. 1965. 62.12

138578

CO

Shurvell H.F

1964

Diss. Abstc., 1964, 25, n 4, 2260.

ИК-изучение малых мо-
лекул в полимерных мате-
риалах.

(см. Исе)

1964

CO
 unrec.
 6 Aug 64
 X → A

Intensity distribution for the $X^1\Sigma^+ \rightarrow A^1\Pi$ transition in carbon monoxide excited by electron impact. S. M. Silverman and E. N. Lassette (Ohio State Univ., Columbus). *J. Chem. Phys.* 41 (12), 3727-9(1964)(Eng). The envelope shape for the unresolved $X^1\Sigma^+ \rightarrow A^1\Pi$ transition in CO excited by electron impact was exptl. detd. at an incident electron energy of 508 v. The distribution was compared with calcs. by using published theoretical formulations, from which the Franck-Condon factors can be obtained.

RCJQ

C.A. 1965. 62. 3
 2379a

CO

William Leroy Taylor.

1964

номери.
ф-уни.

Dissertation Abstr. 24(10), 4014.

Intermolecular potential
functions for Ar, Co, and cyclo-
hexane.

(cu. Ar)

C.A. 1964. 61. 3

CO

1964

✓ 4 Д66. Множители Франка-Кондона, соответствующие ионизации молекул CO, NO и O₂. Wacks Morton E. Franck-Condon Factors for the ionization of CO, NO, and O₂. «J. Chem. Phys.», 1964, 41, № 4, 930—936 (англ.)

С помощью потенциала Морзе вычислены вероятности следующих переходов

Для CO ($X'\Sigma^+, v''=0$) $\rightarrow$ CO⁺ ($X^2\Sigma^+, v'=0 \rightarrow 10$);

($A^2\Pi_i, v'=0 \rightarrow 10$); ($B^2\Sigma^+, v'=0 \rightarrow 10$).

Для NO ($X^2\Pi, v''=0$) $\rightarrow$ NO⁺ ($X'\Sigma^+, v'=0 \rightarrow 10$);

р. 1965. 48



$$(A'\Pi, v' = 0 \rightarrow 10).$$

Для $O_2 (X^3\Sigma_g^-, v'' = 0, 1) \rightarrow O_2^+ (X^2\Pi_g, v' = 0 \rightarrow 10);$

$(a^1\Pi_u, v' = 0 \rightarrow 15); (A^2\Pi_u, v' = 0 \rightarrow 20);$

$$(b^4\Sigma_g^-, v' = 0 \rightarrow 10).$$

Результаты вычислений представлены в таблицах и используются для получения эффективности ионизации в зависимости от энергии фотона или электрона. Рассмотрены ранее полученные эксперим. результаты, относящиеся к ионизации молекул CO , O и O_2 .

Н. Генералоз