

Запасы
ценных
металлов

1925

FRANK M

No

Warrant

number

Trans, Fidelity Soc, 1925

2,526

1935

№, K, P, S
// C, M, Y //

Бутков К

Acta Physicochimica URSS,
1935, 3, №2-3, 205-218

терм
дис-м

Молекулярные спектры
гидрохлоридов иридов

I (общ. ит)

1936

Roderbusch W, Murray L.,
Butler M.

J. Chem. Phys., 1936, 4, 342

демеритационно } [Авторы, основываясь на нем.
учет. } дим. элементов подобн. моно-
галогенидов } шров К, термическим пред-
положением об ассоциации
их молекул в парах]

I (обл. МП)

1937

микро-
параметры
цел.
мет.

Maxwell G.R., Hendricks I.B.,
Bloody V.M.

Максвелл, Тендеринг,
Блудей.

Phys Rev., 1937, 52, 968

Применение к фиброзу абстракт-
ности в методах ассоциатив-
ного анализа

[обл. 117]

1948

Цинов Н.И.

ДАН СССР, 1948, 59, №3, 464

дизерис.
паров

[Автор показывает с помощью
масс-спектрометра, что
испарение чист. аммониаков
происходит с участием моле-
кул NH_3 , NH_4 и NH_5 .]

I (общ. МГ)

Щелочные
металлы

ВФ-3389-X

1950

Галлоидное Бухельский В.М.
соем. Загреберг Э.Я.

Попов Н.И.

ис. Исследования и теорет.
физики, 1950, 20 вып. 10
877-88

Отрицат.

ионы в газ.
разрывах в парах...

Риттер

1951

Rittner E.

J. Chem. Phys.,
1951, 19, 1030

$E_{rev} = 4,13$
э.в.

Энергии связи и
дипольные моменты
молекул галогенидов
щелочей

В
уор.

Теплов.

E. S. Rittner.

1951

Binding Energy and Dipole
Moment of Alkali Halide
Molecules.

E. S. R. ZhRZh 19, 8, 1030, 1951

KF

NaF

KF

RbF

RbCl ~~up~~

RbBr

RbI

CsCl

CsF

CsI

min. N2

I

15-45

15-45

15-45

15-45

15-45

15-45

15-45

100-6231-

Barraco R., Cantt. D.D.

1953

Proc. Roy. Soc. L. A219, 120

Уб. полус. полусемянный нектар.
разобр. замоченный цел. мн.
и энергия глицерола. 9 м/с

Глазнер

1953

Глазнер, Томпкинс

Глазнер А., Томпкинс Ф.С.

У. Смет. Рвус,

1953, 21, 1817-18

[Теплоты полимеризации
циклопентанов]

Ли
и др.

1954

ОТЧЕТ А-275

Houng A. Mandel M,
Schitch M, Townes C.

Phys. Rev. 96, 13,629

Микроволн. спектр галогенид
целочных металлов.

См. на обороте

(+17)

✓ W. 1

14.31

	we	wefe	Ye	Ze
LiBr ²⁹	(480)	(1.4)	30,340	2,170
LiF	450	1.5	38,048	2,391
NaCl	380	1.0	27,333	2,360
NaBr ²⁹	315	0.15	111,486	2,562
NaJ	286	0.75	143,138	2,715
KF	405	1.45		2.55
KCl ³⁵	305	0.9	131,083	2,666
KBr	230	0.7	203,437	2,820
KJ	200	0.5	274,009	3,042
RbF	390	1.3		
RbCl	270	0.7	192,407	2,780
RbBr	181	0.35	354,800	2,948
RbJ	147	0.25	513,588	3,176
CsF	385	1.23	91,460	2,345
CsCl	240	0.6	233,911	2,906
CsBr	171	0.3	467,503	3,072
CsJ	121	0.2	713,668	3,315

газодр.
диаметр
целочных
пород

C.T. O'Konski, W.B. Slighi 1955

J. Ch. Ph., 23, 1175 (2.)

Синтез и расчет жидк.
фаз газодразных диаметров
целочных пород.

Шелочное (оттиски A-474) (1956)

Галогениды Векел C. L.

(до) J. Chem. Phys.
1956, 24 N 4

923-4



1956

Гр
щел.
вал.

Morris D.F.C., [Моррис]

Дата Случ., 1956, 9, 197

Журнал решений и деловых
записок.

I (общ. м.р.)

X-322

1956-1957

~~6736~~ асфальт

RbCl, KCl, KJ, NaCl, NaJ (Меркуриум галленум)

NaF, LiCl, LiBr (Меркуриум трансуранум)

Miller R.C., Kusch P.

J.Chem.Phys., 1956, 25, N 5,

860-876

(Errata) 1957, 27, N 4, 981

Molecular composition ...

(all. used. calor. I)

M, Be, J

1956

Ир-
ичес.
закон.

Paulino

Proc. Nat. Acad. Sci. India

#, 1956, 25, 1

[материал ир. закон-
исков как следствие про-
шых поперечных слоев]

I (общ. мт')

галонды
цел. мегалов

Sarkena B.D. Pant L.M

- Z für Physik 1956, 146, 205

спектроскопия

Мембранные
расстояния в
галондах
целочных
элементов.

Каждо-мультиспектральный спектр
галондов целочных мегалов

Изучен каждо-мультиспектральный спектр
14 цел. мегалов и неких
специальных кристаллов NaCl и KCl
Спектр дает широкое безструктур-

Итог поносот. В 10 разовых измерениях
 на 171 см. поносот, then peak position
 shifts towards longer wavelengths as the ~~length~~
 уменьшается (interatomic) уменьшается

Визуально из таблицы/визуально уменьшается

	LiCl	LiBr	NaCl	NaBr	KF	KCl	KBr	KI	RbF	RbCl
d с.г.	2,57	2,75	2,81	2,98	3,67	3,14	3,29	3,53	2,82	3,27

R. S. Berry) 1957
J. Chem. Phys. 27 1288

Франкоф. Джо Кайо Барн.
едер с двуглазными 2-м
в мол-лах Ламберт. Чон.
мет.

LiCl
LiF
и др.

для хлоридов
и фторидов.

Краснов К.С.

1957

М. негр. химии 1957, 2, 18, 1725-

К вопросу о температурной
разрядности в монокристаллах
хлоридов.

$$\sum_{LiCl} = 2,021 \text{ Å}^3$$

$$\sum_{LiF} = 1,510$$



$$\sum_{NaCl} = 1,877$$

$$\sum_{KCl} = 2,142$$

$$\sum_{RbCl} = 2,251.$$

Отношение $\left[\frac{r_{T-B_2}}{r_{B_2-Cl}} \right]$ разности радиусов ионов и атомов к разности радиусов хлора и брома сохраняет пост. значение для всех щел. метал.
На основании этого найдено

$$r(LiCl) = 2.0216 \text{ \AA}$$

В предположении, что $\frac{r_{Cl-F}}{r_{T-B_2}}$ сохраняет такое же постоянство как и выше указанное соотношение вычислены следующие значения

LiCl	LiF	NaF	KF	RbF	
2.021	1.510	1.877	2.142	2.251	
2.022	1.527	1.840	2.129	2.246	→ расчет Ковига

R.S. Krishnan, P. S. Warayana (1957)

J. Indian Inst. Sci A 39, 12, 85-92

Раман-силеръ залотенков
целотекъ металлов.

PA 62, 1783

205.

1957.

молочн
сорт. и
терми
длина.

Miller R.C., Kirsch P.
J. Chem. Phys., 1957, 24,
981.

молекулярный состав
паров целлюлозных полимер-
ов (J. Chem. Phys., 1956,
25, 260).

диаметр
паров

I (общ. МР)

галогениды Rice S. A.,
исст. Klemperer W.
металлов

1957

263

классиф.
показат.
моделей

У. Chem. Phys.,
24, N2, 573

Спектры целочисл. галогени-
дов. II. ИК-спектры галогени-
дов Na, K, RbCl и CsCl.

● (см. CsCl) III

Omnick A-281

1957

Concordia

Varshni Y.P.,

He X

Trans. Faraday Soc., 1957, 53, 132-2

Kilochloro cup Teryl Molecules
yellowish red

Teryl

C.A., 1957, 12576c

спектры

Berkowitz J.,

спектры

J. Chem. Phys., 1958, 29, 1386.

LiX }
NaX } X = F, Cl,
KX } Br, I

Спектры молекул и
колебательные спектры
энергии ионизации радио-
активных

RbCl

CsCl.

1958

Eisenstadt M., Rothberg G. M.,
Kirsch P.

участ.
испол.

J. Chem. Phys., 28, 4, 797

Молекулярный состав
паров дитермидов щелочных
землер. металлов.

I (обл. 11)

1958.

I Kutzelnigg St.
Талочини Монатх, Снем, 1958,
цел. 8.9, NY-5, 459-468
металлов

Точки плавления талочини-
металлов талочини металлов
как функции талочини
радиусов

x-59-10-34209

I (общ. МГ)

1958

$M_2 Cl^+$
 $M_3 Cl_2^+$

Milne Thomas A., Klein M.,
 Michael, Coricciotti Daniel
 J. Chem. Phys., 1958, 28, NV
 48-49

Масс-спектрометри-
 ческий анализ пара в
 равновесии с жидкими
 щелочными металлами.

I (общ. III)

1959

Краснов К. С.

Докл. АН СССР, 1959, 128,
№ 2, 326-328

Растёт тернии моле-
кулы гетероциклов целочис-
ленного количества атомов на
основе новой модели.

1959

Краснов К. С. Итесты ЛМ.
Ж. И. Т., 1250, 4, №, 963-968

Итерные сваны в мол-
корок паломников чре-
дочных металлов

X-59-24-84704

I

Ураснов Р. С.,

1959

Щел.

газообразные

Ж. неорг. химии, 1959,

4, №3, 530-534.

Механизмы диссоциации
в молекулах газообразных
галоидов и галогенных соеди-
нений и системы радиусов не-
деформированных газотных
ионов

X- 59-20-70350 ●

1959

 M_2X^+

газот
колебаний
силы
нагрузки
теории
молекулы.

Milne T. A., Cubicciotti D.,

J. Chem. Phys., 1959, 30, 1418.

Теория и расчеты колебаний
ионов газотвердых соединений
ионных кристаллов M_2X^+ .

(Выведены колебательные
частоты ионов M_2X^+ для
модели ^{металла} ~~предложенной~~ Паунтом.
(мнимая модель $[Na-Ca-Na]$)

Шорел

x-60-4-12282

Дли молекулы

LiF 1049	NaF 574	KF 413
LiCl 784	NaCl 405	KCl 290

$$\text{Li}_2\text{Cl}^+ = \text{LiCl} + \text{Li}^+, \Delta S_{1000} = -23,78 \text{ э.е.}$$

$$\Delta H_{1000} = -62,2 ; \Delta F_{1000} = -38,0$$

$$K_p = \frac{f_{\text{LiCl}}}{f_{\text{KCl}} \cdot f_{\text{Li}^+}} = 10^{+8,3}, \text{ т.е. по Li}_2\text{Cl}^+$$

гораздо более благоприят, чем Li^+

A-1809

1957

Газофазные ионотных металлов
(D, Есьеи примеров)

Milne T.A., Cubicciotti D.,
J. Chem. Phys., 1959, 30, 1625-1626

Рех, 1960, № 4, 18341

● 10

F. M. Page, T. M. Sugden | 1959
Nature, 183, 1959, № 4676, 1672

журнал через 6 мес. в
фторидных условиях. мбс.мб.

I адм.
I уч.м.

1959.

Li X

Рассудки Н.Т.

X-F, Cl, Br, I

МЗУ, хим. ф-т, 1959.

Электроннограф. исследование
важнейших молекул газо-
генных и жидких
элементов. (авториз.)

есть авториз.

1966

Литий
галогениды
в парах
(ср. ут. упр.)

LiCl LiBr, LiF,
LiI, NaF, NaCl,
NaBr, NaI

8

C.H. 1966. 55.21

20568 de

Structural study of lithium and sodium halides by electron diffraction. P. A. Akishin and N. G. Rambidi (M. V. Lomonosov State Univ., Moscow). *Zhur. Neorg. Khim.* 5, 23-30(1960).—The materials were evapd. from Mo or graphite effusion cells at temps. required to produce vapor pressures of 5-10 mm. Hg. The diffraction patterns were obtained with accelerating voltages of 40, 60, and 80 kv. The values of $r(M - X)_{\text{effective}}$ are as follows: LiF 1.68, LiCl 2.17, LiBr 2.35, LiI 2.54, NaF 2.02, NaCl 2.45, NaBr 2.57, NaI 2.80 Å. Av. deviation is 0.01 Å. On the basis of earlier considerations (CA 53, 15750g), the content of M_2X_2 in the vapors of all Li halides and NaF is estd. to be >50%, while for NaCl, NaBr, and NaI, it is 19, 14, and 13%, resp. The amplitudes of peaks corresponding to $r(X - X)$ vibration are calcd. on this basis and compared with exptl. data. It is concluded that Li_2Br_2 and Li_2I_2 have quadrangular planar configurations with $r(Li-Br) = 2.35 \pm 0.02$ Å., $r(Br-Br) = 3.85 \pm 0.10$ Å.; $r(Li-I) = 2.54 \pm 0.03$, $r(I-I) = 4.30 \pm 0.1$ Å. The angle X-Li-X is $110 \pm 4^\circ$ for Li_2Br_2 and $116 \pm 4^\circ$ for Li_2I_2 . R. Didchenko

1958

188

Li_2F_2 , Li_3F_3 , Na_2F_2 , K_2F_2 , Rb_2F_2 ,

Cs_2F_2 (Do, Hs)

Eisenstadt M., Rothberg G.M., Kusch P.,
J.Chem.Phys., 1958, 29, N 4,
797-804

J, Be,

M

F

Лаборатория
химии
металлов.

Аришин Р. А., Камбиди В. Г. 1960

~~Учен.~~ 2 Phys. Chem., Leipzig,
213, III

Исследование молекулярной
структуры газобразных
гидридов металлов.
металлов гидридов металлов

~~(См. также)~~

2В113. Колебательные частоты щелочно-галогидных димеров. II. Деформационные, симметричные валентные и B_{1g} -колебания. Berkowitz Joseph. Vibrational frequencies of alkali halide dimers. II. Bending, symmetric stretch, and B_{1g} modes, «J. Chem. Phys.», 1960, 32, № 5, 1519—1522 (англ.).—Молекула щелочно-галогидного димера образует плоский ромб. Ранее (РЖФиз, 1959, № 11, 24688) были вычислены геометрич. параметры таких молекул, а также была выведена ф-ла, выражающая зависимость потенц. энергии V молекулы димера от расстояний между ионами. Входящие в эту ф-лу коэф. определены из опытных данных, для кристаллов и двухатомных молекул. Для колебаний каждого из типов симметрии $B_{1u} = A_{1g}$ и B_{g1} введены различные колебательные координаты, связанные рядом соотношений с изменениями расстояний между ионами. Эти соотношения позволяют выразить силовые постоянные через параметры, входящие в ф-цию V , и найти их численные значения. Последние использованы для вычисления частот колебаний молекул Me_2X_2 ($Me = Li, Na, K; X = F, Cl, Br, J$) и Rb_2Cl_2, Cs_2Cl_2 . Частоты колебаний всех типов симметрии каждой молекулы довольно близки между собой. Точность вычисления частот 15—20%. М. Ковнер

Галогениды
щелочных
металлов

7Б83. Строение молекул и колебательные спектры димеров галогенидов щелочных металлов. II. Деформационные, симметричные валентные в B_{1g} колебания. Berkowitz Joseph. Vibrational frequencies of alkali halide dimers. II. Bending, symmetric stretch, and B_{1g} modes. «J. Chem. Phys.», 1960, 32, № 5, 1519—1522 (англ.).—В предположении ромбич. модели димера, состоящей из 4 ионов, произведен расчет неплоскостных (B_{1u}) и плоскостных (B_{1g}) деф. и симм. вал. кол. (A_g) для всех галогенидов Li, Na и K и для хлоридов Rb, Cs. Параметры потенциальной функции (поляризуемость ионов, постоянные отталкивания и ван-дерваальсова взаимодействия) оценивались по данным для кристаллов и двухатомных молекул. Результаты расчета показывают (сообщение I, РЖХим, 1959, № 14, 48483), что частоты 6 возможных нормальных колебаний димера близки друг к другу и во всех случаях меньше частоты колебания соответствующего мономера.

В. Коряжкин

1960

ж. 1961. 7

1962

3854. Энергия отталкивания в ионных молекулах. Краснов К. С. «Ж. общ. химии», 1960, 30, № 11, 3844—3845. — Энергия связи в молекулах газообразных галогенидов щел. и щел. зем. металлов может быть вычислена на основе ионной модели. В этом случае энергия отталкивания вычисляется по ф-ле $A \exp(-r/p)$. По эксперим. данным для молекул галогенидов (r_e и k_e) щел. металлов вычислены значения P для катионов щел. металлов и галогенидов. Величины P для M^+ и значения эффективных зарядов щел. и щел.-зем. металлов были использованы далее для расчетов P для катионов M^{2+} . Вычисление энергий связей на основе полученных значений P дает среднее отклонение 2% для 20 молекул галогенидов и щел. металлов и 2,5% для 9 молекул галогенидов щел.-зем. металлов. С. Бацаков

Галогениды

щел. и

щел.-зем.

металлов

Энергия

связей

х. 1962.3

1960

4В39. Поправка к статье «Расчет энергии молекул галогенидов щелочноземельных металлов на основе ионной модели». Краснов К. С. «Докл. АН СССР», 1960, 134, № 5, 1000. — Указывается, что в работе Краснова (РЖФиз, 1960, № 4, 8273) в ф-лах (2) и (5) коэф. в выражении для поляризуемости равняется 3, а не 4. По утверждению автора, это не изменяет существа выводов, но повышает среднюю ошибку.

Ф.1961.64

11960
Коренькин В.Ф., Тайшевский В.И.

Монументальные построй-
ки духайловские мас-
кы ильичном расоче-
гов.

XIII совещ.

по строительству
л-д.

1960

7B108. О межатомном расстоянии в молекулах газообразных галогенидов щелочных металлов. Карпатьянц М. Х. «Ж. структурн. химии», 1960, I, № 4, 399—403. — Один из методов сравнительного расчета применяется к вычислению межатомных расстояний d в молекулах газообразных галогенидов щелочных металлов. При расчете использованы эмпирич. соотношения $d_{Me-X} = A_X d_{Me-Br} + B_X$ (I) и $d_{Me-X} = A_{Me} d_{K-X} + B_{Me}$ (II). Значения коэф. A и B найдены с помощью

см. н/об

пр. 1961.6

наиболее точных из имеющихся эксперим. данных. Показано, что расчет по (I) воспроизводит эксперим. значения d (11 в-в) со средней погрешностью $0,0023 \text{ \AA}$, причем она уменьшается до $0,0009 \text{ \AA}$, если ориентироваться на эксперим. значения $d_{\text{Rb-F}}$ и $d_{\text{Cs-F}}$. Средняя погрешность расчета по (II) составляет $0,0004 \text{ \AA}$, т. е. соизмерима с точностью эксперим. данных ($0,0001 \text{ \AA}$). Проведена оценка значений $d_{\text{Fr-X}}$ ($X = \text{F, Cl, Br, J}$) и $d_{\text{Me-At}}$ ($\text{Me} = \text{Li, Na, K, Rb, Cs}$). Для вычисления $d_{\text{Fr-X}}$ использовалось также соотношение $d_{\text{MeII-X}} = A d_{\text{MeI-X}}$, в котором сравниваются межатомные расстояния галогенидов щелочноземельных и щелочных металлов. Приведена таблица рассчитанных значений d .

Е. Пшеничнов

1960

Галогениды

щелочн.

металлов

5B54. О теории галогенидов щелочных металлов Паулинга. Varshni Y. P., Shukla R. C. On Pauling's theory of alkali halide molecules. «Proc. Phys. Soc.», 1960, 76, № 5, 794—797 (англ.).—Для расчета ангармоничности $\omega_e x_e$ и константы центробежного растяжения α_e галогенидов щелочных металлов использована двухчленная потенц. ф-ция типа Паулинга (первый член описывает кулоновское притяжение ионов, второй, пропорциональный r^{-n} , — короткодействующее отталкивание), параметры которой определены по эксперим. величинам ω_e , τ_e и B_e . Рассчитанные ω_e , x_e и α_e для большинства из 16 галогенидов оказываются больше экспериментальных. При этом использованный потенциал менее точен, чем потенциал с экспоненц. вторым членом.

Е. Никитин

фр. 1961.5

5,6,7,10 88. 1961

A-428

20 Nov. 1961.

Bulwicz E.M., Phillips L.F.,
Sugden T.M.

Trans. Faraday Soc., 1961, 57,
N 6, 921-931

Determination of ...

M.J

PX., 1962, 11653

orig.

ΔH_f ; Do (LiF, LiCl, LiBr, LiJ, NaF, NaCl, NaBr,
NaJ, KF, KCl, KBr, KJ, RbF, RbCl, RbBr, RbJ,
CsF, CsCl, CsBr, CsJ, GaCl, GaBr, GaJ,
InF, InCl, InBr, InJ, TlF, TlCl, TlBr,
TlJ, NiCl, NiBr, NiJ, MnCl, MnBr, MnJ,
CrCl, CrBr, CrJ)

Li - rarer

1961

Li X

Brewer L., Brackett R.

Na X

K X

Chem. Rev., 1961, 61, 4, 425.

Rb X

Cs X

Heppner
quency.

The dissociation energies of
gaseous alkali halides

1961

Занят.
цены,
металл.

S. Datz, W. T. Smith, E. H. Taylor
J. Chem. Phys. 34, 1961, 558, 42.

Молекулярная ассоциация
в жидком состоянии
ценных металлов.

Занят.
цен.
I мет.

1961

I.

Daniel C.

J. Phys. Chem., 1961, 65, N6,
1058-1059

65244. Энергия Гиббсована
гидрообратных галогенидов
щелочноземельных металлов.

абш. раунд, I ч.

1961

I

галогениды
цел. металлов

Rothberg G. M.,

J. Chem. Phys., 1961, 34, 2069 (нб);

Энергии связей молекул
целочных галогенидов

В рамках теории Томаса-Ферми обобщение отража-
ет собой часть теории ван-дер-Ваальса целочного иона и
иона галогена,

1961

I

15Б22. Исправление автора к статье «Энергии связей молекул галогенидов щелочных металлов». Rothberg G. M. Erratum. «J. Chem. Phys.», 1961, 35, № 3, 1137 (англ.). — К РЖХим, 1962, 5Б64.

х. 1962. 15

I

remained
yes,
mesurable

-New potential function for alkali halide molecules. Yatendra Pal Varshni (Natl. Research Council, Ottawa, Can.) and Ramesh Chandra Shukla. *J. Chem. Phys.* 35, 582-7(1961).—The following potential function was suggested for the alkali halide mols.: $U = (-e^2/r) + P \exp(-kr^2)$, where P and k are consts. Values of α_e , $\omega_e x_e$, and the ionic binding energy D_i were derived for the following 3 functions: simple Born-Mayer potential, Rittner potential, and the potential suggested above. The results obtained with the new function were much better than those obtained with the Born-Mayer potential, but slightly inferior to those obtained with the Rittner potential.

Henry Leidheiser, Jr.

C.A. 1962. 56. 6
5532d

6Б95. Новая потенциальная функция для молекул щелочных галогенидов. Varshni Yatendra Pal, Shukla Ramesh Chandra. New potential function for alkali halide molecules. «J. Chem. Phys.», 1961, 35, № 2, 582—587 (англ.).—Экспериментальные значения постоянных α_e , $\omega_e x_e$ и D_1 (энергия диссоциации на ионы) двухатомных молекул галогенидов щел. металлов сопоставлены с вычисленными на основании функций Борна — Майера, Риттнера и вновь предложенного потенциала $U = -e^2/r + P \exp(-kr^2)$. Показано, что наилучшее совпадение получается для функции Риттнера, наихудшее — для функции Борна — Майера. Для этих двух функций заново вычислены постоянные отталкивания. Экспоненциальный член в предложенной функции удовлетворительно описывает не только отталкивание ионов в молекуле, но одновременно и притяжение, обусловленное индуцированными диполями и вандер-ваальсовыми силами. Кратко обсужден вопрос о виде члена, описывающего отталкивание ионов.

В. Коряжкин

I

гал.

ц. м.

х. 1962. 6.

1962

19 Б35. О молекулярных постоянных двухатомных молекул щелочных галогенидов. Коряжкин В. А., Татевский В. М. «Вестн. Моск. ун-та. Химия», 1962, № 2, 15—20

При предположении о применимости ионной модели к двухатомным молекулам галогенидов щел. металлов можно получить для них внутренне согласованную систему молекулярных постоянных, удовлетворительно согласующихся с экспериментом (D_0 , ω_e , $\omega_e x_e$, r_e и μ_e ; РЖХим, 1963, 15Б191). На основе ионной модели произведена оценка колебательных постоянных и коэф. ангармоничности для молекул, не имеющих в литературе эксперим. данных. На основании данных расчетов и удовлетворительного согласия с экспериментом нельзя еще сделать вывода, что связь в молекулах галогенидов щел. металлов является ионной. Как было показано, выражение, использованное Риттнером (Rittner E. S. «J. Chem. Phys.», 1951, 19, 1030), нуждается в поправке, чтобы оно описывало реальную потенциальную кривую. Следовательно, даже учет взаимной поляризации ионов не позволяет полностью согласовать расчет с опытом. С другой стороны, удовлетворительное согласие можно получить, вводя по-

Целые
галогениды
Вещи
Мол. вес
Получен
Модель
LiF и др.

X. 1963. 19

уикцию Морзе, которая, как известно, удо-
льно описывает потенциальные кривые не-
текул. По-видимому, реальные потенциалы
молекул галогенидов щел. металлов нахо-
у кривыми, приведенными ранее (Pittner
m. Phys.», 1951, 19, 1030), и кривыми Мор-
з из резюме авторов



1962

Лавровых
Угел. науки

Дыченко
Носовский

1) Molecular constants of diatomic molecules of alkali halides. V. A. Koryazhkin and V. M. Tatevskii. *Vestn. Mosk. Univ., Ser. II, Khim.* 17, No. 2, 15-20(1962). The equation for $W(r)$, applied by Rittner to calc. the dissocn. energy of a diat. mol. into ions, is discussed (CA 46, 792g). This equation does not represent the real potential curve, since real mols. do not dissoc. into ions but into neutral atoms. Hence, a modified equation is proposed: $U(r) = W(r) + [1 - F(r)](I_1 E)$, where I_1 = energy of free ions and E = energy of free neutral atoms. Even taking into account the mutual ionic polarization fails to give full agreement between calcn. and expt. On the other hand, satisfactory agreement is obtained by introducing a correction into the Morse function, which satisfactorily represents the potential curves for nonionic mols. Thus, the potential curves for mols. of alkali halides lie between those for the function $W(r)$ and the Morse one. On the basis of the ionic model of diat. mols. of alkali halides a system of mol. consts. (D_0 , ω_e , $\omega_e x_e$, r_e , and μ_e) is calcd. and exptl. confirmed. In the case of mols. with no literature data ω_e and $\omega_e x_e$ are estd. on the basis of the ionic model. 19 references.

Z. T. Bleszynski

C.A. 1962.57.9

10540 gh

1962

7 Д67. Молекулярные постоянные двухатомных молекул щелочных галогенидов. Коряжкин В. А., Татевский В. М. В сб. «Физ. пробл. спектроскопии. Т. I». М., АН СССР, 1962, 190—191
См. РЖФиз, 1962, 11В63.

ф. 1963.7

1982

7 Д68. Применение ионной модели для расчета колебаний молекул галогенидов щелочноземельных металлов. Краснов К. С., Максимов А. И. «Ж. структурн. химии», 1962, 3, № 6, 703—706

На основании ионной модели произведен расчет силовых постоянных и частот валентных колебаний для молекул галогенидов IIa группы. Необходимые для расчета коэф. отталкивания найдены независимым методом на основании правила аддитивности. Рассмотрены возможные причины отклонения от правила аддитивности в случае молекул с очень малыми межатомными расстояниями.

ф. 1963-7

1962

Cambridge

Massachusetts

Inscribed.

C. A. Gold

The molecular beam electric resonance spectra of some alkali halides. Lewis Peter Gold (Harvard Univ.). Univ. Microfilms (Ann Arbor, Mich.), Order No. 62-3538, 93 pp.; Dissertation Abstr. 23, 1204(1962). CA

C.A. 1963. 58.7

6351 B

X505 1962

$^{10}\text{Li}^7\text{Br}^{79}$, $^{10}\text{Li}^7\text{Br}^{81}$, $^{10}\text{Li}^7\gamma^{127}$
 $^{10}\text{Na}^{23}\text{Br}^{79}$, $^{10}\text{Na}^{23}\text{Br}^{81}$, $^{10}\text{Na}^{23}\gamma^{127}$
 $^{10}\text{K}^{39}\text{Br}^{79}$, $^{10}\text{K}^{39}\text{Br}^{81}$, $^{10}\text{K}^{39}\gamma^{127}$
 $^{10}\text{Rb}^{85}\text{Br}^{79}$, $^{10}\text{Rb}^{85}\text{Br}^{81}$, $^{10}\text{Rb}^{85}\gamma^{127}$
 $^{10}\text{Rb}^{87}\text{Br}^{79}$, $^{10}\text{Rb}^{87}\text{Br}^{81}$, $^{10}\text{Rb}^{87}\gamma^{127}$
 $^{10}\text{Cs}^{133}\text{Br}^{79}$, $^{10}\text{Cs}^{133}\text{Br}^{81}$, $^{10}\text{Cs}^{133}\gamma^{127}$

(Be, de, Fe, De, Fe,
we, we.x.c., ze, a, a.)

Rusk J. R., Gordy W.

Phys. Rev., 1962, 127, n 3, 817-830 (aerr).

Millimeter wave molecular beam spectroscopy: alkali bromides and iodides.

Pac News, 1963, 185/27

10

Лавочкин

1963

миллиметровых
составов.

Millimeter wave spectroscopy of the alkali halides in high-temperature molecular beams. James Rogers Rusk (Duke Univ., Durham, N. Car.). Univ. Microfilms (Ann Arbor, Mich.), Order No. 63-3605, 120 pp.; *Dissertation Abstr.* 24, 2097-8(1963).
SNDC

С. А. 1964. С. № 11509 б.

LiHal?

Norris W. G.

1963

Diss. Absts, 1964, 25, №3, 1604

ИК-спектр галогенида лиганд

Снят при выс. и малом разрешении
обусловлено не дано.

ВФ - 4380-Х

1964

Slingshaw H.

~~ли~~ ли
сродство
к эл-ну

D. Natter Lousch, 1964, 19a,
№6, 724

Определение ионизационных потенциалов и сродство к электрону целочисленных металлов и их соединений

I(ли)

галогениды
целочных
металлов

Lide D.R. и др.

1964

265

J. Chem. Phys.,
40, N1, 156

таблица
мол. коэф.
всех цел.
галогенидов.

Микроволновый спектр Lide

(см. Lide) III

Ladernight Li

1964

W.K.

The infrared spectra of the lithium halides. Wilfred Glen
Norris (Harvard Univ.). *Univ. Microfilms* (Ann Arbor, Mich.),
Order No. 63-7834, 177 pp.; *Dissertation Abstr.* 25(3), 1604
(1964)(Eng). SNDC

C.A. 1965. 62. 6

6016 b

1965

Raman spectra of alkali halides. R. S. Krishnan (Indian Inst. Sci., Bangalore). *Lattice Dyn., Proc. Intern. Conf., Copenhagen, 1963, 429-31*(Pub. 1965)(Eng). The 2nd-order Raman spectra of LiCl, NaCl, NaBr, NaI, KCl, KBr, KI, RbBr, CsBr, and CsI are discussed.
M. Elmslie

CA 1966, 64, 3
2883 h

LiCl
NaCl
NaBr
NaI
KCl
KBr
KI
RbBr
CsBr
CsI

12

X-6046

1965

M^+ , MJ^+ , M_2J^+ , $M_3J_2^+$, J^+ , MJ^+ ,

$M = \text{Li}, \text{Na}, \text{K}, \text{Rb}, \text{Cs};$

~~LiNaJ~~⁺, LiKJ^+ , LiRbJ^+ , LiCsJ^+

(A.P.)

Platel G.

J. chim. phys. et phys.-chim. biol.,
1965, 62, 110, 1176-1180

CA, 1966, 64, 110, 13397

Есть ф. м.

1965

Пропуск
исполнено
нефасов

Rotational spectroscopy of the alkali fluorides. Sidney Edwin
Veazey (Duke Univ., Durham, N. Car.). *Univ. Microfilms*
(Ann Arbor, Mich.), Order No. 65-6668, 90 pp.; *Dissertation*
Abstr. 25(12), 7326(1965)(Eng). SNDC

C. A. 1965. 63.9
10867 cd

Галогениды
щелочных
металлов.

Физ. и хим.
энергии

3 Б25. Функция потенциальной энергии молекул галогенидов щелочных металлов. Varshni Y. P., Shukla R. C. Potential energy functions for alkali halide molecules. «J. Molec. Spectrosc.», 1965, 16, № 1, 63—83 (англ.)

Для вычисления спектроскопич. постоянных α_e , γ_e , β_e , ω_{exe} и D_i галогенидов щел. металлов по ф-лам Данхема (Dunham J. L. «Phys. Rev.», 1932, 41, 721) применяются 4 разных потенциала: потенциал Риттнера (Rittner E. S. «J. Chem. Phys.», 1951, 19, 1030); две общие потенциальные функции $U = -e^2/r + Ar^n \exp(-ar)$ и $U = -e^2/r + B \exp(-kr^p)$, предложенные авторами, и потенциал Риттнера с учетом гиперполяризуемости. Сопоставлены таблицы значений α_e , γ_e , β_e , ω_{exe} и D_i , вычисленных с разными потенциалами для всех галогенидов щел. металлов. Показано, что потенциал Риттнера дает неправильные значения для γ_e и β_e ; учет гиперполяризуемости не приводит к улучшению, а два остальных потенциала приводят к лучшим значениям α_e , γ_e , ω_{exe} и D_i и к немного лучшему значению для β_e . М. Алиев

1965

Х. 1966. 3

1965

Лаборатория
Углеродных соединений

Физ. химия
Металлов

Potential energy functions for alkali [metal] halide molecules. Y. P. Varshni and R. C. Shukla (Univ. Ottawa, Can.). *J. Mol. Spectry.* 16(1), 63-83(1965)(Eng). The following 4 potential energy functions were examd. for alkali metal halide mols.: 2 general functions proposed here, the Rittner potential, and a modification of the Rittner potential by including a hyperpolarizability term. The Rittner potential gives poor results for γ_e and β_e , and the inclusion of the hyperpolarizability term makes the disagreement with the exptl. values greater: RCKP

C.A. 1965.63.3

2403g

1966

Ангармонизм
щелоч-
ных металлов

4 Б499. Ангармонические взаимодействия в галогенидах щелочных металлов. II. Cowley E. R., Cowley R. A. Anharmonic interactions in alkali halides II. «Proc. Roy. Soc.», 1966, 292, № 1429, 209—223 (англ.)

Методом работы (РЖФиз, 1964, 10Е133) на основе силовой модели VI работы (РЖХим, 1965, 5Б392) получены функции распределения частот $g(\nu)$ для кристаллов KBr и NaI , причем параметры этой модели подбирались так, чтобы удовлетворить нейтронографич. данным по дисперсионным кривым и векторам поляризации фононов (РЖХим, 1965, 5Б392). Найденны моменты $g(\nu)$ порядка $n = -3, 0, 3, 6$. Расхождение с опытом (РЖХим, 1961, 6Б376), особенно заметное для $n = 3, 6$, объясняется тем, что в последнем моменты $g(\nu)$ получены из данных по теплоемкости для всех т-р, в то время как авторы для нахождения $g(\nu)$ использовали нейтронографич. данные при одной т-ре. По $g(\nu)$ вычислены гармонич. вклады в свободную энер-

(кристаллы)

KBr

NaI

+2

см. Гал. 34.
мет.

2.194.4

гию (F), энтропию (S) и теплоемкость (C_v) при $0 < T < 400^\circ \text{K}$. Найдены сдвиги $\Delta(\lambda)$ частот фононов $\omega(\lambda)$ (где $\omega(\lambda) + \Delta(\lambda)$ — полюс однофононной функции Грина), связанные с изменением параметра решетки при тепловом расширении и — в 1-м неисчезающем приближении — с ангармонизмом 3-го и 4-го порядков. При вычислении последних вкладов использовалось приближение соседей с экспоненциальным межатомным потенциалом, параметры к-рого выбирались так, чтобы удовлетворить опытным данным по гармонич. упругим постоянным. Кроме того, в $\Delta_3(\lambda)$ учитывалась лишь 3-я производная этого потенциала. Вычислены линейные по $\Delta(\lambda)$ вклады ΔF , ΔS , ΔC_p , ΔC_v и $\Delta W(\exp(-W))$ — фактор Дебая — Валлера (анизотропные ангармонич. вклады в W не рассматривались) как функции T -ры, причем учтено то, что в нейтронографич. $\omega(\lambda)$ уже содержится эффект ангармонизма. Сравнение с экспериментом проведено для дебаевской T -ры ($0 < T \leq 100^\circ \text{K}$), $C_p + \Delta C_p$ ($100^\circ \text{K} \leq T < 300^\circ \text{K}$; РЖХим, 1958, № 18, 60121) и $W + \Delta W$ ($100^\circ \text{K} \leq T \leq 400^\circ \text{K}$; РЖХим, 1965, 19Б402), причем оказалось, что теоретич. кривые при высоких T -рах лучше ложатся на опытные, если не учитывать ангармонизма (величина $\lambda F/F$ очень мала даже при 400°K , а $\Delta S/S$ достигает 4%). Основной причиной этого расхождения, по мнению авторов, является грубый выбор межатомного потенциала при расчете $\Delta(\lambda)$.

Собщение I см. РЖХим, 1966, 6Б144.

В. Кашеев

1966

2 Д255. Исправление к статье «Длинноволновые ИК-спектры щелочных солей галогенидных комплексов металлов.» Fertel J. H., Perry C. H., Sabatini A., Sacconi L., Schettino V. Correction to paper «Long-wave infrared spectra of alkali salts of platinum halide complexes». «J. Phys. and Chem. Solids», 1966, 27, № 9, 1551 (англ.)

К РЖФиз, 1966, 5Д485.

ф. 1967. 20

Лаборанты Khaimenov A. P.,
участники Smirnov M. V.

1966

Tr. Inst. Elektrokhim., AN SSSR,
Ural. Filial, N 9, 3-7.

Structure of molten alkali
metal halides.

C. A. 1967. 67. 18

85573v.

Все
записки Tandon S.P., Tandon R.

1966

Li, Na, K, Z Phys Chem, (Leipzig), 1966, 231, 26

Rb и Cs.

(1-4)

Новое соотношение между

первой диссоциацией и энергией и/о.

или константы измерения
частоты поглощения

Из потенциальной функции
Сатерленда найдем соотно-
шение:

$$D_0 = \chi e (A + B \gamma e + C \gamma e^2)$$

1966

Laurence
weathers
against

Rotational magnetic moments of alkali halide molecules. F. Mehran, R. A. Brooks, and N. F. Ramsey (Harvard Univ.). *Phys. Rev.* 141(1), 93-104(1966)(Eng). The rotational magnetic moments of a number of alkali-halide molecules were measured by the molecular-beam magnetic-resonance technique. The gyromagnetic ratios in units of nuclear magnetons are ${}^7\text{Li}^{19}\text{F}$ (+) 0.07367 ± 0.00050 , ${}^{39}\text{K}^{19}\text{F}$ (-) 0.0364 ± 0.0012 , ${}^7\text{Li}^{35}\text{Cl}$ (+) 0.0848 ± 0.0032 , ${}^{85}\text{Rb}^{19}\text{F}$ (-) 0.0441 ± 0.0028 , ${}^6\text{Li}^{35}\text{Cl}$ (+) 0.1042 ± 0.0033 , ${}^{85}\text{Rb}^{35}\text{Cl}$ (-) 0.0183 ± 0.0018 , ${}^7\text{LiBr}$ (+) 0.0911 ± 0.0089 , ${}^{133}\text{Cs}^{19}\text{F}$ (-) 0.0621 ± 0.0055 , ${}^{23}\text{Na}^{127}\text{I}$ (+) $0.0268 \pm$

C.A. 1966. 64.6
7508h-7508a

0.0047, $^{133}\text{Cs}^{35}\text{Cl} (-) 0.0212 \pm 0.0011$. Only the abs. values were detd. exptl. However, the abs. values are reasonably consistent with the theoretical ones, so signs from the theory are listed in parentheses. For weak fields the mol. rotational magnetic moments do not correspond directly to the peaks of the resonance curves. A statistical analysis was carried out to det. the rotational g values from the peaks of the observed resonances. Since the correction is large (up to 50%), these results would be wrong by an amt. beyond the indicated exptl. error if the interpretation of the correction is not valid. No such uncertainty arises in the LiF measurements or in other rotational-moment measurements where the correction does not need to be made. The measured values detd. in accordance with this analysis are in good agreement with the predictions from a theory of Foley (CA 41, 7262e). The spin-rotational interaction const. of ^{19}F in $^{133}\text{Cs}^{19}\text{F}$ was measured by a new method as 13.5 ± 2.5 kc./sec.

RCPI

Таловен
Уел. мет

ВФ - Х - 5219

1966-
- 1967

Baba A.,
Acta Univ. Debrecen. Ludovico
Kossuth. Nom. Ser. Phys. Chem.
1966, 12, 9-20 (Publ 1967)

C.A. 1967, 67, N 6 25709 ●

1967

Зановендер
уелномар
мелановраер
м.т.

25709j Semistatistical calculation of the constants of alkali halide molecules. Agoston Baba (Kossuth L. Tud. Egyet. Elm. Fiz. Int., Debrecen, Hung.). *Acta Univ. Debrecen. Ludovico Kossuth Nom., Ser. Phys. Chim.* 12, 9-20(1966)(Pub. 1967) (Eng). The interaction potential between alkali and halide ions was detd. in the 1st approxn. of the Lenz-Jensen-Gombas (L. and J., *CA* 26: 5808) perturbation theory. The ds. employed were calcd. from the Slater (*CA* 24: 5604) and the Slater-Angus (A., *CA* 26: 4218) 1-electron wavefunctions. The model takes into consideration only the Coulomb-type interaction of nuclei and electron clouds and the kinetic energy of the electron cloud.

C.A. 1967. 67. 6

The equil. internuclear distance and the dissoen. energy were calcd. by the help of the potential. Except for the case of some alkali halides the value of dissoen. energy approximates the exptl. values with an accuracy of 1-10%, while accuracy is within 4% for the majority of mols. Internuclear distance falls within 1-8% of the exptl. values in this model. The values for dissoen. energy are generally lower than the exptl. data, while the equil. internuclear distance surpasses the observed values.

L. Somogyi

1987

9 Д231. ИК-спектры гексагалогенметаллатов (IV).
Brown D. H., Dixon K. R., Livingston C. M.,
Nuttall R. H., Sharp D. W. A. The infrared spectra
 of hexahalogenometallates (IV). «J. Chem. Soc.», 1967, A,
 № 1, 100—104 (англ.)

Получены ИК-спектры ($4000\text{—}250\text{ см}^{-1}$) ряда гексахлорметаллатов четырехвалентных металлов M_2MeCl_6 , где $M\text{—}K, Rb, Cs, Me\text{—}Ti, Sn, Pb, Pd, Os, Pt$ гексабромметаллатов M_2MeBr_6 , где $M\text{—}K, Rb, Cs, Me\text{—}Sn, Pd, Os, Ir, Pt$ и для гексафторметаллатов $K_2TiF_6, Cs_2TiF_6, Rb_2TiF_6, K_2GeF_6, Rb_2GeF_6$. Для всех соединений проведен рентгеноструктурный анализ. Все хлоро- и бромомкомплексы имеют кубич. структуру K_2PtCl_6 , исключая гексабромстаннат калия, который имеет тетрагональные искажения в структуре. Наблюдаемые в спектрах некоторых комплексов расщепления полос, относящихся к фундаментальным колебаниям, обсуждены с учетом точечной симметрии анионов.

Б. Жаданов

оп. 1987. 92

1967

Галогениды
щелочных
металлов

24 Б26. Ван-дер-ваальсова энергия взаимодействия галогидных соединений щелочных металлов. Chandra M., Sharan B. Van der Waals interaction energy for alkali halides. «Proc. Phys. Soc.», 1967, 91, № 1, 257—258 (англ.)

На основе новых данных по коэф. Ван-дер-Ваальса (РЖФиз, 1967, 2Д61) рассчитана энергия диполь-дипольного взаимодействия для всех галогенидов щелочных металлов. Результаты сильно отличаются от данных, полученных ранее. А. Ш.

x. 1967. 24

измерение
сечений

1967

12 Д267. Сечения УФ-поглощения для паров щелочных галондов. Davidovits P., Brodhead D. C. Ultraviolet absorption cross sections for the alkali halide vapors. «J. Chem. Phys.», 1967, 46, № 8, 2968—2973 (англ.)

Измерены сечения УФ-поглощения (2000—4000 Å) для паров щелочных галондов; из полученных эксперим. данных построены потенц. кривые. Рассчитанные времена жизни возбужденных молекулярных состояний равны $\sim 10^{-8}$ сек.

Ф. 1967. 122

Валоченков

Fajans K.

1967

иссл. сем.

Street. and. Bond,

3, 88-105

Сменен поперности и
взаимная поперность
полюсов в молекулах
валоченков целотных
металлов, $\delta\sigma$ и $\sigma\sigma$.



(См. $\delta\sigma$) III

~~RbF, RbCl, CsF, CsCl~~, NaI (w.h.) 1967

Lavas F. J. ¹⁴ ¹⁸ - 3981 8

Dissert. Abstr. 1968, B29(1), 315

Radio-frequency Stark spectra: rubi-
dium fluoride, rubidium chloride,

cesium fluoride, ~~cesium chloride, and~~

sodium iodide 9 ~~CA, 1968, 67, 126, 11496K~~

1987

Галогениды
щел. металлов

18 Б32. Коэффициенты ван-дер-Ваальса диполь-дипольного взаимодействия в галогенидах щелочных металлов. Lynch David W. On van der Waals dipole-dipole coefficients in alkali halides. «J. Phys. and Chem. Solids», 1967, 28, № 10, 1941—1946 (англ.)

х. 1968. 18

Lill (we, we, Be, re) ^{is} Ber-X 41.59 1967

Madcha R.L.,

J. Chem. Phys., 1967, 47 (11), 4595-606

Theoretical analysis of the electro-
nic structure and molecular
properties of the
J. Lithium chloride

"KINDO 9107
FOR OPD"
CA, 1968; 68, w12, 53478 x

W

o

1984

Лантаноиды
и актиноиды
и их соединения

35377j Fluorohalides of alkali metals. A. A. Opalovskii.
(Inst. Neorg. Khim., Irkutsk). *Usp. Khim.* 36(10), 1673-700
(1967)(Russ). Alkali metal halide di-, hexa-, and tetrafluorides,
their chemistry, properties, and spectral characteristics are
reviewed. 154 references. G. M. Kosolapoff

Обзор

Хим. ст-ва
спектр

C.A. 1968. 68. 8

Морские
универсальные
метаморф

М.Н., Де

А-1951
Оттава

Patel M. S.

1967

Patel M. S. et al

Indian J. Phys.,

1967, 41, n 4, 235-240

6 Б31. Теория полярных молекул на основе ионной модели. Tosi M. P., Doyama M. Ionic-model theory of polar molecules. «Phys. Rev.», 1967, 160, № 3, 716—718 (англ.)

Полуэмпирическая ионная модель, часто применяемая в динамич. теории кристаллов галогенидов щел. металлов, перенесена на двухатомные молекулы этих же элементов. Потенциальная энергия взаимодействия ионов в

двухатомной молекуле принята в виде $U(r) = -(e^2/r) - [m_+(r) + m_-(r)] e/2r^2 + (m_-(r) B(r)/2) + \varphi(r)$, где $m_-(r)$ и $m_+(r)$ суть дипольные моменты аниона и катиона: $m_-(r) = \alpha_- [-B(r) + e/r^2 + 2m_+(r)/r^3]$, $m_+(r) = \alpha_+ [e/r^2 + 2m_-(r)/r^3]$, α_- и α_+ — поляризуемости аниона и катиона; $\varphi(r)$ — короткодействующий потенциал отталкивания; $B(r)$ — поправка на неточность, введенная только в случае аниона; функция $B(r)$ связана с функцией $\varphi(r)$ соотношением

Взаимодействие
щел. металлов

М. П. До-
расчет

Х. 1968. 6

БФ - 3983 - 1

$$B(r) = (e^*/e - 1) e\phi(r)/2\alpha_- [\phi'(r_0) + 2\phi(r_0)/r_0],$$

где e^* есть эффективный заряд анниона и r_0 — параметр решетки. Рассчитаны равновесные межъядерные расстояния, дипольные моменты, энергии связи и частоты колебаний 16 двухатомных молекул галогенидов щел. металлов при использовании значений параметров модели, принятых для соответствующих кристаллов. Результаты находятся в достаточно хорошем согласии с опытом (за исключением случая LiI, для кристалла которого неизвестны эффективные заряды e^* ионов).

Т. К. Ребане

A-940

1967

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 бум.

Галогениды Nd, Y, Sc, La (менедер. расст.)

Галогениды Be, Mg, Ca, Sr, Ba; (Li) Na, K, Rb, Cs,
Mo, W, V, Nb, Zr, Hf (гмет-гмет)

Оксиды и сульфиды Zr, B, Ga, In, P, Sb, N, Al

 $ZrNO_3$, $NaNO_3$, Na_2CrO_4 , K_2CrO_4 , $CsSO_4$, $KReO_4$,
KOH, $AsOH$ (менедер. расст.)

Вилков Л.В., Рамбиди Н.Г., Смирidonov В.П.

И. структур. химии, 1967. 8, 786-812

10

галогениды

4

гидриды

щелочные

металлов

ВФ - 3982 - X

1968

11 Д118. Межатомный потенциал и некоторые свойства галогенидов щелочных металлов и молекул гидридов. Dass Lachhman, Saxena S. C. Interatomic potential and certain properties of alkali halide and hydride molecules. «Indian J. Pure and Appl. Phys.», 1968, 6, № 2, 102—104 (англ.)

По ф-ле для потенц. энергии, учитывающей электростатическое, ван-дер-ваальсово и поляризационное взаимодействия, а также отталкивание атомов, описываемое гауссовой кривой, вычислены энергии связи, вращательные и колебательные постоянные некоторых галогенидов щелочных металлов и некоторых молекул гидридов (все-

Ф. 1968. 112



го 24 молекулы). Результаты расчетов, а также доступные соответствующие эксперим. величины, взятые из литературы, приводятся в таблице. Согласно вычисленных величин с экспериментальными плохое. Сопоставление полученных результатов с результатами расчета по ф-ле, в которой отталкивание описывается простой экспонентой, показывает, что в случае двухатомных молекул простая экспонента лучше описывает потенциал отталкивания атомов, чем кривая Гаусса. В. А. Морозов

1968

Лаборатория Учен. Методов

Bp-3982-X

(d.n.)

Acres.

13065a Interatomic potential and certain properties of alkali halide and hydride molecules. Dass, Lachhman; Saxena, S. C. (Rajasthan Univ., Jaipur, India). *Indian J. Pure Appl. Phys.* 1968, 6 (2), 102-4 (Eng). Binding energy, rotational, and vibrational consts. of alkali halides and hydride mols. were computed on a potential function consisting of electrostatic, van der Waals, polarization, and Gaussian type of overlap, and compared with the available exptl. data. Exponential function is more appropriate than the Gaussian function to represent the overlap part of the interat. potential. RCXZ

C.A. 1968. 69.4

галогениды

и
гидриды
щел. метал.

В 97-3982-X

1968

22 Б27. Межатомный потенциал и некоторые свойства молекул галогенидов и гидридов щелочных металлов. Dass Lachhman, Saxena S. C. Interatomic potential and certain properties of alkali-halide and hydride molecules. «Indian J. Pure and Appl. Phys.», 1968, 6, № 2, 102—104 (англ.)

Для галогенидов и гидридов щел. металлов рассчитаны энергии связи, вращательные и колебательные постоянные с потенциальной функцией, содержащей электростатич., ван-дер-ваальсовый, поляризационный члены и гауссовый тип перекрывания. Полученные результаты сопоставлены с эксперим. данными. Авторы приходят к выводу, что с гауссовыми функциями получаются гораздо более плохие результаты, чем с применяемыми обычно экспоненциальными функциями.

Резюме

2. 1968. 2.2

+1



Заполнить при мет.

1968

Расчёт
 $D_0, \omega_e, \alpha_e;$

12 Д139. Применимость потенциальной функции Васастьерна для вычисления физических параметров. Gohel V. B. Applicability of the Wasastjerna potential function for evaluating physical parameters. «Indian J. Pure and Appl. Phys.», 1968, 6, № 4, 171—173 (англ.)

Для вычисления таких величин, как энергия диссоциации D_0 , колебательная постоянная ω_e и вращательная постоянная α_e двухатомных соединений щелочных металлов с галогенами, применена приближенная потенц. ф-ция Васастьерна (Wasastjerna J. A. «Phil. Trans.», 1938, 237, 105)

ф. 1968. 129

$$\Phi = -\frac{e^2}{r} + Cr^7 e^{-\beta r},$$

где C и β — параметры. Вычислены указанные величины для 18 молекул. Полученные результаты сравниваются с эксперим. значениями и величинами, вычисленными с использованием других потенц. ф-ций (Риттнера и Варшни — Шукла). Приводятся ф-лы для вычисления D_i , $\omega_e \chi_e$ и α_e . Для α_e результаты лучше, чем с другими ф-циями, для $\omega_e \chi_e$ несколько хуже, а для D_i равнозначны. Обсуждается применимость той или иной ф-ции в различных случаях. Е. И. Креденцер

Галогениды
щел. металлов

(перенос. ф. и)

(М. П.)

Оттиски А-1050

1968

3 Б41. Новая потенциальная функция для двухатомных молекул галогенидов щелочных металлов. Go-
hel V. B., Trivedi M. D. A new potential function for
alkali halide diatomic molecules. «Indian J. Pure and Appl.
Phys.», 1968, 6, № 4, 173—175 (англ.)

Для двухатомных молекул галогенидов щел. металлов предложена потенциальная функция вида $\Phi = -e^2/r + P/r \exp(-kr^2)$ (P и k — параметры) с учитывающим отталкивание членом нового типа, k -рый, как утверждает-
ся, должен более удовлетворительно учитывать поляриза-
цию и ван-дер-ваальсово взаимодействие. Рассчитанные
с помощью предложенного потенциала колебательные и
вращательные постоянные, а также энергии ионных свя-
зей находятся в лучшем соответствии с наблюдаемыми
(или вычисленными) величинами, чем найденные с ис-
пользованием других потенциальных функций.

Г. И. Карага

х. 1969. 3

1968

Udarekhiya - Udarkebya Ugarad.

(2 x 6)

ommueu A-1050

U. U. Ugarad.
Jharia.

46231d A new potential function for alkali halide diatomic molecules. Gohel, V. B.; Trivedi, M. D. (Sheth M. N. Sci. Coll., Patan, India). *Indian J. Pure Appl. Phys.* 1968, 6(4), 173-5 (Eng). A new potential function has been suggested for alkali halide diat. mols. and is of the form $\varphi = - (e^2/r) + (P/r) \exp[-kr^2]$, where P and k are the potential parameters. Values of the rotational consts. α_e , vibrational consts. ω_e , and the ionic binding energy D_e , derived by using the new potential function as well as the Rittner and the Varshni-Shukla potential functions have been compared with the observed values. The parameter values calcd. by using the new potential function are in closer agreement with the observed (or estd.) values as compared to values calcd. by using the other potential functions. 16 references. RCXZ

C. A. 1968. 69. 12

галогениды
щелочных
металлов

потенц.
ф-ция
и. и.;
D₀

4 Д102. Новая потенциальная функция для двухатом-
ных молекул галогенидов щелочных металлов. Go-
hel V. B., Trivedi M. D. A new potential function for
alkali halide diatomic molecules. «Indian J. Pure and
Appl. Phys.», 1968, 6, № 4, 173—175 (англ.)

Для двухатомных молекул галогенидов щелочных ме-
таллов предложена новая потенц. ф-ция вида $\varphi = -e^2/r +$
 $+ (P/r) \exp(-kr^2)$, где P и k — параметры. С помощью
этой ф-ции для восемнадцати различных молекул вычис-
лены вращательные постоянные α_e , колебательные по-
стоянные $\omega_e x_e$ и ионная энергия связи D_i . Полученные
значения α_e , $\omega_e x_e$, D_i сравниваются с эксперим. данны-
ми, а также со значениями этих же величин, получен-
ных с помощью потенциалов Риттнера и Варшни—Шак-
ла. Показано, что величины α_e , $\omega_e x_e$, D_i вычисленные с
помощью новой ф-ции, находятся в лучшем согласии с
экспериментом, чем величины α_e , $\omega_e x_e$, D_i , вычисленные
с помощью потенциалов Риттнера и Варшни—Шакла.
Е. В. Самуйлов

1968
А-1050
Оттиски

ф. 1969. 49

галогениды
щелочных
металлов

1968

3 Д182. Дипольные моменты и эффективные заряды двухатомных ионных молекул. Kachhava C. M. Dipole moment and effective charge of diatomic ionic molecules. «Indian J. Pure and Appl. Phys.», 1968, 6, № 3, 152—154 (англ.)

В предположении, что число поляризуемых электронов во всех родственных молекулах одинаково, рассчитаны величины дипольных моментов и эффективные заряды для всех галогенидов щелочных металлов.

В. Л. Лебедев

Ф. 1969. 39.

Димерные
молекулы
галогенов
металлов

отдел A-1303

1968

(105438+) Molecular constants of dimer molecules of alkali metal halides. Krasnov, K. S.; Morozov, E. V.; Timoshinin, V. S.; Danilova, T. G. (USSR). *Tr. Ivanov. Khim.-Tekhnol. Inst.* 1968, 36-47 (Russ). From *Ref. Zh.; Khim.* 1969, Abstr. No. 5B16. The binding energy and geometrical parameters of dimer mols. of alkali metal halogens were calcd. on the basis of the ionic model of a mol. with a variable repulsion coeff. ρ . Use of a variable ρ eliminated a series of contradictions, taking place as a result of calcn. with a const. ρ value. A simple ordinary valence system was used for evaluating the oscillation frequencies of dimer mols. Mol. consts. of all dimers of alkali metal halogens are recommended for calcg. thermodynamic functions.

NBRK

(D₂
молекулы)

C.A. 1969. 71. 22

оттиски А - 1303

1968

5 Б16. Молекулярные постоянные димерных молекул галогенидов щелочных металлов. Краснов К. С., Морозов Е. В., Тимошинин В. С., Данилова Т. Г. «Тр. Ивановск. хим.-технол. ин-та», 1968, юбилейн. вып., 36—47

На основе ионной модели молекулы с использованием переменного коэф. отталкивания ρ рассчитаны энергия связи и геометрич. параметры молекул димеров галогенидов щел. металлов. Применение переменного ρ устраняет ряд противоречий, имеющих место в результатах расчета с постоянным значением ρ . Простая валентная схема использована для оценки частот колебаний молекул димеров. Рекомендованы значения молек. постоянных всех димеров галогенидов щел. металлов для расчета термодинамич. функций.

Резюме

Димеры
галог. щел.
металлов

Х. 1969. 5

1968

Валентин
Иванов
Металлов

47632] Rittner's theory of alkali halide molecules. Pandey, Jata D.; Gupta, Satya P. (Univ. Allahabad, Allahabad, India). Univ. Allahabad Stud. (Chem. Sect.) 1968, 7-16 (Eng). Calcns. are described for detg. the binding energy D_i and the vibrational const. ω_e , X_e of alkali halide mols. by using the Gaussian form of the repulsive term in the Rittner potential. The binding energy was also calcd. for inverse term Rittner potential. The results are compared with the exponential type of potential. The agreement between obsd. and calcd. values are fairly good for the new potential (Gaussian term Rittner potential). Peter Coad

D_0
 $\omega_e X_e$

расчет

C.A. 1970. 72. 10

Лавренко
целочные
металлов

A-1301

1968

ф-уни
поиску.
Морту

(61059t) Potential energy functions of diatomic molecules (halides and hydrides of the Groups IA and IIA). Szoke, S.; Baitz, E. (Hung. Acad. Sci., Budapest, Hung.). *Acta Chim. (Budapest)* 1968, 57(2), 129-40 (Eng). Values of the proportionality const. $d = k_e r_e / (e_1 e_2 D_e)^{1/2}$, where k_e = force const., r_e = interat. distance, e_1 and e_2 are the electronegativities of the individual atoms, D_e = disocn. energy, were calcd. for alkali and alk. earth hydride and halide mols. The anal. deals with mols. in the gaseous state, which have predominantly ionic character. The interat. distances and disocn. energies of the diat. mols. studied are generally large. The mean electronegativities and the force consts. have the lowest values in the diat. cases. The d values are independent of the ionic-covalent character, and are const. for certain groups of mols. Though the

C.A. 1969. 70.1

+2

Y

different mol. properties change gradually in accordance with a loosely defined relation of the periodic system, the ratio seems to remain const., depending only on the electrons participating in the bond. In the halide and hydride groups treated, the metal takes part with s or sp hybrid electrons in the bond, giving rise to linkages of $s-p$ or $sp-p$ and $s-s$ or $sp-s$ character. The d values depend preponderantly on the metal component, and it is nearly indifferent whether the partner is taking part in the bond with an s or p electron. The Lennard-Jones parameters, a and ab , are given. The assumption that the parameter b is a const. independent of bond type, was justified. Potential energy functions arising from different principles were compared. The E. R. Lippincott type functions (1953) are satisfactory in the ionic as well as in the covalent area. JDJN

1968

260125000
1968. 11.11. 1968

1262042 Dipole moments of alkali halides by the electric deflection method. Story, Troy L., Jr. (Univ. of California, Berkeley, Calif.). 1968, 143 pp. (Eng). Avail. Univ. Microfilms, Ann Arbor, Mich., Order No. 69-15,008. From Diss. Abstr. Int. B 1969, 30(4), 1633. SNDC

1968. 11.11.

C. A. 1970. 72. 24

Галогениды
щелочных
металлов

1969

12 Д232. Перезаселение в ходе химической реакции. Термическая диссоциация молекул галогенидов щелочных металлов. Coplan M., Chernoch T., Berry R. S. Chemical overshoot thermal dissociation of alkali halide molecules. «Phys. Fluids», 1969, 12, № 5, Part 2, 118—119 (англ.)

спектр

Излагаются результаты исследования механизма термич. диссоциации двухатомных молекул галогенидов щелочных металлов в атмосфере аргона за фронтом отраженной ударной волны методом абсорбционной спектроскопии. Снимались развертки спектров поглощения продуктов реакции при $T \sim 2800^\circ \text{K}$. Анализ этих спектров, содержащих главную серию линий нейтрального цезия и континуум фотоотрыва Br^- показал, что первичными продуктами диссоциации, в основном, являются ионы Cs^+

ср. 1969. 12Д

⊕ I



и Вг^- . Отмечено, что поглощение в континууме Вг^- сначала быстро достигает максимума, а затем спадает, приближаясь к равновесной величине, тогда как поглощение в линиях нейтрального атома цезия растет медленно и монотонно. Наблюдалось трехкратное превышение конц-ии монов Вг^- над равновесным значением. Время ион-атомной релаксации составляет примерно 15 мсек.

Н. А. Генералов

галогениды щел. мет.

1969

Межъядерные

расстояния

9 Б862. Температурные коэффициенты и изменения межъядерных расстояний газообразных галогенидов щелочных металлов при различных температурах. Крестов Г. А., Клопов В. И. «Тр. Ивановск. хим.-технол. ин-та», 1969, вып. 11, 58—62

Разработан метод определения т-рных коэф. и изменений межъядерных расстояний газ. молекул, при помощи к-рого рассчитаны $(\partial r_T / \partial T)_p$ и Δr_T для 20 галогенидов щел. металлов в интервале т-р 298,15—3000° К. Обсуждена зависимость этих величин от т-ры, а также проведена сравнительная характеристика зависимостей $(\partial r_T / \partial T)_p = f(T)$ и $\Delta r_T = f(T)$ для одних и тех же соединений в кристаллич. и газ. состояниях. Резюме

X. 1970.9

1969

10471s Temperature coefficients and internuclear distances changes of gaseous alkali metal halides at various temperatures. Krestov, G. A.; Klopov, V. I. (USSR). *Tr. Ivanov. Khim.-Tekhnol. Inst.* 1969, No. 11, 58-62 (Russ). From *Ref. Zh., Khim.* 1970, Abstr. No. 9B862. A method for detn. of temp. coeffs. and internuclear distance changes of gaseous mols. was developed with which $(\partial r_T / \partial T)_p$ and Δr_T (r = internuclear distance) were calcd. for 20 alkali metal halides at 298.15-3000°K. The dependence of these values on temp. was studied, and $(\partial r_T / \partial T)_p = f(T)$ and $\Delta r_T = F(T)$ dependences were comparatively characterized for the same compds. in cryst. and gaseous states.

C.A. 1971. 4572

1969

Лебедев В.И.

М. Смерт. химии,

1969, 10, № 2, 324.

Талоченко
цр. металлов

Структура

(См. Талоченко
цр. металлов) III

72190w
ref. 72190w

1969

(20)

more -

check

72190w Mass spectra of ionic diatomic molecules. Nikolaev, E. N. (Nauch.-Issled. Khim. Inst., Leningrad, USSR). Khim. Vys. Energ. 1969, 3(6), 491-4 (Russ). The Franck-Condon principle was used to make a semiempirical calcn. of the relative intensity of the mol. ions in the mass spectra of alkali halide mols: Quant. ests. can be found for the temp. dependence of this intensity. The energies of disson. are calcd. for these mol. ions, and these are tabulated along with exptl. data.

GLJR

CIA 1970. 72. 19

M Hal

B97-4198-X

1969

~~118261~~ Binding energy of diatomic alkali halide molecules. Pandey, Jata D. (Univ. Allahabad, Allahabad, India). *Indian J. Chem.* 1969, 7(3), 251-3 (Eng). Three different potential functions, viz (1) Gaussian, (2) Born and (3) Born-Mayer, in which the repulsion term is of the inverse power or exponential or Gaussian type, were employed for the calcn. of binding energy of alkali halide diat. mols. The Gaussian potential appears to be generally superior to the other 2 functions for these mols.

RCDR

M-uzelorn.
meane

Heppner
charge

C.A. 1969. 70. 26

106. 1969
Свойства металлов (структура)
Окислы металлов, металлов
Рамбиди Н.Г. А-1358
Ж. Физ. Струк. Материалы, 1969, 10(1), 131

Молекулярная структура соединений
металлов металло-органических соединений
и окислов органических металлов.
10 10 9 СД 1102, 70, 522, 99777

1969

Хлориды
щелочных
металлов
(расплавы)

спектр
поглощ.

11 Б230. Спектры поглощения и структура расплавленных хлоридов щелочных металлов. Смирнов М. В., Ченцова Г. В. В сб. «Физ. химия и электрохимия расплавл. солей и шлаков. Ч. 1». Киев, «Наук. думка», 1969, 45—49

В т-рном интервале 800—1000° измерены спектры поглощения (270—300 нм) бинарных расплавов смесей хлоридов щел. металлов (Na, K, Rb, Cs). Установлено, что длинноволновый край полос поглощения смещается с изменением т-ры, а также с изменением соотношения компонентов. Обнаруженные особенности спектров интерпретируется в предположении образования комплексных анионов MCl_4^{3-} , прочность к-рых уменьшается в ряду от $NaCl_4^{3-}$ до $CsCl_4^{3-}$. В. Т. Калинин

X. 1970. 11

галогениды
щелочных
металлов

Вар-4856-2

1970

М. П.
дип. лон.

20 Б68. Классическая модель для колебательно возбужденных галогенидов щелочных металлов. Gri-
se R. Classical model for vibrationally excited alkali
halides. «Molec. Phys.», 1970, 18, № 4, 545-552 (англ.)

Для предсказания дипольных моментов (μ) и вращательных постоянных (B) колебательно возбужденных галогенидов щел. металлов применяется классич. модель с использованием правила квантования Бора. Результаты расчета (вплоть до $V=25-100$) приведены на графиках для всех возможных молекул. Аналитич. аппроксимацию функций $\mu(v)$ и $B(v)$ дают след. выражения: $\mu - \mu_e = \mu_1(v+1/2) + \mu_{11}(v+1/2)^2$, $B - B_e = \alpha(v+1/2) - \gamma(v+1/2)$. Получено хорошее согласие между рассчитанными величинами μ_1 , μ_{11} , α , γ и имеющимися (для $v < 5$) их эксперим. значениями. Е. Андреев

X. 1970.

20

Carochem
ref. list

BQ-4856-X

1970

gray. not.

~~1208947~~ Classical model for vibrationally excited alkali halides. Grice, Roger (Dep. Theor. Chem., Cambridge Univ., Cambridge, Engl.). *Mol. Phys.* 1970, 18(4), 545-52 (Eng). A simple classical model is employed to predict the expectation dipole moments and rotational consts. of vibrationally excited alkali halides. Results are given for all the alkali halides, and comparison with quantum calcs. (in the KX and CsX cases) and exptl. data show excellent agreement even down to low quantum nos. ($v < 5$).
RCFS

C.A. 1970. 72. 24

11 Д355. Видоизмененная форма потенциальной функции Риттнера для молекул галогенидов щелочных металлов. Gohel V. B. Modified form of Rittner's potential function for alkali hydride molecules. «Indian J. Pure and Appl. Phys.», 1970, 8, № 3, 139—141 (англ.)

Обсуждается точность простой потенциальной ф-ции Риттнера для молекулы галогенидов щелочных металлов. Ф-ция записана в виде суперпозиции кулоновского потенциала (ионная составляющая), экспоненциального потенциала отталкивания (эффект перекрывания) и поляризационного члена. Постоянные в двух последних членах рассматриваются как свободные параметры, определяемые по равновесному расстоянию, силовой константе и вращательной константе молекулы. Найденные таким путем ф-ции использованы для расчета констант ангармоничности ряда молекул. Расхождение между расчетом и экспериментом составляет менее 8%.

Е. Никитин

расчет
м.н.

9. 1970. 112

щелочные
металлы -
галогениды

1970

и строение

3 Б75. Электронное строение и динамический эффект Яна—Теллера R' -центров в галогенидах щелочных металлов. Inoue M., Saito R., Wang S. Electronic structure and the dynamic Jahn—Teller effect on R' centers in alkali halides. «Can. J. Phys.», 1970, 48, № 14, 1694—1707 (англ.)

Рассчитаны энергии основного и нескольких возбужденных состояний R' -центров в галогенидах щел. металлов типа NaCl. Использовалась модель, в которой R' -центр представлялся квазинепрерывной совокупностью F -центров. Установлено, что основное состояние обладает симметрией 3A_2 , а первым возбужденным состоянием, в которое разрешен оптич. переход, является дважды вырожденное состояние 3E . Общая форма полосы R' -центра объяснена динамич. эффектом Яна—Теллера в состоянии 3E .

А. А. Зембеков

Х. 1971. 3

1970

Me Hal
(Me = щел.)
(мет.)

метат.
взаимог.

Б Д157. Потенциальные функции межатомного взаимодействия для галогенидов щелочных металлов. Redington Richard L. Internuclear potential energy functions for alkali halide molecules. «J. Phys. Chem.», 1970, 74, № 1, 181—186 (англ.)

Приближенная межъядерная потенц. ф-ция для ионных двухатомных молекул имеет вид:

$$V = A \exp(-r/\rho) - e^2 \left[\frac{1}{r} + \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2r^4} + \frac{2\alpha_1\alpha_2}{r^7} \right] - \frac{C}{r^6}.$$

09. 1970. 62

изе.



Она содержит электростатич. и ван-дер-ваальсовское притяжение и борн-майеровский отталкивательный потенциал. Хафмейстер и Захрт (РЖФиз, 1968, 3Е14) получили значения ρ для двадцати галогенидов щелочных металлов из ур-ния $A \exp(-r/\rho) = K \Sigma S^2/r$, где S — интеграл перекрытия наружных электронов, вычисленный с волн. ф-циями свободных ионов. В работе показано, что эти значения ρ очень хорошо воспроизводят спектроскопич. данные, когда они используются в потенц. ф-ции $V_r = A_1 \exp(-r/\rho) + A_2 \exp(-r/2\rho) + A_3 \times \exp(-r/3\rho)$. Коэф. A_i связаны простым соотношением с эффективным зарядом и эффективным расстоянием. Эти соотношения включают четыре параметра для двадцати молекул. Полученные с помощью этих соотношений спектроскопич. константы имеют следующие средние ошибки: r_e (2%), D_e (3%), ω_e (6%). Борн-майеровский потенциал наиболее хорошо описывает молекулы, в которых ионы имеют сходные размеры и атомные числа, т. е. NaF или KCl, но плохо описывает молекулы, в которых ионы сильно отличаются по размерам и атомным числам, т. е. LiI или CsF. А. П. Калинин

59258e Internuclear potential energy functions for alkali halide molecules. Redington, Richard L. (Dep. of Chem., Texas Tech. Univ., Lubbock, Tex.). *J. Phys. Chem.* 1970, 74(1), 181-6 (Eng). Hafemeister and Zahrt have obtained values for ρ for 20 diat. alkali halide mols. by fitting the equation $A \exp(-r/\rho) = K \Sigma S^2/r$, where S is the overlap of the outer shell free ion wave functions. These ρ values reproduce the spectroscopic data very well when used in an overlap potential energy function of the form $V_r = A_1 \exp(-r/\rho) + A_2 \exp(-r/2\rho) + A_3 \exp(-r/3\rho)$. The coeffs., A_1 , correlate simply with effective charge and effective distance parameters that are independent of the data. The correlation requires 4 parameters for the 20 mols. and returns 60 spectroscopic consts. with approx. the following av. errors: r_e (2%), D_e (3%), ω_e (6%). The overlap potential function suggests that the simple Born-Mayer expression holds best with ions of similar size and at. no., e.g., NaF or KCl, but is poor for dissimilar ions, e.g., LiI or CsF.
RCKG

C.A. 1970

72.12

Потенциальные
кривые
галогенидов
щелочных
металлов

1970

Потенциальные
кривые

13 Б41. Потенциальные кривые для молекул галогенидов щелочных металлов. Redington Richard L. Internuclear potential energy functions for alkali halide molecules. «J. Phys. Chem.», 1970, 74, № 1, 181—186 (англ.)

Предложено, четырехпараметрич. выражение для обменной части потенциала взаимодействия галогенидов с атомами щел. металлов. При этом спектроскопич. св-ва двадцати молекул описываются с точностью 2—6%.

С. Я. Уманский

Х. 1970.

13

Галогениды
щелочных
металлов.

Диссоции-
ция

Ф. 1971. 820

1971

8 Д310. Пересечение потенциальных кривых при диссоциации галогенидов щелочных металлов, обусловленной столкновением. Ewing J. J., Milstein Richard, Berry R. Stephen. Curve crossing in collisional dissociation of alkali halide molecules. «J. Chem. Phys.», 1971, 54, № 4, 1752—1760 (англ.)

Изучен процесс диссоциации галогенидов щелочных металлов в аргоне с целью выяснений, приводит ли диссоциация, обусловленная столкновением, к возникновению ионов и атомов или смеси обоих видов продуктов. Метод измерения основан на изучении временного спектра поглощения паров, нагретых с помощью ударной волны (падающая ударная волна обеспечивает получение паров галогенидов щелочных металлов, а в отраженной волне происходит диссоциация). Представлены эксперим. данные, показывающие, что галогениды

(+1) I

☒

Cs, Rb и K, за исключением двух соединений с йодом диссоциируют в основном с образованием ионов; соли лития, а также NaJ и NaBr диссоциируют в основном с образованием атомов; другие галогениды (KJ, RbJ, NaCl и возможно NaF) диссоциируют с образованием смеси ионов и атомов. Отношение числа пар атомов к числу пар ионов интерпретируется в зависимости от эффективной ширины адиабатич. канала диссоциации. Измерения были выполнены для нескольких величин давлений и т-р для большинства из вышеупомянутых солей. Первичный механизм диссоциации не зависел от величины давления и т-ры (исключением является NaCl).

А. П. Калинин

Галогениды
щелочных
металлов

ст. А-1747

1971

5 Б79. Энергии основного колебательного уровня в молекулах галогенидов щелочных металлов. Tanttila W. H. Fundamental vibration energies in alkali halide molecules. «J. Mol. Spectrosc.», 1971, 39, № 1, 168—170 (англ.)

Предложен приближенный метод расчета основных частот колебаний молекул галогенидов щел. металлов, потенциал взаимодействия к-рых состоит из кулоновского притяжения и короткодействующего отталкивания; последнее в рамках предлагаемой модели заменяется потенциалом жесткой стенки при равновесном расстоянии r_e . Строя касательную к кулоновской части потенциала в точке r_e и отражая ее в вертикальной прямой, проходящей через r_e , получают модельный потенциал, составленный из этих двух пересекающихся прямых. Полученный потенциал аппроксимируется параболой, определяющей частоту ω_e осциллятора. Найденные величины ω_e сравниваются с лит. данными.

А. Зембеков

X-1972-5

Тамочисли
целочных
металлов

остуек A-1747 1981

первич
колеб.
сост.

(5962u) Fundamental vibration energies in alkali halide molecules. Tantttila, W. H. (Dep. Phys. Astrophys., Univ. Colorado, Boulder, Colo.). *J. Mol. Spectrosc.* 1971, 39(1), 168-70 (Eng). Energies of the low-lying vibrational states of ionic alkali halides mols. are well predicted by using an harmonic potential not fitted to the Morse potential. The model approximates the form of the repulsive potential as an infinite potential barrier and enables one to calc. simple the force consts. or energies of the 1st excited vibrational states of the mol. The model assumes that, for an object trapped by a short-range and a long-range potential, the oscillation frequency is detd. primarily by the long-range potential.

C.A. 1981. 45 8


Мех
механика.
Х-растор.

Tandila W.H.

1971

J. Mol. Spectr. 1971, 39(1), 168-170

Fundamental Vibration Energies
in Alkali Halide Molecules.



$$\omega_e = \frac{6260.4}{\sqrt{r_e^3 \mu}}$$

$r_e [\text{\AA}]$

где μ — масса ядра, μ — масса электрона



1371

Классификация
цел.
металлов

1) 16 Б96. Исследование диссоциации галогенидов щелочных металлов при столкновениях в скрещенных молекулярных пучках. Tully F. P., Lee Y. T., Bergu R. S. Crossed molecular beam study of collision-induced dissociation of alkali halides. «Chem. Phys. Lett.», 1971, 9, № 1, 80—84 (англ.)

Методом скрещенных молек. пучков исследована энергетич. зависимость сечения диссоциации молекул CsJ, CsBr и RbJ на ионы при столкновениях с атомами Хе. Т-ра термич. пучка молекул варьировалась в интервале 1160—1650° К, а энергия атомов Хе в сверхзвуковом пучке достигала 11 эв. Сечения диссоциации резко возраста-

Диссоциация

X. 1371.16

ют от порогов, равных энергиям образования ионных продуктов, и достигают величины $\approx 10 \text{ \AA}^2$ при избытке энергии над порогом 1 эв. При фиксированной энергии налетающих атомов Хе сечение резко зависит от т-ры, если относит. энергия близка к пороговой. Обращение приблизительно экспоненциальной т-рной зависимости сечения позволяет построить энергетич. зависимость сечения диссоциации от внутренней энергии молекулы. Эта зависимость оказывается более крутой по сравнению с моделью жестких сфер. Приближенный анализ фрагментов диссоциации по энергиям показывает, что в диссоциацию большой вклад вносят неколинеарные столкновения, причем удар со стороны легкого атома молекулы более эффективен в индуцировании диссоциации.

Е. Никитин

$\Delta H, D_0$ (расчет. мет)

108.

A-2041 1972

Bhattacharyya S., Bhattacharya A.,
Int. J. Quantum Chem., 1972, 6,
N5, 935-48 (англ.)

Theoretical calculations on
sigma - systems. III. Alkyl
halides and alkanes. 6

10, II



(см. примеч.) CH, 1972, 77, 120, 1309/10x

щелочные, галогениды.

1972.

молек.
парам.
Т.г.ф.

158264p Thermodynamic functions and molecular parameters of orthorhombic dimeric molecules of alkali metal halides. Krasnov, K. S.; Solomonik, V. G.; Morozov, E. V. (Ivanov. Khim.-Tekhnol. Inst., Ivanovo, USSR). *Teplofiz. Vys. Temp.* 1972, 10(4), 760-4 (Russ). The mol. parameters of orthorhombic alkali halides M_2X_2 were detd. and the thermodynamic functions of the gaseous phases were calcd. at 298-5000°K. Internuclear distances r_{MX} were calcd. by $r_{MX} = 1.075r_e$ (internuclear distance in diat. mol.) which is true for Li_2X_2 . Vibrational frequencies were evaluated by the model of valence forces. The frequency of normal vibrations of 20 M_2X_2 mols. were calcd.

С.А. 1972. 77. N 24.

(+1) ☒

Исследования. Записки.

1972

9 Б152. Линейная экстраполяция уровней колебательной энергии ионных молекул. Patel M. M., Go-hel V. B. Linear extrapolation of the vibrational energy levels of ionic molecules. «Indian J. Pure and Appl. Phys.», 1972, 10, № 6, 476—477 (англ.)

Для ряда двухатомных молекул галогенидов щел. металлов вычислено отношение D_i/D_{lin} , где D_i — энергия диссоциации на ионы $D_i = D_0 + I - E$ (D_0 — энергия диссоциации молекулы на нейтр. атомы, I — потенциал ионизации атома металла, E — сродство к электрону атома галогена), $D_{lin} = \omega_e^2/4 \omega_e x_e - 1/2 \omega_e$ — величина энергии диссоциации молекулы, вычисленная путем линейной экстраполяции колебательных уровней энергии. Для большинства молекул галогенидов щел. металлов, кроме RbF (I) и CsF (II), отношение D_i/D_{lin} найдено равным $\sim 2,4$. Для I и II это отношение равно 1,0. Предположено, что небольшие отклонения для отношения D_i/D_{lin} от величины 2,4 связаны с неопределенностями в эксперим. значениях D_e и E , а большие отклонения для I и II связаны, по-видимому, с ошибками в эксперим. значениях ω_e и $\omega_e x_e$. А. П. Александров

X. 1973. № 9

X
2656-69

2х ат. щелочн. галогениды

1972

NaCl

4 Д143. Кривые потенциальной энергии для двухатомных галогенидов щелочных металлов. Patel M. M., Gohel V. B. Potential energy curves of alkali halide diatomic molecules. «Z. Naturforsch.», 1972, 27a, № 8-9, 1227—1228 (англ.)

По методу Ридберга—Клейна—Риса с использованием известных спектроскопич. данных сконструированы кривые потенц. энергии для молекулы NaCl и других двухатомных галогенидов щелочных металлов. Эти потенциалы сравниваются с шестью различными эмпирическими потенц. ф-циями, наиболее часто используемыми в практике. Найдено, что наилучшим образом сконструированные потенциалы совпадают с модифицированным потенциалом Ритнера $(-e^2/r) + A \exp(-r/\rho) - (\alpha/r^4)$. Б. Ф. Горднен

кривые
потенц.
энерг.

Ф. 1973 №4

Щелочи., фториды

1972.

10 В16. О линейных димерах фторидов щелочных металлов. (Энергетика и строение). Морозов Е. В., Соломоник В. Г., Краснов К. С. В сб. «III Всес. симпоз. по химии неорган. фторидов, Одесса, 1972». Б. м., 1972, 30—32

Х. 1973. № 10

Лаборатория теорет. хим. 2-й эт. (Do, Vi, 1971)
молекулы (cur. n. pariem)

Sarma C.R., (A-1980) 1972

J. Phys. B: Atom and Mol. Phys.,
1972, 5, N4, 761-765 (asus.)

Semiempirical evaluation of
single bond properties in
diatomic molecules.

Pic Xue, 1972, 19527 (cur. opinion) 10

Меморные
расчеты.

1973.

L. Andrews.
R. Smardzewski

(Tonic
dipol. mom.)

"J. Chem. Phys." 1973, 58,
N 6, 2258-61.

3 0717.8866

TF, Ch

из електронна таблица

(M. n)

402.92

X 4-1052

Brumer P., Karplus M.

Perturbation theory and ionic models for
alkali halide systems. I. Diatomics.

"J.Chem.Phys.", 1973, 58, N 9, 3903-3918

(англ.)

0917 БИК

895 896

9 1 2


ВИНИТИ

Молекулярная физ. и хим., (м.ч.
заможенков и Н₂ (т.е, До)

A-2588

Hooydonk G. van,
Z. Naturforsch., 1973, 28a,
N 11, 1836-42.

10 ^{св}
опи



фториды
щелочных
металлов.

состоянии
поведения

1973
Kushawana V.S.

"Indian J. Pure and
Appl. Phys."
1973, 11, N1, 63-66.

(ссыл. P.; III);

M_2X^+ , M_2X (I, потенц. кривые) 1973
M - излож. металлы A-223,
X - галоген: Lin S. M., Wharton J. G.,
Grice R., собр. ср. к.
Mol. Phys., 1973, 26, N2, 317-328.
10 (англ.)
Potential energy surface
for the M_2X^+ ion and the
ionization potentials of M_2X .
Физ. Хим., 1974, 4623 10 (ан. оригинал)

Изменения целочных (функции) 1973
металлов и потенц.
энергии

Misra K.D., Shrivastava M.N., (A-2156)

Z. Phys. Chem. (Frankfurt am Main)
1973, 83, N1-4, 188-99 (англ.)

Ionic Rydberg function for
alkali halides.

Есть Ф. Н.

10

(см. Φ (см. LiF ; μ))

(англ. оригинал) CA, 1973, 78, 122, 1413, 1511

Монокристаллы и молекулярные ИА и IIIA групп (М.Н. Бибичев.) 1973
Miller C.E., Finney A.A., Yuman F.W.

[A-209-1] Atom. Data, 1973, 5, N1, 1-49 (англ.)
Rotational and hyperfine structure constants for groups IA and IIIA monohalide and monohydride molecules
Рос. Дел., 1973, 18 5231 7 (см. оригинал, 10. 9)

Лаборатория физ. эл.-мов (физ. хим. энергии) 1973
(A-2240) (X4-1731) 1064
Patel 'M. M.', Gohel V. B., A-2240

Indian J. Pure Appl. Phys., 1973,
11, N1, 60-1 (англ.)

Varshni and Shukla's potential
energy functions for alkali
halide diatomic molecules.

10 ① (англ. оригинал) EST CA, 1973, 49, N8, 460274

Залогенны
целостн. металл-в

1973

36917z Covalent character of alkali metal halides from x-ray photoelectron [XPS] spectroscopy. Parry, D. E.; Tricker, M. J. (Edward Davies Chem. Lab., Univ. Coll. Wales, Aberystwyth, Wales). *Chem. Phys. Lett.* 1973, 20(1), 124-6 (Eng). A simple anal. of XPS data yields partial charges on atoms within a solid sample. A knowledge of abs. binding energies is unnecessary. Results for some alkali metal halides are presented.

8-1169

*

C.A. 1973. 79 N 6

Щелочные, галогениды

1973

12 Б18. Расчет галогенидов щелочных металлов с помощью модели зарядов связей. Ram R. S., Upadhyaya K. N., Mishra P. C. Bond-charge model calculations on the alkali halides. «Indian J. Pure and Appl. Phys.», 1973, 11, № 5, 351—353 (англ.)

Исследована предложенная ранее модель эффективных зарядов связей (см. РЖХим, 1969, 9Б20), позволяющая определить эффективные значения заряда связи q и спец. параметра v , характеризующего длину связи, на основе теоремы вирнала и простых электростатич. соображений. Параметры q и v , однозначно определяемые по значениям равновесных межъядерных расстояний, частот основных колебаний и дипольных моментов, рассчитаны для двухатомных молекул галогенидов щел. металлов. Отмечено, что при фиксированном атоме металла имеется линейная зависимость между дипольным моментом и величиной q . Кроме того отмечена закономерность изменения q с ростом ионного характера связи.

В. И. Пупышев

расчет

2.1974

N12

Li_3Cl_3 ; Li_3Br_3 ;
 Na_3F_3 ; Na_3Cl_3 ; Na_3Br_3 ;
 K_3F_3 ; K_3Cl_3 ; K_3Br_3 ; K_3I_3

1973
 (via
 через.
 оп-ции) 1792

Соломонов В. Т., Дамасова М. Т.,
 Док. физ. хим., 1973, 47, N4, 1063 (русск.)

10
 ⑤ Исследования по составу и пер-
 сональным вопросам. МЗХЗ (М=
 моль, г/моль, т.м.д., X = мо-
 л. вес).
 1973, 49, N6, 35773C

Li_2F ; Na_2Cl ; RbKCl ; LiKBr (поверх.) 1973
исскрх.

Struwe W.S., 8232

Mol. Phys., 1973, 25, N4, 777-803 (англ.)

Semiempirical pseudopotential
surfaces for chemical reactions.
(AB)⁺X⁻ dialkali halide systems.

10 ⊕ (сост. оптимизация)

CA, 1973, 79, N20, 118 & 461k

Галогениды щелочн. металлов. 1973

/ 8 Д161. Новый потенциал взаимодействия для двух-атомных молекул галогенидов щелочных металлов.
Thakur K. P. New interaction potential for diatomic alkali halide molecules. «Indian J. Pure and Appl. Phys.», 1973, 11, № 8, 549—551 (англ.)

потенциал
взаимод.

Показано, что предложенный ранее потенциал (M. M. Patel, V. B. Cohel, M. D. Trivedi, «Chem. Abstr.», 1968, 68, 6411) неправильно описывает внутримолекулярное взаимодействие для молекул галогенидов щелочных металлов. Для описания этого взаимодействия предложен новый потенциал

$$U = \frac{e^2}{r} + C \ln \left(1 + \frac{P}{r^4} \right),$$

М.С

где r — расстояние между взаимодействующими ионами, C и P — константы. Величины энергии связи и сродства к электрону атомов галогенов, вычисленные с использованием этого потенциала, находятся в хорошем согласии с эксперим. данными. Б. Ф. Горднец

Ф. 1974. № 8

Вановенушн мѣрн. мемаров. 1973

74481f New interaction potential for diatomic alkali halide molecules. Thakur, K. P. (Chem. Dep., Allahabad Univ., Allahabad, India). *Indian J. Pure Appl. Phys.* 1973, 11(8), 549-51 (Eng). The modified Gaussian potential function given by M.M. Patel, et. al, (1968) leads to variations of the potential energy, and the force between 2 unlike ions as functions of the internuclear distance that are unacceptable for the alkali halide molecules. As an alternative to this function, a new repulsive term, $C \ln[1 + (p/r^4)]$ (C and p are consts.), is proposed to describe the repulsion of the nuclei in diat. alkali halide molecules. This new function leads to potential-energy and force curves that are acceptable for the alkali halides. The values of the binding energies of the alkali halide molecules and the electron affinities of the halogen atoms calculated with this new potential agree satisfactorily with the experimental values.

р-ушн
номени.
мѣрн

C.A. 1974. 80. N14

мѣрн.

A-2583

1973

Do (расчёт для эргономистов и др.
металлов)

Туров И.И.

по всем //

Phys, Rev. A: Gen. Phys, 1973
V 8, №2, 612-20

10
серб. гр. л.

Заголовок 2х амаль
узелов

1974

159151u Combination rules and relations in repulsive potential parameters for alkali halide diatomics. Brumer, Paul (Dep. Chem., Harvard Univ., Cambridge, Mass.). *Phys. Rev. A* 1974, 10(1), 1-8 (Eng). The repulsive-interaction parameters, of the 2 previously described (B. and M. Karplus, 1973) model potentials for diat. alkali halide mols. (MX), were formulated in terms of the contributions (ρ_i) of the individual ions. The ρ_i values correlate linearly with the position of the outermost peak of the electron-d. distribution of the ion. A similar trend is observed in the single-ion contributions to the range parameter for the square of the M-X overlap. The ρ_i values differ for the 2 models, although the combination rules are equally well obeyed. Single-ion contributions to the preexponential factors, soft-sphere radii, and repulsive interaction potentials for M-M and X-X are briefly discussed.

C.A. 1974 81 N24

Галогениды щелочных металлов

1974

4 Б79. Комбинационные правила и корреляции для параметров отталкивательных потенциалов галогенидов щелочных металлов. Brumer Paul. Combination rules and correlations in repulsive potential parameters for

збуж

х. 1975. N 4

alkali halide diatomics. «Phys. Rev. A: Gen. Phys.», 1974, 10, № 1, 1—8 (англ.)

Рассмотрены возможности комбинац. представления параметров отталкивательной части потенциалов взаимодействия галогенидов (X) щел. металлов (M) для двух типов потенциалов $V_{MX}^{T-Ritt}(R) = A_{MX} \exp(-R/\rho_{MX}) - 1/R - (\alpha_M + \alpha_X)/2R^4 - C_{MX}/R^6$ и $V_{MX}^{DD}(R) = [A'_{MX} + B_{MX}(\alpha_X - \alpha_M)/2R^2] \exp(-R/\rho'_{MX}) - 1/R - (\alpha_M + \alpha_X)/2R^4 - C_{MX}/R^6$. В обоих случаях можно представить параметр в экспоненте ρ_{MX} (или ρ'_{MX}) в виде суммы членов, относящихся к индивидуальным ионам $\rho_M + \rho_X$, причем каждое слагаемое коррелирует с величиной ионного радиуса. Предэкспоненциальный параметр A_{MX} (или A'_{MX}) можно представить в виде $A_{MX} = \sqrt{A_{MM}A_{XX}}$. Представить столь же простым образом коэф. B_{MX} не удастся.

А. В. Немухин

(протонный спектр) 106. 1974

Щелочные галогениды A-2683

Berkowitz J., Behmer J. L.,
Walker T. E. H.,

J. Electron. Spectrosc. Relat.

Phenomena, 1974, 3 (4), 323-5.

Photoelectron spectra of alkali
halide vapors.

1076 CP-K

C. A. 1974. 80. N24. 1392135

(см. опущенный)
10 Ф

Ионные молекулы щел. галогенидов, 1974

Потенц.
Кривые

2 Д95. Использование аппроксимант Падэ для построения адиабатических кривых потенциальной энергии ионных молекул. Jordan K. D., Kinsey J. L., Silbey R. Use of Padé approximants in the construction of diabatic potential energy curves for ionic molecules. «J. Chem. Phys.», 1974, 61, № 3, 911—917 (англ.)

Описан метод построения адиабатических потенц. кривых ионных молекул (галогенидов щелочного металла), использующий аппроксиманты Падэ и ограниченное число первых коэф. разложения потенциала по Данхэму. Анализ пересечений термов не проводится, продуктами диссоциации молекул считаются ионы. Проведено сравнение результатов вычислений следующих коэф. Данхэма и энергий диссоциации ионных молекул с аппроксимантами Падэ разных порядков и с результатами экспериментов и других модельных расчетов. Предложенный метод сопоставлен с имеющимися методами построения потенц. кривых ионных молекул. А. Радциг

Ф. 1975. №2

Щелочные галогениды

1974

11 Д724. Спектры хемилюминесценции в реакции щелочных металлов с галогенами. Oldenborg R. C., Gole J. L., Zare R. N. Chemiluminescent spectra of alkali-halogen reactions. «J. Chem. Phys.», 1974, 60, № 10, 4032—4042 (англ.)

Спектры
Хемилюминесценции

(см. наброски)

Ф. 1974. № 11

С высоким разрешением ($< 5 \text{ \AA}$) получены спектры хемилюминесценции (ХЛ) реакций типа $M_2 + X_2$ (или XY) $\rightarrow MX^* + MX$ (или MY), где $M = K, Rb, Cs$; $X_2(XY) = Cl_2, Br_2, I_2, JBr, JCl, ClF$; при этом пучок атомов M (содержащий и молекулы M_2) проходил сквозь газообразный галоген при давлении $\sim 10^{-3} \text{ мм}$. Спектры (в видимой области) интерпретированы как переходы между связанными или квазисвязанными колебательными уровнями гомеопольного верхнего состояния, имеющего неглубокую потенц. яму, и верхними колебательными уровнями ионного основного состояния. Обсуждается четырехцентровый механизм данных реакций. Наблюдается также испускание атомов M , механизм возбуждения которого скорее всего отличается от такового для молекулярной ХЛ. И атомная, и молекулярная ХЛ согласуются с механизмами, включающими перескок электрона.

Резюме

40906.1870

Ph, TC, Ch

Ученые
записки

40892 02

1974

2365

Ornbrod R.C., Powers T.R., Rose T.L. Mole-
cular-beam photodissociation studies of al-
kali iodides.

"J. Chem. Phys.", 1974, 60, N 12, 5109-
5111

(англ.)

0186 1974

152 156

ВИНИТИ

2x atomn. mol.-dvi 8540-X 1974
uslozhnye zashchity

nomer
v zashchite

168765r Interaction potential for diatomic molecules. Thakur, Kailash P.; Pandey, Jata D. (Dep. Phys. Chem., Univ. Allahabad, Allahabad, India). *J. Chim. Phys. Physicochim. Biol.* 1974, 71(6), 850-3 (Eng). The proposed new potential-energy function, $U(r) = -(e^2/r) + C \log[r/(4r - p)]$ (r = internuclear sepn., e = electronic charge, C and p are consts.), satisfactorily describes the potential-energy and force curves of the alkali halide mols. The binding energies, electron affinities, Grueneisen parameters, and Anderson-Grueneisen parameters of the alkali halides that were calcd. by using the relation agreed satisfactorily with the available exptl. data.

Bop-8540-X

C.A. 1975. 83 N20

Газофизический институт
Ленинград

1974

напр.
номер

V35223v Interionic pair potentials in the alkali metal halides. Woodcock, Leslie V. (Dep. Phys. Chem., Univ. Cambridge, Cambridge, Engl.). *J. Chem. Soc., Faraday Trans. 2* 1974, 70(8), 1405-11 (Eng). A generalized 3-term pair potential, corresponding to a simple polarizable-ion mode, was used to parametrize exptl. data for gaseous alkali metal halide ion pairs. The repulsive core potential was much harder than that normally used in semiempirical effective pair potentials from crystal data. The derived lattice potential energies and their 1st 2 derivs. with respect to vol. agreed with exptl. results.

C.A. 1975, 22, 16

бихалоген. и. зем.

переходн. металлов II B, IV A, Eu.

1974

Структ.
параметры

149196c Geometry of some metal halides. Yarnell, P. A. (Lawrence Berkeley Lab., Univ. California, Berkeley, Calif.). Report 1973. LBL-1973. 202 pp. (Eng). Avail. Dep. NTIS. From Nucl. Sci. Abstr. 1974. 29(3). 7443. Two polarizable-ion models were developed to describe metal dihalide mols. in the gas phase. Both models use electrostatic and repulsive interactions to predict mol. geometries and mol. consts. The 1st model was applied to the dihalides of the alk. earths, Group IIB metals, transition metals, Group IVA metals, and Eu. In addn. to the mol. geometry, bending frequencies were derived for most of these mols. The 2nd or "linear" model was applied to the alk. earth dihalides; equil. internuclear bond lengths, stretching force consts., and stretching frequencies were detd.

С.Д. 1974. 80. N 26

суд. офиц.
(модель бинарных металлов)
④ Eu.

Щелочные
галоидиды

литер. 3156

1975

Finn E. Z

J. Chem. Phys., 1975

62 N5, 1842-46.

(м.п.
расчет
по тем. ЭМ.)

● (см. нот. ЭМ. 2^х ат.
молекулы)

Условные замечания 1975
(молекул. пучки)

85: 37444d Molecular beam scattering from clean surfaces of alkali halides. — Meyers, Jeffrey A. (Pennsylvania State Univ., University Park, Pa.). 1975. 97 pp. (Eng). Avail. Xerox Univ. Microfilms, Ann Arbor, Mich., Order No. 76-10,764. From *Diss. Abstr. Int. B* 1976, 36(11), 5653.

C.A. 1976 85 N 6

Щелочные металлы галогениды

1975

8 Д371. Фотоэлектронные спектры бромидов и йодидов щелочных металлов. Poole R. T., Leskey R. C. G. Jenkin J. G., Liesegang J. — A photoelectron study of the alkali bromides and iodides. «Chem. Phys. Lett.», 1975, 31, № 2, 308—311 (англ.)

Получены точные значения энергий связывания для полос внешних электронов бромидов и йодидов щелочных металлов с использованием УФ-фотоэлектронной спектроскопии (УФ-фотоны — 40,81 эв). Сделаны поправки на релаксационные эффекты и получено хорошее соответствие с борновской моделью ионных твердых тел как в величинах абс. значений энергий связывания, так и в величинах энергетич. зазоров между полосами внешних валентных электронов. Библ. 10.

фотоэлектронные
спектры

Ф 1975 N 8

50410.3699

40892

1975

Ch, Ph, TC

Ученые
записки 3165Thakkar Ajit J.

До: ноябрь, 1975

A new generalized expansion for the potential energy curves of diatomic molecules.

"J. Chem. Phys.", 1975, 62, N 5, 1693-1701
(англ.)

0341 физ

314 317 333

ВИНИТИ

$M^+ HBr_2^-$
 $M^+ HClBr_2^-$

(Di)
(R. K. Matfey)


M = alkali metal
XU-12431 1976

84: 128346u Infrared spectra of the $M^+HBr_2^-$ and the $M^+HClBr_2^-$ ion pairs and their deuterium analogs isolated in argon matrices at 15 K. Ault, Bruce S.; Andrews, Lester (Dep. Chem., Univ. Virginia, Charlottesville, Va.). *J. Chem. Phys.* 1976, 64(5), 1986-93 (Eng). The matrix reactions of alkali bromide salts and HBr and DBr were investigated in argon matrices. In each case, an intense band was obsd. from the reaction product, which was assigned to the antisymmetric stretch, ν_3 , of the HBr_2^- anions in the $M^+HBr_2^-$ and $M^+DBr_2^-$ ion pairs. Comparisons to literature spectra, in conjunction with quartic deuterium shifts, indicate that the anion has a linear, centrosymmetric geometry in the isolated ion pair. A less intense band was also obsd. which has been assigned to the combination band $\nu_1 + \nu_3$ for the HBr_2^- anion. Reaction of alkali bromide salts with HCl and alkali chloride salts with HBr were shown to yield identical absorptions for the $M^+HClBr_2^-$ ion pairs. The spectra suggest that both type I and type II $HClBr_2^-$ anions exist, and the resulting form may be detd. by cation position.

P.A. 1976 84 N 18

Wescoreff, Norman

1976



(Vi; cm⁻¹/yr)

84-142804y Matrix reactions of alkali metal fluoride molecules with fluorine. Infrared and Raman spectra of the trifluoride ion in the $M^+F_3^-$ species. Ault, Bruce S.; Andrews, Lester (Chem. Dep., Univ. Virginia, Charlottesville, Va.). J. Am. Chem. Soc. 1976, 98(6), 1591-3 (Eng). The reaction of alkali fluoride salt mols. with F_2 in argon matrices has produced a single sharp, intense ir band at 550 cm⁻¹, with a strong Raman counterpart band at 461 cm⁻¹. Through analogy to previous salt-mol. reactions, and using KrF_2 as a model compd., these 2 bands were assigned to ν_3 and ν_1 of the F_3^- anion in the $M^+F_3^-$ pair. Mutual exclusion between the ir and Raman spectra indicates a center of symmetry for the anion, in a D_{3h} geometry, and a lack of shift of band position with the different cations indicates a pure fluorine vibrational mode in a distinct trifluoride anion.

C.A. 1976 84 N20

70325.I777

TC

40892

1976

Химический сб.

#9-14434

Brumer Paul, Karplus Martin.

Erratum: perturbation theory and ionic models for alkali halide systems. II. Dimers.
"J. Chem. Phys.", 1977, 66, N3, 1388
(англ.)

0839 гнк .

811 822.830

ВИНИТИ

Мелодический
записыватель

Оммуна 8783 1470
8530p март 1975

Beikowitz J.

(8530p)

High Temperature NPS
Studies and Other Variations.

p 355 - 433.

Данная работа рассмотрена 1976

85:130812g Perturbation theory and ionic models for alkali halide systems. II. Dimers. Brumer, Paul; Karplus, Martin (Dep. Chem., Harvard Univ., Cambridge, Mass.). J. Chem. Phys. 1976, 64(12), 5165-78 (Eng). Contributions to the potential energy of alkali halide dimer systems (MXM'X') and

the assumptions inherent in ionic models commonly used to describe dimer structure are analyzed using exchange perturbation theory. Numerical results demonstrate that no simple ionic model satisfactorily accounts for all available exptl. data. The perturbation theory approach suggests the incorporation of many-body terms, 1st order in the potential and 2nd order in the overlap, as the 1st correction necessary to account for the exptl. results. The need for further theor. work on many-body contributions and exptl. work on dimer properties is emphasized.

not. not.
отсут.
(K)

X-1
139-9977-54
14434

P.A. 1976 85 N 18

Щелочные галогениды

1976

✓ 1 Б69. Теория возмущений и ионные модели для систем галогенидов щелочных металлов. II. Димеры. Brumer Paul, Karplus Martin. Perturbation theory and ionic models for alkali halide systems. II. Dimers. «J. Chem. Phys.», 1976, 64, № 12, 5165—5178 (англ.)

Предложенная ранее схема обменной теории возмущений применена для описания димеров галогенидов щел. металлов типа $MXM'X'$ и уточнена путем учета многочастичных эффектов в первом порядке по потенциальной энергии и во втором — по перекрыванию. Рассмотрены многочисленные ионные модели, предложенные различными авторами для данных димеров. Найдено, что ни одна из ионных моделей не согласуется с совокупностью эксперим. данных. По обменной теории возмущений вычислены различные характеристики (геометрич. параметры, энергии диссоциации, частоты нормальных колебаний) для 20 симм. димеров типа $MXMX$. Отмечается, что результаты носят предв. характер, т. к. расчетный метод нуждается в уточнениях, а для развития теории необходимы более подробные эксперим. данные. Сообщ. I см. РЖХим, 1973, 20 Б24.

Т. К. Ребане

Br-9477-2

65141-57

Фз; ч.п;

ⓧ
Ⓢ (+1) Ессыгу

2.1977 N1

60712.1810

TC, Ch, Ph

Ученый
Ученый
96200

1976

4381

Holmlid Leif. Rynefors Kjell. Absolute complex formation cross sections for alkali-alkali halide collisions: a Monte Carlo trajectory study.

"Chem. Phys.", 1976, 14, N 3, 403-412

(англ.)

0658 лнк

635 636 650

ВИНИТИ

60601.7631

42530

1976

Ch, Ph, TC

ye-eorri. za-letti.

5-13/41

Jain J.K., Shanker Jai, Khandelwal
D.P. Evaluation of Van der Waals dipole-
-dipole and dipole-quadrupole energies in
alkali halides. "Phys. Rev. B: Solid
State", 1976, 13, N 6, 2692-2695 (англ.)

0828 ОКК

610 613

ВИНИТИ

3 Д119. Релятивистские эффекты в двухатомных молекулах. II. Релятивистские вклады в энергию связи в молекулах галогенидов щелочных металлов. Matcha Robert L. Relativistic effects in diatomic molecules. II. Relativistic contributions to binding energy in alkali halide molecules. «J. Chem. Phys.», 1976, 65, № 5, 1962—1966 (англ.)

Исследуются вклады в энергию связи двухатомных молекул, обусловленные релятив. эффектами. Поправки к энергии определяются в первом порядке теории возмущений, причем в качестве оператора возмущения используется гамильтониан Брейта — Паули. Ф-цией нулевого приближения считается одностермическая ф-ция, полученная методом Хартри — Фока — Рутана. Отмечается, что основная трудность при учете релятив. эффектов состоит в необходимости достаточно точного вычисления интегралов. Поправки к энергии связи, обусловленные релятив. эффектами, увеличиваются от 0,94 ккал для молекулы LiF до 7,7 ккал для молекулы LiBr . В последнем случае полученная поправка составляет 7,84% от полной энергии связи. Показано, что основной вклад в поправку к энергии связи вносит член, связанный со спин-орбитальным взаимодействием. А. И. Папин

Memorandum MET. (continued)

1976

J 85: 52033n Theory of the chemical bond. 2. Dipole moments of alkali halide molecules, bond polarity, and differential charge affinity. Matcha, Robert L.; King, Stephen O., Jr. (Dep. Chem., Univ. Houston, Houston, Tex.). J. Am. Chem. Soc. 1976, 98(12), 3420-32 (Eng). An accurate dipole moment model is used to analyze dipole moments of alkali halide mols. For these mols, the effective charge transferred during mol. formation, f , ranges systematically from 0.76 to 0.99 in an order predictable from the periodic table. The F 's are related to at. parameters by the equation $f = (q_M - q_X)/2$, where q is the ideal at. charge. The model predicts equil. dipole moments and slopes for alkali halides which differ on the av. from exptl. values by 0.33 and 1.5%, resp. A complete table of alkali halide dipole moments is constructed; given are coeffs. in the equation $\mu_{v,J} = \mu_0 + \mu_1(\nu + 1/2) + \mu_2(\nu + 1/2)^2 + \mu_3 J(J+1) + \mu_4 J(J+1)(\nu + 1/2)$, where ν and J are vibrational and rotational quantum nos., resp. The model is compared with several other dipole moment models. The model leads to a plausible interpretation of the signs of equil. dipole moments for such mols. as ClF which have appeared to violate chem. intuition. A quant. procedure for resolving chem. bonds into ionic and covalent components is proposed. The method derives from an

(μ)

C.A. 1976

85. N8

OMM-4383

anal. of alkali halide dipole moment measurements. Bonds are classified according to their polarity $f = (q_A - q_B)/2$ and their covalency $c = (q_A + q_B)/2$. A new concept, the differential charge affinity, is introduced to explain trends in the bond polarities of alkali halide mols. The relationship of this property to ionization potentials and electron affinities is explored. A comparison of bond polarities and differential charge affinities with the older concepts of ionic character and electronegativity is given.

Ученые записки

1976

86: 147922m Vibrational-rotational energy levels of diatomic halide molecules. Malinowska-Adamska, Cecylia (Inst. Phys., Tech. Univ. Lodz, Lodz, Pol.). Zesz. Nauk. Politech. Lodz. Fiz. 1976, 3, 5-14 (Pol). An anal. expression was derived for the energy eigenvalues of the vibrational-rotational terms of diat. mols. by using the potential function of T. Tietz (1963, 1964): $U(r) = [De(1 - q)^2/(1 + q)^2][1 + (A/q) + (B/q^2)]$; where $q = r/r_e$. Calcs. on alkali halides demonstrate that this approach gives agreement with the exptl. dependence of these eigenvalues on the rotational quantum nos. B. J. Skutnik

пакет
гравес
механизм



C.A. 1977, 86 N20

2 х ат. газосекторный спектр. 1976

12 Д164. Колебательно-вращательные уровни в двухатомных молекулах галогенидов щелочных металлов. Malinowska-Adamska Cecyla. Oscylacyjno-rotacyjne poziomy energetyczne czasteczek dwyatomowych halogenków. «Zesz. nauk. PŁódz.», 1976, № 217, 5—14 (польск.; рез. англ., рус.)

Приведено аналитич. выражение для собств. значений энергии колебательно-вращательных уровней двухатомных молекул, полученное с помощью потенц. ф-ции Титца:

$$U(r) = D_e(1 - r/r_e)^2(1 + r/r_e)^{-2} \cdot [1 + A(r_e/r) + B(r_e/r)^2].$$

Показано, что ф-ция Титца дает правильную зависимость собств. значений энергий колебательно-вращательных уровней от вращательного квантового числа для двухатомных молекул галогенидов щелочных металлов.

Резюме

9/1976 N 12

Արևածրեւելե շահութեւոյն

1976

(M F₆)

Մ. Կ.
Շահութեւ

87: 160920z IR-spectroscopic study of some alkali metal hexafluorides. Markaryan, Sh. A.; Grigoryan, Zh. Kh.; Ter-Arakelyan, K. A.; Babayan, G. G. (USSR). Erevani Amalsaran. Gitakan Tegekagir. Bnakan Gitutyunner, Uch. Zap. Erevan. Un-t. Estestv. N. 1976, 3(133), 156-7 (Russ). From Ref. Zh., Khim. 1977, Abstr. No. 13B245. Title only translated.

C. A. 1977, 87 N20

Ученые замечания
(написано)

1976

85:133704j Helium(He II) photoelectron spectra of vapor phase alkali halides. Potts, A. W.; Williams, T. A. (Dep. Phys., King's Coll., London, Engl.). Daresbury Nucl. Phys. Lab. [Rep.] 1976, DL/SRF/R8, 75-6 (Eng). The energy range of He II photoelectron spectral measurements of alkali halide (MX) vapors was extended to include ionization from the M^+ cation of diat. M^+X^- . Spectra for Cs halides and Rb halides are presented and discussed; agreement between calcd. and exptl. ionization potentials is good. In many of the mol. M^+p^{-1} spectra, four or possibly more features were obsd. It is tentatively suggested that the fine structure arises from configuration interaction between the various possible states of the $M^+p^5s^1X^0p^5$ ion and the $M^{2+}p^5X-p^5$ ion.

примеч.
чек

С.А. 1976 85 N 18

61123.3627

Ch, Ph, TC

LiF, NaF, KF, CsF 1976
(первиче св.уче) 4789

Poole R.T. On the relationship between the chemical bond energy and the electron energy levels of strongly ionic compounds. "Chem. Phys. Lett.", 1976, 42, N 3, 509-511 (англ.)

0758 ЛМК

714 716

ВИНИТИ

M - ClF

1974

M - ufluorine + M + ClF.

Y. op.
Chen + p

87: 60119b Infrared, Raman, and ultraviolet spectra of M^+ClF^- species in solid argon. Prochaska, Eleanor S.; Ault, Bruce S.; Andrews, Lester (Chem. Dep., Univ. Virginia, Charlottesville, Va.). *Inorg. Chem.* 1977, 16(8), 2021-3 (Eng). The alkali metal- ClF^- matrix reaction products were examd. by IR, Raman, and UV matrix techniques. Strong bands near 340 cm^{-1} in both the IR and Raman spectra are assigned to the intraionic $(Cl-F)^-$ mode and strong metal-dependent IR absorptions are attributed to the interionic $M^+ \leftrightarrow (ClF)^-$ mode. Intense UV absorptions near 290 and 250 nm are assigned to $M^+(ClF)^-$ and $M^+Cl_2F^-$, resp.

C.A. 1974. 87 28.

Exam. molecules

1977

Memorable molecules
Encorement

90: 157348a Comparative method for evaluating molecular parameters of diatomic molecules based on the virial theorem. Application to the titanium boride (TiB) molecule. Rozukova, T. P.; Morozov, E. V.; Bobkova, V. A. (Ivanov. Khim.-Tekhnol. Inst., Ivanovo, USSR). *Deposited Doc.* 1977, VINITI 4199-77, 9 pp. (Russ). Avail. VINITI. Electron kinetic energies and potential energies were evaluated as functions of internuclear distances for 48 diat. mols. of the type XY (where X = alkali metals, alk. earth metals, B, or Ti, and Y is a halogen, H, O, or S) and of H₂, B₂, and Ti₂. Mol. and thermodyn. parameters were calcd.

P. A. 1979. 90 N20

Memorable references

1977

Две рус
сбз

87:11808s Chemi-ionization reactions of alkali dimers with halogen molecules. Reck, Gene P.; Mathur, B. P.; Rothe, Erhard W. (Dep. Chem., Wayne State Univ., Detroit, Mich.). *J. Chem. Phys.* 1977, 66(9), 3847-53 (Eng). A crossed beam app. is used to characterize ionic products of thermal energy collisions of alkali dimers M_2 with homonuclear halogens X_2 and with IBr and ICl . All possible alkali-halogen combinations were studied, except Rb_2 with ICl and IBr . When energetically possible the ionic products are mainly M^+ and X^- . When this path is closed two alternative paths are obsd. These yield M_2X^+ and X^- , or M^+ and MX_2^- . The results are discussed in the framework of a mechanism proposed by Lin, Whitehead, and Grice. The binding energy of the triat. ions is computed with the use of an ionic model.

C.A. 1977 87 N2

Ученые записки

1977

91:112776t Internuclear distances $r_e(M-X)$, radii, and effective dipole polarizabilities of $M(1+)$ and $X(1-)$ ions in dimeric molecules (M_2X_2) of alkali metal halides. Solomonik, V. G. (Ivanov. Khim.-Tekhnol. Inst., Ivanovo, USSR). *Deposited Doc.* 1977, VINITI 4387-77, 12 pp. (Russ). Avail. VINITI. Based on the ionic model, the bond distances, $r_e(M-X)$, in alkali metal halide dimers, M_2X_2 , were estd. by interpolation of $r_e(M-X)$ from monomer $MX \rightarrow$ dimer $M_2X_2 \rightarrow$ crystal. By using $r_e(M-X)$ values of M_2X_2 , the ionic radii and polarizabilities in M_2X_2 were calcd.



Q.A. 1979.2/14

Traceilla

1978

Ученые
записки

(encl.)

91: 99299t The photodissociation of alkali halides in air-acetylene flame as studied by molecular absorption spectroscopy. Furuta, Naoki; Yoshimura, Etsuro; Haraguchi, Hiroki; Fuwa, Keiichiro (Div. Chem. Phys., Natl. Inst. Environ. Stud., Ibaraki, Japan). *Spectrochim. Acta, Part B* 1978, 33B(10-12), 715-26 (Eng). The absorption spectra of alkali halides and hydroxides which were aspirated into an air-C₂H₂ flame were obsd. in the UV and visible regions using a conventional at. absorption spectrometer with an analog data processing system. Mol. bands which arose from the alkali halides and hydroxides were obsd. along with at. lines. For Li, only mol. absorption bands of LiO were obsd. in the flame, even when Li halides were aspirated. These mol. absorption bands can be interpreted in terms of photodissocn. processes of the alkali halides and hydroxides produced in the flame.

C. H. 1978, 9, N12

Исследование 22-02-1978

1978

Кислоты

Павлов

Коробов

91: 65464c Infrared absorption in alkali halide molecules, clusters and microcrystals. Martin, T. P. (Max-Planck-Inst. Festkoerperforsch., Stuttgart, Fed. Rep. Ger.). *Proc. Int. Conf. Lattice Dyn.* 1977 (Pub. 1978), 769-71 (Eng). Edited by Balkanski, M. Flammarion Med.-Sci.: Paris, Fr. IR absorption spectra are reported for alkali halides in various stages of aggregation ranging from monomer to microcrystal. The samples were prep'd. by the simultaneous condensation of Ar and alkali halide vapor onto a transparent He temp. substrate. For the smaller clusters, >30 sharp mol. lines could be seen. As the clusters become larger, the mol. lines coalesce into a small no. of narrow bands which can be characterized as surface phonon absorption. The equil. configurations of alkali halide polymers contg. 1-9 mols. were det'd. by numerically minimizing the total energy. The 2nd derivs. of the total energy with respect to at. displacements were evaluated and used to calc. the IR absorption spectrum of each polymer.

© A. 1979 G. 118

спектры
в матрице

11 Д589. Матрично-изолированные щелочногалогидные мономеры и кластеры. Martin T. P., Schaber H. Matrix isolated alkali halide monomers and clusters. «J. Chem. Phys.», 1978, 68, № 9, 4299—4303 (англ.)

Получены ИК-спектры ($600\text{—}30\text{ см}^{-1}$) натриевых и цезиевых щелочногалогидных мономеров и кластеров, изолированных в аргонной матрице. Обнаружено, что при низких концентрациях исследуемых соединений в ИК-спектре наблюдаются 4 полосы, причем наиболее интенсивная ВЧ-полоса приписана колебаниям мономеров, а остальные — колебаниям плоских ромбич. димеров. Увеличение концентрации исходного продукта в матрице сопровождается появлением ИК-полос тримеров и тетрамеров. Вычислены константы равновесных конфигураций щелочногалогидных молекул, содержащих от 2 до 8 атомов. Взаимодействие частиц в мономерах и кластерах описано в рамках моделей твердого и поляризуемого ионов. Библ. 19.

И. В. А.