

Inf

In F

Murad E. и др.

1966

357

J. Chem. Phys.
45, N1, 263

$-(F-H_{298})/T$

при

1400°K

1500

1600

1700

BP-5506-V

Энергии диссоциации
монокториедов группы IIIA.
Возможность существо-
вания потенциальных
максимумов в их возбу-
жденных состояниях
(см. BF) III

1972

In_2F_2

In_2Cl_2

In_2Br_2

In_2I_2

Krasnov, K.S. et al.

Teplofiz. Vys. Temp.

1972, 10(5), 973-8.

T. g. op.

Vi, c. n.

• (em. Ca_2F_2 ; III)

Ин Ф₆ (2)

Книга у Юшмана 1976

Фер. Галкин Н.П.

т.г.ф.

бен. св-ва кеорган. фто-
риров.

Атомиздат 1976, Москва,
стр 264-383

In F_3 (2)

1984

Pankratz L. B.,

m. sp.
298.15
1800 K

U.S. Bureau of Mines,
Bull. 674, p. 343.

In F₂ (2) .

1984

Pankratz L.B.,

m. gp.
298.15
2000K

U.S. Bureau of Mines,
Bull. 674, p. 341.

In F(2)

1984

Pankratz L. B.,

U.S. Bureau of Mines,
Bull. 674, p. 340.

m.p.
298.15
2000 K