



$(CH_3)_2S$

Bp - 1557 - IV ~ 1949-50

Bindet J. L

m. g of.

Meinog. gp - use

499-500

Бор - 1556-IV

1949

$(CH_3)_2S$

Barrow G. M., Pitzer K. S.

Ind. Eng. Chem., 1949, 41, 2434.

и.ф.

Исследования св-ва неводородных соединений

в 1000%

соединения

BCP-1558-IV

1950

$(CH_3)_2S_2$

Binder J. L.

J. Chem. Phys., 1950, 18, 24.

- . 8 . 80

1500°K

термодинамический потенциал и  
энергетический эффект

1957

$(CH_3)_2S$

J. Am. Chem. Soc., 1957, 79, 561

1961

 $(\text{CH}_3)_2\text{S}$ Lewis G., Randall M.;  
Pitzer K., Brewer E.T. P.  
20/06

Thermodynamics, Vol II

Знаменит  $G_T - H_0 - 1/T$  $q_{\text{cur}} T = 298, 15, 500, 1000, 1500, 2000^\circ\text{K}$  $H_{298} - H_0 \quad \Delta H_0$

$(CH_3)_2S$

[Деп 84]

1975

Трицаев Е.И. и др.

т.г. ф.

(Рекоменция "М. физ. химии"  
АН СССР) М., 1975, 4 с, библиогр.  
6 нояб. 1975 г., N 2368-75 Деп)

(см  $(CH_3)_2S$ ; III)