

MgO

1892

Мгд

Rogers F. Y.,

Am. J. Sci. 1892, 301, 43

Мармий не средото освещен

Синие
мг

Темное сурову 127мг

полне 6010 кел.

Темное

Образован

$\Delta H = -147,0$

Ch. Z. 1892 I-801

1890

Muthmann W. Weiss L.

1904

Journ. 1904, 1-46, 331

Usserobanne desentus der Cerggruppe

сумма

189

Температура

Средняя

$\Delta H^{\circ} = -143,5$

Температура средняя

143,01 мм (а по Rogers (1892)
- 144 мм)

Ch. Z. 1904 I - 1398

H_2O



v. Wartenberg II [Варшавский] 866

Z. Elektrochem. 1909, ~~869~~, 15

~~Несколько опытов с торфом~~
O торфа.


суммарное
~~теплотное~~ для

теплоты

сгорания

$\Delta H = -144,3$
(143,3)

суммарное количество



O торфа O перегрева и т.д. не указаны.

Ch. Z. 1910-86

MgO

Bp-7061-IV 1912

Russel A.S.,

(Gp) Physik Z., 1912, 13,
39-64

Mgo

Kanolt
Kanolt

1913

F. m.

J. Wash. Acad. Sci.,
1913, 3, 315

3173°K
(2800°C)

MgO

Магнѣ

Magnus A.

1913

BP-V-7/1

Physikal. Ztschr.,
1913, 14, стр. 5

$C_p > 998$

[288 -
- 1040°K]

BP-7035-IV

MgO °C E_p

~~22~~ = 22 - 99 9,44

15 - 268 10,16

15 - 559 10,77

16 - 765 11,14

273
1038

MgO

Ruff O.

11913

Z. Anorg. Allgem. Chem. 82,
373-400

(T_m)

$T_m =$ a) 2120 °C

b) 2250 - 2280 °C

c) 2450 °C

d) 2500 °C

e) 2550 °C

(outst. m.p.,

среда - атом

10 mm Hg - 1 атм)



(непрочно
на 30-50°)

[31]

MgO

Kanolt C. W.

1914

(T_m)

Bull. BS, 10, 295-313 (1914); al-
30, J. Wash. Acad. Sci., 3,
315-318 (1913); also, Z. Anorg.
Chem., 85, 1-19 (1914);

[37]

$T_m = 2800^\circ\text{C}$ (пересчет - 2852°C)

(чистый MgO с примесями ~ 0,5%,
среды - CO и N_2)

IX-3106

1914

MgO (Ht-Ho)

Stegez W.,

Silikat. Z., 1914, 2, 51

"
Über die mittlere spezifische Wärme
einiger keramischer Massen in zwei verschie-
denen Temperaturberei- chen.

Kenn N° 584

5

Ugo

BP-2-5664

1914

(Tm)

Tiede E. Birnträuer E.

L. Anorgan. Chem.

1914, 87, 129-168

Algo

1916.

Grunther P.

"Ann. Phys"

(Cp)

1916, 51, 828-46

B99-5216-1

IX-3110

1919

$\text{CaO}; \text{MgO}$ (H_T-H₀)

Waztenberg H., Witzel G.,

Z. Elektrochem., 1919, 25, 209.

Einige molekulargewichte bei sehr hohen
Temperaturen.



5 ~~8~~

Kennz N°584

Al₂O₃
SiO₂
H₂O

Ruff O., Schmidt P.,
Z. anorg. Chem., 1921, 117, 172

1921

Al₂O₃

B-1-55 u
M-XIV

MgO

B9p-3812 - IX

1924

Lamarckian M.
et al.

(Kp)

C. v. Acad. Sci., 1924,
178, 41-43.

1924

MgO

1

Moose Y.E., Parr S.W.

U. Am. Chem. Soc. 1924, 2656, 46

Новое определение тепла
сгорания некоторых металлов.

Целью этой работы
уверенствование некое
проверку сгорания. Металлы,
сгоревшие на воздухе и на
воде в замкнутом пространстве,
то предположено от
уменьшения

C.A. 1925-1084-5.

BP-6583-1

сгорание
из
теплота
образован

DH = -146,1

(M. Al_2O_3) I

сильно и возможно существенно
сильнее металлы и их соединения.
Металлы металлов делят по тому, что в
предыдущем разделе. Свойства опре-
деленных металлов делят обычно на металлы
и металлы по 1-й. Металлы Ас, Ве, Сд,
Се, Ла, Мг, Та, Sn, Wn Zn.

150

Parks G.S., Kelley K.K.

Таркс, Келли.

J. Phys. Chem., 30, 1926. 47

Теплоемкость окислительных
окислов металлов

Ср.


пятиразъ 20

сир 6.

MgO, MgCl (Kp) IX 38/2¹⁹²⁴

Lemarchand M., Le Chatelier
C. r. Acad. sci., 1924, 178, 41-43^H

M B



MgO

Parke S., Kelley R. K. 1926

J. Phys. Chem., 1926, 30, 47.

Теплота сгорания некоторых
окислов металлов

Г 298

(MgO - высокосорбционный
образец плавленого MgO.
анализ дал 100% внутри
ошибок опыта)

T [°] R	Cp.
94,1	1,62.
94,9	1,78.
98,5	1,82.
100,0	1,90.
151,8	4,44.
188,4	5,86.
193,4	6,06.
245,3	8,44.
248,0	8,60.

T [°] R	Cp.
288,3	8,74.
291,0	8,80.

IX 1572

1930

MgO, MgH (ΔH_f)

Mg, MgO, MgH (ΔH)

Priceardi G.,

Chim. ital., 1930, 60, 337-51

M

C.A., 1930, 3961

IX 2119

CaO , CaCN_2 , MgO , MgCN_2 (Kr) ¹⁹³¹

Franck H.H., Keimann H.

Z. angew. Chem., 1931, 44, 372-8

St. Sts

C.A., 1931, 3924

Ugo,

Alg O₃

$\bar{V}$ 3731
(C_p)

1931

Wilkes G.B.,

J. Amer. Ceram. Soc., 1931, 15, 72-77

CA, 1932, 1170

6

Маганті (магант) : 1932-33

MgO

Phys. Rev., 1932, 2, 42, 616
Indian J. Phys., 1934/35, 9, 528

Энергия
диссоциации.

Маганті рекомендует энергию
диссоциации MgO, равную
 $D(\text{MgO}) = 3,063 \text{ э.е.} = 70,4 \text{ ккал/моль}$,
величину полудвойную
занятую.

Данные маганті не надежные

MgO

Wilkes

1932

Уилкс

У. Ам. Серам, Soc.,
1932, 15, стр. 72

Cp) 998

(303 -

- 2073°K)

Теплоемкость MgO и Al₂O₃
при высоких Т-рах

IX 2047

1933

MgO (ΔHm)

Elect

Cohn

Z. anorg. allgem Chem, 1933, 213,

321

5

U20 (OT4) ^{Exp-} IX 2348


1934

Treadwell W.D., Hartnagel J.

Kelv. Chin. Acta, 1934, 17, 1372-84

M

Cat., 1935, 991⁵



1935

~~Li₂O~~Li₂O

12078394

Kelley K.K., Anderson C.T.

Burr. Mines Bulletin 384, 1935, ~~ср~~ 26Contribution to the Data on theore-
tical Metallurgy.IV. Карбонат Лиезита.температура
образования
144090 Li₂O

Порирование берилла и образование тем-
та образования Li₂O имеет -142800
и -140000 (чис. по L-B, 1923, т. 2, ~~ср~~ 1503)
использованы данные порирования
температура восстановления карбоната

молем $\Delta H_{298,1} = 28270 \text{ ккал/моль}$ C
показано $\Delta H \text{ для } \text{Li}_2\text{CO}_3 \text{ и } \text{LiCO}_3 = -266400 \text{ (Берилл, по L-B)}$

Лиезита

исследов. Шир., $\Delta y_0 = -144090$ км. За Берлин
сравнение с результатами -145800 (Moore, Parr)
 -143900 (v. Wartenberg) и -143400 (Berthelot)
(см. ука. по L-B)

V 3745

Ср(CaF_2 , Al_2F_6 , MgO , Al_2O_3 , Na_3AlF_6 ,

Ср, ΔHm (KCl , NaCl , MgCl_2 , KF , NaF)


Лященко В.С.

Металлург, 1935, 10, № II, 85-98.

"Specific heat and heat of fusion of
chlorides and fluorides".

F

Be



CA., 1936, 62787

1935

189-1-13

HgO , ZnO ,
 As_2O_3

Темнов
~~исследования~~
исследования
в HNO_3
и HF

Франсине А. Швиете Н.Е., 1935
З.анорг.хим., 1935, 223, 225.

Темнов исследованию окислительных свойств азотной кислоты и окислительных свойств серебра в азотно-водородной кислоте и их зависимость от концентрации кислоты. Также исследованию окислительных свойств азотно-водородной кислоты

Темнов исследованию HgO в
2, 4, 5 и 9 NH_3 ($\text{H}_2\text{O}:\text{HNO}_3 = 26,2; 12,1; 9,3; 5,1$)
номер 35828, 36022, 37327, 37514.

См. А. 1935-61318

Стойкостью по отношению к изменению
температуры вещества с изменением концен-
трации вещества зависит только от температуры
разбавления вещества и вещества. При $18 \pm 1^\circ$
истинный температурный коэффициент ИФ, содержа-
щих 9,81; 20,1; 32,8 и 40,7 г ИФ в 100 г ИО состав-
ляет 0,514; 0,856; 0,801 и 0,768

R 1651

1935

$MgCl_2$, MgO (Kp , ΔF_{238}° , ΔH_{233}° ,
 ΔS_{238})

$MgCl_2$ (~~ΔH~~ , ΔF_f , ΔS_f)

Sano K.

J. Study Metals Japan, 1935,
12, 247-52

C.A., 1935, 7161⁴

11

leg 0

Schwiete H.E., Prenschnke A.,

1935

Zement, 1935, 24, 553

DNF

ВФ-2467-IX | 1936
Аушбикович

МГО

Легкие металлы,
1936, 5, №7, 14-52

Ср > 298

Теплоемкость некоторых
веществ, входящих в
состав маточной ванны
(573 - 973°K)


X 2289

1936

Mg_2Si , Mg_2Sn , MgS , MgO
(all in soln, in Al)

Hume - Rothery ~~Wm~~, W.,

Philos. Mag., 1936, 22, 101347



M, B

C. A., 1937, 16747

MgO

Kelley K. K.

11936

($\bar{T}_m$)

U.S. Bur. Mines, Bull. 393,
Pt. V, 1-165

[1]

$\bar{T}_m = 2642^\circ\text{C}$ (обзор)

Ляшенко В.С.

1936

Al, Mg
MgO, Al₂O₃ и др.

Металлург, 1936, №1, 95-115

φ > 298

Таблицы Термодинам.
функций Al, Mg, K, Na,
Cl₂, O₂, F₂, KCl, NaCl, KF,
NaF, MgCl₂, KCl · MgCl₂, Al₂O₃,
MgO

№39-32

Na T_m C_p(m) lit
371 7,44

C 1150 4,962

K (336,6-1133) 7,73

Al (Y_{unus}) C_p = 6,132 + 1,695 · 10⁻³ (t - 657)

ΔH_m = 2163 kcal/mol - approx

lit ΔH_m = 1350 kcal/mol C_p(m) = 6,91 kcal/mol

ВФ ЛХ - 2846

1936

MgO

$MgCl_2$ (кз)

Treadwell W.D., Timman A., Züzer Th.

Helv. chim. Acta 1936, 1255, 19

К исследованию свободных ионных
образованию окиси и хлорида Mg.
Из основных исследований

ранних вычислена ΔF MgO при
288,2°K: 3,02V и при других t.

Теневка

образованию

Коррелирование с данными
Sano [C.A. 29, 71614] по полновесно

MgO-MgCl₂

найдена ΔF MgCl₂, по

C.A. 1937-16908

на $(3,318 - 0,747 \cdot 10^{-5} \text{ Т})$ в диапазоне 800-1000°K.

Величина $2D_c$ подтверждает этот расчет.

89 IX - 3078

1937

$Mg(OH)_3$; MgO (Cr; S298)

Giauque W.F., Archibald R.C.,

J. Amer. Chem. Soc., 1937, 59, 561

The heat capacities of $Mg(OH)_3$ and

MgO from 20 to 300°K

see p. K.

Келли №592

~~50~~

BQ-IX 1652.

1937

MgO ($K_p, \Delta H, \Delta F, \Delta S$)

Sano K.,

Sci. Repts. Tohoku Univ.
Ser. I, 1937, 25, 745-754.

1653

1939

MgO, MgCl₂, (ΔH₂₃₀, ΔF₂₃₀, ΔS₂₃₀)

Land K.,

J. Chem. Soc. Japan, Pure Chem. Sec.,

1939, 60, 369.

M

IX 1680

4940

Mg, MgO, Mg₂SiO₄, (2H)

Schneider A., Kasse E.,

Z. Elektrochem., 1940, 46,

279-284


C.A., 1941, 2399

2

ЕСТ - Ф. К.

IX 2530

1941



Вильянский Я. Е., Голубенко Н. П.

Ус. прикл. химии, 1941, 14, 39-45

М, В

С. А., 1941, 8221⁸

VII 1208

1942

MgO, CaO, MgCl₂ (OH, Tur, Cp, OF)
Cr, CrO, Cr₂O₃, CrCl₂, CrCl₃, CrCl₄, CrN, Cr₂C₂
" gp. (Cp, OH, OF, other, Tur, H-H°)

Maier C. G.

U.S. Bur. Mines Bull. 436, 1942, 109 pp

B, M

сс76 q. k.

Шомейт, Хасфман

1943



MgO
MgCl₂

Shomate C.H., Huffmann E.H.,

U. Am. Chem. Soc. 1943, 1625, 65

Теплота растворения MgO, MgCl₂
и кипения MgCl₂

Теплота Mg, MgO и MgCl₂ растворяется в HCl
растворяется



перевод XI-57

IX 1383

1945

P (~~oxidation~~ Mg) MgO

Lustman D.,

Steel Processing, 1946, 32, 669,

676

"Dissociation pressures of metal
oxides formed on various solid
metals"

C.A., 1947, 332h

5

chem. eng.

~~Atk~~

X 2120

1948


MgO, CaCl_2 (ΔH)

Francis H.H., Wallerich R.,

Z. anorg. Chem., 1948, 257, 316-39

M, Jis

C.A., 1949, 56258h



MgO

Latimer W.M.

TB.

U.S. Atomic Energy Comm., Rep. MMDC-

T. 0.

I462

2000-5000⁰K

Tables of free energy functions for
elements and compounds in the tem-
perature 2000-5000⁰K.

МгО

[A - 159]

1947

Лизинский К. Б.

ΔHpaepopous.
b-bog

Мр. обзвеш? зимы,
1947, 17 (2), 169-174.



IX 1470

1948

MgO, MgCl₂ (Δ G_f)

Mukai T., Ishizaka S.,

J. Electrochem. Soc. Japan, 1948,

16, 88-93

M

C.A., 1950, 44, 9790e

БФ - 5646-IV

1948

Гусев В.Д.

Мед

Известия сектора физико-
химич. анализа и хими-
ческой общей и органич.
химии АН СССР,

Тм

1948, 16, N3, 29-46

1948

BQ $\overline{IX}$ - 1559

Mgo (Kp, ΔH)

Pidgeon L.M., King F.A.,

Discussions Faraday Soc.,
1948, N4, 197-206.

IX 1681

1948

MgO (ΔH , Kp)

CaC₂ (ΔH)

Schneider H., Hett G,

Z. anorgan and allgem. Chem., 1948,
257, 289 - 315

M

C. L., 1949, 5685 hi

MR

Taylor R., Wells S.

1948

Y. Res. NBS, 1948, 21, 33

MR

участие
в работе
и в кассе
Технической
и культурной

MgO

Джонс

1949


MgO,
Mg(OH)₂

Graessle M.F.
J. Am. Chem. Soc.
1949, 71, 3192

равновесие

Равновесие

OH⁻



Затвердевший OH⁻

MgO с твердой структурой

C.A., 43, 8823a (1949)

1970; 6, 55

Jura G. ~~J. Chem. Phys.~~ 1949, 17, 1335

Kington, Morison

J. Chem. Phys. 1950, 18, 759

ΔH (по меморанду) = 888 ккал/моль

$$\Delta F = \Delta H - T \Delta S = 900 - 474 \cdot (\sim 0,2) =$$

$$= 800 \text{ ккал/моль}$$

JACS, 1948, 70, 2156

Пармелла, 20.2

1949

 MgO

Тема 4:

Thermodynamic properties
of the surface of magnesium
oxide. - J. Chem. Phys., 17, 1335 (1949):

термодин.

свойства.

поверхности

BP-VI-3926; V4237-BP

1949

Δ Hf, Δ Gf (B_2O_3 , FeO, MgO, NbO_2 , TiO_2 , WO_3 , VO ,

ZrO_2)

Richardson ~~R.D.~~^{F.}, Jeffes J.H.E., ~~Kubaschewski O.~~,
J.Iron. Steel Inst. (London), 1949, 163, 147-153.
Discussion on the paper - The thermodynamics of
substances of interest in iron and steel ma-
king from 0° to 2100° .

I.Oxides.

ENCLOSURE II.

C.A., 1949, 9007gh.

M., Be.

F

BP-920-VII

1950

Артур

Arthur J. S.

MgO, TiO₂, ZrO₂

Cp > 298,16

Applied. Phys. 1950, 21,
N8, 732-33

Температура (средняя)

MgO, TiO₂ и ZrO₂ (20-800°C)

$$C_T = A + BT + CT^2$$

M_T-M₀ и Cp

C. A.
1950, 10480 e

Тем 350°C

Ср кер/грам

MgO

0,276

TiO₂

0,210

ZrO₂

0,140

Химия / Muldt L., Lagerqvist A. | 1950
описан Arkiv Fysik, 1950, 2, 333
MgO

Энергия
диссоциации $D_0(\text{MgO}) = 120,0$ ккал/моль
[Измерения констант равновесия
диссоциации в парах]

Вар - 2284-IX

Определение жертв Искупления
отцов (нарав)

D. Gupta

मेमोरा अफ
1950 H_2O , Al_2O_3
 SiO_2

1950.

Phys. Rev. 80, 281-2.

मेमोरा अफ जेवारेन्स H_2O , Al_2O_3 ,
 SiO_2 .

X-ray.

mgd.

Moore G. E., Allison H. W. 1950
Morrison J.

J. Ch. Ph. 18, 1579.

ΔH°

$\Delta H^{\circ}_{298,16}$

$H^{\circ}_{298,16} - H^{\circ}_0$

mgd (ray) - 24900 - 25000

2126.

Myr, Allison, Morrison

1950

MgO(par)

Moore G.E., Allison H.W.,
Morrison

J. Ch. Ph., 1950, 18, 1579

	ΔH_0°	$\Delta H_{298.16}$	$H_{298.16} - H_0$
MgO(par)	-24900	-25000	2126

V 3701 ~~Intermetallics~~

1950

Al_2O_3 , MgO, Al_8Mg_5 , AlMg , Al_3Mg_4 (ΔHf)

Oketani S., Maebashi Y.

Nippon Kinzoku Gakkaishi (J. Japan Inst.
Metals), 1950, 14B, N 2, 27-31

Intermetallic compounds. I. The heat of
formation of intermediate phases of
Al-Mg alloys

F 5

WPK, M

CA., 1951, 55061

Bsp — IX 1679
Aug 0 (K)
Schneider H.,

1950

Z. Metallkunde, 1950, 41,
205-212

M

ENTRANCE

C. A., 1950, 44, 106323

Вильмот

1950

MgO

Willmott J.C.

Proc. Phys. Soc. (L., A)

1950, 63, 389-402

ИК - спектр крист. MgO ;
Сравнение с теорией

Борна - Блекмана и Келлермана

Холли, Холер

1951

MgO
Al₂O₃

Charles E. Holley, Elmer Y. Huber
Y. Am. Chem. Soc. 73, 5577-9 (1951);
Am. Soc. Inst., Doc 3330

Температура сгорания алюминия и
алюминия.

Температура
образования

Температура сгорания определена
в ~~большом~~ вакуумном калориметрическом
бюрете $P_{O_2} = 2.5 \text{ атм}$. Температура сгорания

Mg $5835,6 \pm 4,8 \text{ ккал/г}$

Al $7403,4 \pm 5,7 \text{ ккал/г}$

номер XI-48

C.A. 1952-2389; 2390a

Общая длина обрезовану μ_m 250

MgO $-143,70 \pm 0,12 \text{ км}$

Al_2O_3 $-400,29 \pm 0,31 \text{ км}$

Результаты сравниваются с
временем.

BP- V 3682

1951

Δ Hf (Al_2O_3 , MgO)

Holley C.E., ~~et~~, Huber E.J., ~~et~~

J. Am. Chem. Soc., 1951, 73, 5577-9

Am. Doc. Inst., Doc. 3330

"The heats of combustion of magnesium
and aluminum"

F

CA., 1952, 2389i

WPK₁

E C T b φ. H.

MgO
4 Al₂O₃
Perrin
of 1951

1951

J. Am. Chem. Soc. 73, 5577

Heat of Comb. Mg + Al

6. Karpov. 50 cal up to 25 cal. 0.

5895.6 ± 4.8 Mg

7403.4 ± 5.7 Al⁰ Cal/g

Perrin of 1951

MgO = -143.70 ± 0.12 kcal/mole

Al₂O₃ = -400.29 ± 0.31

up to 25°

(ΔGf).

Ф. Морис, Х. Кордье и
авторы Исследования и
резолюции. нем.)

A-906

1952

Mg, Ca, Sr, Ba, Be

Emley E.F.

Chem. Eng. Sci., 1952, 1, 131-44.

The free energies of the fluorides, chlorides, and oxides of the alkali, alkaline earth, and rare earth metals, and the occurrence in fused salt mixtures of double-decomposition reactions involving these substances.

M,

CA, 1953, 1481b.

Mgt

1952

1X
Bep - 124.5 - 1X

Fura C.

Garland C.W.

(cp)

"7. Ann. Chem. Soc."

1952, 77, 6033-4

B91-V-5813, VI 3925 - B91 1952
CaO, MgO.H₂O, MgO, MgSiO₃, MnSiO₃
Ca Mg (SiO₃)₂ (o Haq)
(o Hf)

Newonen K. J.,
Bull. comm. geol. Finlande,
1952., 158, 50 pp

M ecum q. k.

MgO

Bp-5813-v 1952

Neuvonen K.

ΔHf

"Bull. Comm. Geol. de
Finlande"
1952, 158 6-57

Westrum E. F., Le Roy Eyring. 1952

MgO

MgO

JACS, 1952, 74, №6, 2045

Теплота

образования

Теплота образования.

MgO

BQ - 1987 - IX

1953

Coughanour L.W.
DeProsse W.A.

(Tm) F. Res. Nat. Bur. Stand.
1953, 51 N2, 85-8.

IX 1993

1953

MgO, MgCO_3 (ΔH_f).

Cremer E., Allgeuer K.,

Radex Rundschau, 1953, N2, 54-57

M

P. X., 1956, N16, 50165.

Друммонд, Барроу

1953

BeO, (MgO)

Drummond, G., Barrow, R. F.
Trans. Far. Soc. 1953, 49, 599

Энергия
диссоциации

$D_0(\text{BeO}) = 127 \pm 5 \text{ ккал/моль}$

$D_0(\text{MgO}) = 120 \text{ ккал/моль}$

$P_{\text{H}_2\text{O}} 2000^\circ = 0,1 \text{ мм Hg}$

(см. BeO) I

Рег. XI-25

не проверено [Bp-2039-1x]

1953

Энштейн, Хауленд

Epstein Leo F., Howland W.M.

~~JACS~~, 1953, 36, N10, 334-335

J. Am. Ceramic. Soc.

Бинарные смеси UO_2
и других окислов

ВР-1426-VIII

U₃O₈ BeO,
 Al_2O_3
Теплоты и
Температ.
плавления

Термод.

ДМХ, 1954, N7, 21375

фазовые диаграммы NO_2 , MgO , $= \text{BeO}$ и $= \text{Al}_2\text{O}_3$
построены на основании закона идеальной
р-ров и предположения, что энтальпия плавления
всех окислов равна $R\ln$, где R —
число атомов в молекуле.

Литературные эксперим. данные близки
к вычисленным.

MgO

Bp -1516 - viii

1953

Beach G. A.; Harper M. E.

(Tm)

Metallurgia, 1953,
47 v283, 269-71

Bq-852-VII

1953

MgO

Kubaschewski O

Benck W. A.

(F; H; S)

"F. Inst. Metals"

1953, 82, Part 2,
87-91

MgO

Ламбертсон,

1953

Мюллер.

Lambertson W. A., Mueller M. H.
J. Amer. Ceram. Soc., 1953, 36,
N^o 10, 332-334.

Разовые равновесия, системы
с окислом урана. II. UO_2 -MgO.

X-55-1 - 222.

Mgo

Porter R.F.

1953

U.S. At. Energy Comm., UCRL-416,
46 Cy.

Термоанализ. влияние
газовых сред

См. Mgo / свечи

MgO

Вр-2743-IX

1953

Розловский А. И.

Шаулов Е. В.

(ΔHv; S)

Докл. А.Н. СССР, 1953

89 № 6, 1065-66.

уго
ли

Всп - 6709 - IV
Sodha M.S., Varshni Y.P.,

1853

Indian J. Phys., 1953, 27, 520 ;

Sci. Jptz. 1954, 57A, 74

Сегнето телото цилиндрично криво-
лино селет по електропроводимост и
термоелектричен ефект.

Опис.

Сегнето телото цилиндрично PbSe,
PbTe, SnO, SnS, FeO, CuO, AgO, MnO, CoH,
KH, LiH, NaH, RbH, AuCl, AgS, и др.
не обикн. изписване на елементите.

C. J. 1952, 7927*

Тепло, Солнечный свет, чистый воздух
и теплоходный экипаж. * - Счастливы..

BP-6409-14

1953

BP 4-1935

Hs (PbO, PbSe, PbTe, SnO, SnS, FeO,
CuO, MgO, MnO, CsH, KH, LiH, NaH,
RbH, AuCl, MgS)

Sodha M.S., Varshni Y.P.

Indian J. Phys., 1953, N10, 520-22.

Patent heat of ...

Be, M

Est/F.

R. Porter

1953

МгО
сублимация

U.S. At. Energy Comm.
UCRL-2416 46 стр.

Периодич. изучение газовой смеси

Измерение давл. паров метана и азота
показало, что др. МгО и метана в
основном в виде молекулярной
газ. Смесь. Изучение
зеленых и ультрафиолетовое МгО
показало, что основн. газ. состояние

указаний. Вскрытие имеет более
низкую реакцию субмикрон, чем
известно. В состоянии, предположительно,
неизв. пометки ява. сеговном
иногда встречаются.

Надана реакция субмикрон
 $\text{Sn} (\Delta K_{298}^{\circ} = 70 \pm 2 \text{ мкн})$ по зв. срава
иногда лин. экстраполяции Б-Ш.
для SnO .

IX 2361

1953

$MgCl_2$, MgO (ΔH)

Tsuchiya R.,

Sci. Repts. Tohoku Univ. 1953,

vol. 1, 37, no. 9-14

M

O. X., 1956, N16, 50166

Вчереве 2.
Porter R.T.

MgO

БФ-1902-1X
Брагер, Портер

1954

J. Chem. Phys.,

1954, 22, N11, 1867-77

Теплота
сублимации

Термодинамическое и спектро-
скопическое изучение
газообразной окиси магния

$D_0(\text{MgO}) = 112,8 \text{ ккал/моль}$
 $T_{\text{лит.}} 3040 \pm 60^\circ \text{K}$

$D_0(\text{MgO}) = 4,7 \text{ eV}$

1. Определение углеродности паров.

Т°К Рядо ватомех
(расчет по ур.)

$\frac{\Delta F_T - \Delta H_{298}}{T}$

ΔH_{298} ккал/моль

2040 $5,84 \cdot 10^{-5}$

43,84

128,0

2040 $4,20 \cdot 10^{-5}$

43,84

129,2

2140 $1,84 \cdot 10^{-4}$

43,51

129,8

2200 $3,81 \cdot 10^{-4}$

43,31

129,9

Среднее 129,2

или 129,2 ккал/моль

MgO
P₂O₅

Стилбес, Теркдоган | 1954
~~Stew~~ Stevens C. G., Turkdogan B.T.


Теплоты
образования

Trans. Faraday Soc
1954, 50, N4, 370-373

Теплоты образования
гроссманов марганца и
магния

X-55-4-5277

III-891C-VII
BP-3168-VII



Мадаров Г.И., Каменский В.И.


ЖОХ, 1954, 1135, 24

экспериментальное определение
константы равновесия реакции
 Mg(OH)_2 (Давление диссоциации
 Mg(OH)_2 измерено в интервале
380-650°C и получено

формула $\lg p = - \frac{11000}{4,575 T} + 5,24$

константа
 $\Delta H = 11000 \text{ ккал/моль}$

с.д. 1955-2835д



$$\Delta H = 11\,000 \text{ кал/моль}$$

380-650°C

Бонниксон

1955

MgO. Al_2O_3
CaO. Al_2O_3

Bonnickson K. R.

J. Ph. Ch. 1955, 59, №3, 290-1

Теплопроводность амальгамы
Ca и Mg при высоких T-рах

Cp > 298

$\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ (298 - 1800 °K)

$$H_p = 36,80 + 6,40 \cdot 10^{-3} T + 9,78 \cdot 10^{-5} T^{-2}$$

$\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$

T °K	$H_T - H_{298,16}$
500	6650
1000	26390
1500	48620
1800	62480

IX - 1037

1955

CaCO_3 , CaO , MgCO_3 , MgO
(ΔH° , ΔF° , ΔS° , S°)

Тиньбург Д.М., Баранова Р.И.,
Тр. Всес. ин-та содовой индустрии,
1955, 8, 103-108

M

РЖХ, 1957, 7441

MgO

Тасна, Табууки

1955

Gáspár R., Csavitzky P.,

Acta Phys. Acad. Sci. Hung.,
1955, 5, 65

D.

[Работ (теоретическим) измерен
диссоциацию $D_0(\text{MgO}) = 103,7 \text{ kcal/mol}$]

$\text{Mg}(\text{OH})_2 \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ Newman E. S.,

* Mg 7

9. Res. NBS., 1955, 54, 347

Исследования свойств $\text{MgO} - \text{MgCl}_2 - \text{H}_2\text{O}$
и термическое поведение оксидов
магния

Термическое
поведение

Данные по MgO , MgCl_2
приведены по NBS

MgO
(SrO)


Теплота
сублимации

BP-1566-IX

Портер, Танка, Унграм | 1955
Porter R.F., Чирка W.A.,
Унграм М.
J. Chem. Phys., 1955, 23, 1347-8

О энергии диссоциации
молекул SrO и MgO
 $D_0(\text{MgO}) = 94,5 \text{ ккал/моль}$
(есть переход)

1855



Staudé H.

Z. physik. Chem., 1855, 204, 265

Palmolecine

C.A. 1856, 1424 bc

1955

MgO

Stull D.R., Mc Donald B.A.

JACS, 1955, 77, N20, 5293

Cp 5298

Энтальпия и теплоемкость
окси марм и отожженных
стали типа 430 от 700



до 1100°K

IX 2527

1955

CaO, CrO, MgO (Do)

Вейц И.В., Курович Л.В., Коробов В.В.,
Изв. АН СССР, сер. физ., 1955, 19, N1, 21-22

256, 6113

Ю

ЕСТЬ Ф. Н.

MgO

Ommeck 1444

~1956

M.G. In^hgram W.A.Chupka J.Berkowitz


"Dissociation energies from thermodynamic
equilibria Studied with a mass-spectrometer.

----- P-5I3-535.


Мго в НС ВР-IX-1114 1956

(ДН 801) Казуштинский др.
Саснабская кр.

Мруды МХТУ, 1956,
вып. 22, 47-52



BeO



p(am)

BP-18-13/4

Дуби, Меркеев.

1955

Livesey D.T., Murray P.

J. Nuclear Energy, 1956, 2, №3,
202-212.

Устойчивость окиси
бериллора и окиси
магния в атмосфере
космического состава
при высоких температурах

№ 5-4-20065.

ΔG° , ΔH° and ΔS° for the reaction $2\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2(l)$ are
 $\Delta G^\circ = -55087 - 22.8T + 19.7 \log T \pm 3000 \text{ cal}$.
 To determine ΔG° (1952); Quill (1950); Giauque, Archibald, JACS,
 1937, 59, 561 $\log(2) + \ln(2) + 1/2 \ln(2) = \log(2)$

$\Delta G^\circ = -55087 - 22.8T + 19.7 \log T \pm 3000 \text{ cal}$.
 ΔG° is ΔG° for $\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2(l)$.
 ΔG° can be determined, and the standard Gibbs free energy
 of formation of $\text{H}_2\text{O}_2(l)$ is $-55087 - 22.8T + 19.7 \log T \pm 3000 \text{ cal}$.

The standard Gibbs free energy of formation of $\text{H}_2\text{O}_2(l)$ is $-55087 - 22.8T + 19.7 \log T \pm 3000 \text{ cal}$.
 The standard Gibbs free energy of formation of $\text{H}_2\text{O}_2(l)$ is $-55087 - 22.8T + 19.7 \log T \pm 3000 \text{ cal}$.

The standard Gibbs free energy of formation of $\text{H}_2\text{O}_2(l)$ is $-55087 - 22.8T + 19.7 \log T \pm 3000 \text{ cal}$.
 $\Delta G^\circ(2) \rightarrow \Delta G^\circ(1) + 1/2 \ln(2)$, where $\Delta G^\circ(1)$ is the standard Gibbs free energy
 of formation of $\text{H}_2\text{O}(l)$. T.O. ΔG° is the standard Gibbs free energy of formation of $\text{H}_2\text{O}_2(l)$.
 1600-1700°C & pressure 10^{-1} to 10^{-5} atm

VI 6312 1956
CaO, CaSO₄, FeO, MgO, MnO, S (кп)

Richardson F.D., Fincham C.J.B.,

Rev. metallurgie, 1956, 53, 113, 215-232
(франс)

Le soufre dans les laitiers de
silicate et d'aluminate.

M.B. нем с S-ke smoro №

P.H. Kim, 1957, 18508

Becher

1956

№ 0

Weber J.

Kohász. Lapok, 1956, 11, № 4, 174-179.

Равновесные условия мантии
- Киселов Г.

Х-37-17-56978.

Вейц Ч.В., Турбин Л.В. | 1956

MgO

К вопросу об энергии
диссоциации молекул окислов
целочных -земельных элементов
МДХ, 1956, (в печати)

D₀

$$D_0 = 100,0 \pm 3 \text{ ккал/моль}$$

Турбод, Лоперквист (1950)	120,0	До (Мг)
Бревер, Портер (1954)	112,8	
Портер, Уитман, Танка (1955)	94,5	
Таскер, Галлигетт (1955)	103,7	
эксп. Берджес-Шпелер	76,0	
<u>Гурвич, Вейс</u>	<u>100,0</u>	
рекомендовано	100,0 ± 3	клеточная

1956

мгО, ВаО, SrО, BaO (IX. 2522. 2)


Вещь Ч.В., Углерод А.В.,

Окисления и спектрохимия, 1956,

1/1, 22-33

10

Р.Х., 1956, 74/33



1957

Обишев А. П.

Мг
МгО

Ж. прикл. химии, 1957, 30,
№ 9, 1397-1400.

Ожидаемость молнии в воз-
духе при умеренно высоких
и высоких температурах.

X-58-11-35464

1957

VI-1160

FeO, MnO, CaO, MgO, SiO₂

(Hmix)

Консупров В. А.

В сб. "Физ-хим. основы произ-ва стали"
М., АН СССР 1957, 413-422, Дискус.
'505-12.'

Est/F.

M, W.

Aug, CAD, SCO, BOB IX 2525 (Do) 1957
Beins. Ch. B., Typewr. H. B.,

McC. pres. X-mines, 1957, 31, N10,
2306-2311.

O.K., 1958, 52636

10

20-2 3.

IX 2526

1957

МгО, СаО, SiO, NaO (D₀)

Всёц У.В., Чурбан Л.В.,

Матрица 10²⁰ Всесоюзного сов.
по спектроскопии. Т. 1., Молекуляр. спектр
физ. сб. Львовск. ун-та. Вып. 3(8), Львов,
Львовск. ун-т, 1957, 705-8

10

1958

MgOMgO.
(Sp)

Bsp - 1373-IX

Lien W. H., Phillips R. E.,J. Chem. Phys., 1958, 29, 1415.-16Температура кипения рас-
тв. MgO менее 1,5° и 40K.(максимум давления нет,
приведен график)

Перевод

Петров В. В.

№11 с. 18-21

МГО

Razouk R.Y., Mikhail R.Sh.,
 У. Phys. Chem., 1958, 62, 320
 Угнетение ^{те} окислительных
 процессов в перекиси водорода.

Сорбция
 перекиси
 водорода на МГО

(Понижение окислительных процессов
 окислительных процессов)

1958

MgO
галенит

10Б153. Термическое расширение соединений типа NaCl. I. Термическое расширение галенита между -150 и 150° . II. Термическое расширение окиси магния между -150 и 200° . Riano E., Amorós J. L. I. Dilatación térmica de compuestos tipo ClNa. I. Dilatación térmica de la galena entre -150° y 150° C II. Dilatación térmica del óxido de magnesio entre -150° C y 200° C. «Bol. Real soc. esp. histor. natur. Sec. geol.», 1958, 56, № 2, 345—361; 391—404 (исп.)

Термич,
расширение

2.1961.10

VI 3616

1958

Tm ($\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$, $\text{MgO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$, MgO , $3\text{CaO} \cdot 5\text{Al}_2\text{O}_3$,
 $\text{BeO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$, $\text{NiO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$, $2\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5 \cdot 2\text{SiO}_2$)

Silverman J.

Пат. США. 2838882, 17, 06, 1958

Method of producing glass.

PJX, 1960, 23207II

Be.

1

Мз 0

ВФР-2809-IX

1958

Трубицын В.П.

(Ттч)

ис. Эксперим. и теор.
физики,

1958, 34, 221-22.



IX 2528

1958

Mg, Ca, Fe, Ba, MgH, CaH, FeH, BaH, MgO,
CaO, SiO, BaO (Fe-1, S, H₂-H₂)

Всего и.в., Турция и.в., Италия и.в.,

Р. о.у. хм.м.м., 1958, 32, 11, 2532-42

и.в.

МГО

Воробьев А. Ф.

1958

Канд. диссертация, 1958г

$\Delta K_{обр.}$

$\Delta K_{обр.} = -143,92 \pm 0,26 \text{ км/ч/мл}$
(прямая линия)

X 1823

1959

MgO (cp, E°, S)

Barrow T.H.K., Berg W.T.,

Morrison J.H.,

Proc. Roy. Soc., 1959, 1250, N1260,
70-83

B, M

ECTE 015

P.X., 1960, 12553

Do (Lyo, ³⁵E) Bulwicz E.M., Sugden T.M., 1355
= 98 ± 2 TFS, 1953, 55, 720

Определение количества рисовых
и телят образцов массы и
гравитированной массы.
Число 5. Сметенная 100. 100.

MgO

BGP-3627-IX

1959.

Давыдов Б. У.

(T_{tr})

Publ. Bur. center
seismol. internat.

1959, A N20, 323-32,

Myo

B9p-984-VII 1959

Lively D.T.

(ΔG_f ; T_m ; P) γ . Less - Common
Metals, 1959, 1
N2, 145-51.

Томас, Бейкер

1959

МгО

Thomas D.E., Baker J.W.

Proc. Phys. Soc., 1959, 74, N°6,
673-679.

ΔПр-решиз

Рентгенографическое
исследование кристаллов, обу-
словливающих непостоян-
ство величин темпо-
тов растворения окиси
железа.

X-60-19-76435.

Температура р-решия различных образцов
MgO меняющейся от 37,47 до 36,21
ккал/моль, в зависимости от температуры
обезвоживания брусита (MgO · H₂O) при
(380, 500, 700, 1000 и 1380)

1959

IX 2318


MgO (ΔHag)

Thomas D.L., Baker T.W.

Proc. Phys. Soc., 1959, 74, No. 6,
673-679 (anc)

B

P.X., 1960, #6435



IX 1946

1960

MgO (Tcr)

Coles B.A., Acton J. W., Owen J.,

Phys. Rev. Letters, 1960, 4, N3,
116-117 (and)

5

P.X., 1960, 80109

1960

VI-1675

Kp, 4 G

(MgO, MnO, MnS, MgS)

Dewing E.W., Richardson F.D.

J. Iron and Steel Inst., 1960, 195, N1, 56-58.

The thermodynamics of the conversion of
magnesium and manganese oxides to
sulphides.

Est/F.

RM, 1961, 1A90

M, W, .

MgO
(ТВ)

на поике по авторам 1960

м.г.и.св.-ва on the Thermodynamic
Properties of Selected
Light-Element Compounds
NBS, Report 6928.
Washington, 1970.

11960.

Жуковецкий В.В.,

Уф. высш. учебн. заведений.
Уф. металлургич., 1960,
№ 1, 115-118.

Давление паров магния
системы $MgO-Si$.

X-60-20-80218

MgO

McClelland J. D., 1960
Zehms E. H.

J. Amer. Cer. Soc., 1960, 43, W1, 54

Теплопроводность MgO at
Теплопроводность 1030 to 1880°C

1960

MgO

16B339. Термическое восстановление окиси магния. Toguri J. M. The thermal reduction of magnesium oxide. «Tidsskr. kjemi, bergvesen og metallurgi», 1960, 20, № 9, 211—214 (англ.).—Обзор литературы и сравнение методов восстановления окиси магния различными восстановителями. Рассмотрены данные по равновесному давлению пара магния при действии на некоторые магнийсодержащие минералы CaC_2 , Si и Al. С учетом стоимости восстановителей сделано заключение о наибольшей перспективности применения алюминия и его сплавов с кремнием и железом. А. Грановская

Р.Н. Химия
1961. 16 B339

IX - 1025

1960

Окислы редкоземельных металлов
(Ср)

Westrum E.F.

U.S. At. Energy Comm. TJD-11300,
1960, 24 pp

CA, 1964, 60, 19, 9980;

Б

кни в 5-ке

1961

Do (MgO)
 H₂S (MgO)

Altman R.L., Searcy A.W.
 XVIII Congress, Montreal, 1961
 Ученые описали минерал
 с составом $\text{MgO} \cdot \text{H}_2\text{S}$
 который образуется при
 нагревании MgO при $1800 -$
 2100°C из смеси MgO и H_2S .
 При охлаждении из смеси в
 виде кристаллов образуется $\text{MgO} \cdot \text{H}_2\text{S}$.
 Минерал имеет характерный
 кристаллический состав.

Mgo

Fieldhouse I.B.,
Lang J.I.

1961

Hr-Hrs "Measurement of Thermal
860 - Properties"

3260°R WADD TR 60-904

Contract N AF 33(616)-6324
Nov 1961.

1961

The aluminum reduction of magnesium oxide. I. The
 vapor pressure of magnesium over the system Al-MgO.
 K. Grjotheim, O. Herstad and J. M. Toguri (Tech. Univ.
 Norway, Trondheim). *Can. J. Chem.* 39, 442-50(1961).—
 The equil. vapor pressure of Mg over the Al-MgO system
 was measured in the 850-1150° range by the transportation
 method. The results are given by $\log P_{\text{mm.}} = -(9617/T) + 8.93$. After the unreacted MgO and Al were re-
 moved, chem. and x-ray analysis of the reaction mixt.
 showed only the presence of spinel, MgAl_2O_4 , indicating
 that the reaction occurred via $4\text{MgO}(s) + 2\text{Al}(l) = \text{Mg-}$
 $\text{Al}_2\text{O}_4(s) + 3\text{Mg}(g)$. Thermodynamic functions were
 calcd. for this reaction and for $\text{MgO} + \text{Al}_2\text{O}_3 = \text{MgAl}_2\text{O}_4$.
 Gene G. Mannella

C.A. 1961-55:14-12971gh

MgO

Kahn W.C.,
Muan A.

1961

J. Phys. Chem. Sol.,
19, N3-4, 338

Исследование активности
в системах NiO-MgO
и NiO-MnO при 1100 до
1300°C.



Cp, H₇ - H₀ (Na, Cu, Au, Ag, Be, Mg, Cd, Hg, Zn, Al,
In, Ti, C, Pb, Sn, Nb, Ta, Bi, Mo, Cr, W, Mn, Fe, Ni, Pd,
Rh, SiO₂, H₂O, HgO)

Johnson V.J.

Properties of materials at low temperature
(phase I). A compendium. Oxford-London-New York
Paris, Pergamon Press, 196I, VI, 994pp. (amr1.)

PX, 1962,
II6I

1961

IX 2682

BeO, MgO, CaO, SrO, BaO (p, d, ΔH_s)

Медведев В. Т.

Же. физ. химии, 1961, 35, N 4, 1481-8

Б, Ю

Р. М., 1962, 10А16

есть опен

McNally R.N., Peters F.Y.,
Ribble P.H.

1961

MgO

Cr₂O₃

BP-2112-VII

J. Amer. Ceramic Soc.

1961, 44, N10, 491-93

Лабораторная печь для изучения
Т.пл. в соотносительной среде.

Пленка магнеза MgO
в азоте и Cr₂O₃ в 1/2 и в воздухе

BP-2112-VII

BP-2112-VII

MgO $t^{\circ}m = 2825^{\circ}C$
 $\pm 20^{\circ}C$

Примеси в MgO :

ZnO_2 $0.005 \div 0.05\%$

Fe_2O_3 $0.005 \div 0.05\%$

Al_2O_3 $0.001 \div 0.01\%$

Cr_2O_3 $0.001 \div 0.01$

Ост. прим. 0.006

В сумме $\Sigma 0.02\%$

Образцу MgO : $99.9\% MgO$

Каналит

Вартебург

Маккейлл

Шенк

Рейл

Какаймэ

$T_m ^\circ C$

$2800 (2784 ^\circ C)$

2800

2825 ± 25

(2800)

2790 ± 20

2850

$T_m K$

2100 ± 25

V 718

1961

$\text{ZnO}, \text{CoO}, \text{VO}_3, \text{MgO}, \text{FeO}, \text{NiO}$ (np).
 VO_3^- , VO_4^{3-} , VO_2 (kp)

Molina R.

Bull. Soc. Chim. France, 1961, nr,
301-308.

РЖ, 1961, 24B38
8 см опус.
с. 4.

MgO up Bp-1658-IX 1961

Raman CV.

(cp) Proc. Indian Acad
Sci., 1961, A-54 244-52.

MgO

Ср

19Б243. О влиянии размера частиц на теплоемкость окиси магния в области от 1 до 5°K. Тарасов В. В., Хоканов Х. Б. «Уч. зап. Кабардино-Балкарск. ун-та», 1961, вып. 13, 97—99.—Авторы показывают, что их теория о вкладе дисперсности в теплоемкость твердого тела (РЖХим, 1958, № 3, 7112) в области низких т-р более точно согласуется с эксперим. данными по теплоемкости MgO в области т-р 1—5° K (РЖХим, 1959, № 13, 45028), чем теоретич. Джура и Питцера (Jura, Pitzer. «J. Amer. Chem. Soc.», 1952, 74, 6030). Э. С.

1961

XI-108X-1961

х.1962. 19

1961

MgO
cp

Effect of particle size on heat capacity of magnesium oxide in the region from 1 to 5°K. V. V. Tarasov and Kh. B. Khokonov. *Uch. Zap. Kabardino-Balkarsk. Univ.* 1961, No. 13, 91-9. Theory on the contribution of the particle size to the heat capacity of a solid body (CA 53, 11977d) in the low-temp. region agrees better with exptl. data on the heat capacity of MgO in the region 1-5°K. (Lien and Phillips, CA 53, 7749a) than does Jura and Pitzer's theory (CA 47, 3678e). From *Ref. Zh., Khim.* 1962, Abstr. No. 19B243. CA

C.A. 1963.58.12
120164

MgO

Toguri J.M., Ridgion L.M.

1961

Can. J. Chem., 1961, 39, 540

восстановление

кремнием

Внеко-температурное исследование
механизмов и процессов. I. Те-
мическое восстановление MgO
кремнием.

1962

17 Б380. Сгорание частиц магния. I. Cassel H. M., Liebman I. Combustion of magnesium particles. I. «Combustion and Flame», 1962, 6, № 3, 153—156 (англ.)

Сгорание частиц Mg диам. 20—120 м исследовалось при их падении в атмосфере O_2 , воздуха, смесей $O_2 + 4Ar$ и $O_2 + 4He$ в трубе длиной 64 см, нагретой до $1200^\circ K$ и снабженной пирексовыми окошками для наблюдения и фоторегистрации методом непрерывной развертки. Принимая, что скорость сгорания лимитируется скоростью диффузии O_2 к частице Mg, авторы получают ур-ние для времени сгорания в зависимости от различных параметров. Вычисленные из этого ур-ния по эксперим. данным для скорости сгорания значения т-ры Mg составляют для смеси с He $1590^\circ K$; для других смесей получены неправдоподобно высокие значения. Предполагается, что р-ция развивается в зоне, окружающей пористую оболочку MgO , образующуюся вокруг расплавленного металла.

А. Соколик

Mg

MgO

Сгорание

X. 1963. 17

1962

Aug 0

Sueger L. H.

Miss. Apts. 1962, 22, 10, 3423

ΔH°
298

Vapor pressure measure-
ments with Pt, Pd, Rd,
and Fe.

(see Pt)

Гурвич Л.В. и др.

1962

Лидо

Крист. и
жидк.

т.ф.

Москва, 1962

Термодинамические св-ва индиви-
дуальных веществ.

MgO

1962

8 Б222. Получение монокристаллов окиси магния из расплава в метаборате натрия. Haberland D. Züchtung von Magnesiumoxydeinkristallen aus einer Natriummetaboratschmelze. «Monatsber. Dtsch. Akad. Wiss. Berlin», 1962, 4, № 3-4, 207—208 (нем.).

Кристаллы MgO октаэдрич. формы выращены из расплава в NaBO_2 при 1200° . Указано, что NaBO_2 получен сплавлением H_3BO_3 и NaCO_3 при 1000° .

Л. Ерман

X. 1963.8

1969

ZrO₂-MgO

Phase boundaries of solid solutions of ZrO₂ and MgO from 1800° to the melting point. I. Hinz and A. Dietzel (Max-Planck-Inst. Silikatforsch., Wuerzburg, Ger.). *Ber. Deut. Keram. Ges.* 39, 530-3(1962). The phase boundaries between the cubic solid soln. of ZrO₂-MgO lie, in the range from 1800° to the m.p. (at the most), at 7 mole % MgO; the boundary between the same solid soln. and MgO is apparently independent of temp. and lies at about 20 mol. % MgO. In fused specimens (but not those formed by a solid-state reaction) with MgO contents above 20%, x-ray interference lines appear which have not yet been identified. Reply. H. Meyer (Max-Planck-Inst. Silikatforsch., Wuerzburg, Ger.). *Ibid.* 534(1962). The existence of pure cubic ZrO₂ at a temp. above 2285° was examd. by Smith and Cline (*CA* 57, 4130c). X-ray detns. were made at this temp. This cubic phase could be obtained only by extreme cooling, and is unstable at room temp. It is possible that, with rising MgO content, the zone of existence of the cubic modification may be shifted, so that the cooling velocities necessary to obtain the cubic crystal at room temp. may be less.

C. van de Werve

C.A. 1963-589

8446 d

MgO

Neel D.S., Pears C.D. 1962

menzofuz.
cb-ba

Progr. Intern. Res. Thermodyn. Transport. Properties, Papers Symp. Thermophys. Properties, 2nd, Princeton, N.J. 1962, 500-11.

Measurement of high-temperature behavior up to 5000°F.
(see. W)

[B99-414-VII]

IX 1506

ΔG (MgO, CaO)

1962

Renner Th.,

J. Phys. and Chem. Solids, 1962, 23,
Nov., 1587-1596 ()

Die Sauerstoffspannungsreihe
und ihre Anwendung auf die Technologie
von Halbleitern

PX., 1963, 21 5 164



Ec: 5 opt. 1111
B.M.H.O.

CeO_2, MgO (Т_н)

УИИ 3002

1962

Стрекаловский В.Н., Буров Г.В.

Самарина В.А., Пальгуев С.Ф., Волчо-

Нкова З.С.,

Тр. Ин-та Электррхимии АН СССР,

Уральский филиал, 1962/3/, 171-7

Взаимодействие

в твердом состоянии

CeO_2 с MgO

СА 1963-89. № 9. 9385

MgO, Ca₂SiO₄ IX 2084
(Kp)
Espeland A.,

1962

Tidskr. Kjemi, Bergvesen
og metalling; 1962, 22, 19,
204-206

M

HS P.X., 1964, 15346

also open

Ugo

Victor A.C.

1962

J. Chem. Phys.,
36, 2812

G

Влияние размеров час-
тиц на кинетическую
температуру.



William H. L.

1962

MgO
cm. K

U.S. At. Energy Comm. UCRL-9880, 1962.

C_p
0.1 - 4.2°K

Heat-capacity studies at
liquid-He temperatures and
below. I. Alkali metals. II.
Small particles of MgO.

C. A. 1962, 56, 10
11000 c/e.

VIII 2540

1962

UO , UO_2 , U_4O_9 , U_3O_7 , U_3O_8 , UO_3 ,
 ThO_2 , NpO_2 , PaO_2 , AmO_2 , CmO_2 , BkO_2 ,
 CfO_2 ; сульфиды, селениды и теллу-
риды урана, окислы щелочнозем-
ельных металлов (термодин. св-ва)

Westrum E. F., Groenwald F.,
Thermodynamic Nucl. Mater.
Proc. Symp., Vienna, 1962, 3-36 (Publ. 1963)

CA, 1965, 62, NB, 15493g. Б нем. в 8-ке.

1962

VI-3314

MgO, CaO, BaO, NiO, ZnO,

MnO, MgS, CaS, ZnS, CaSe, BaSe (Tm)

Задумкин С.Н., Хуламханов В.Х.

Изв. высш. учебн. заведений, Физика,

1962, №4, II2-I4.

Be

Est/orig.

CA, 1963, 58, N4, 2856b

МгО

Вор-3314-VI 1962

Задумкин С.Н.
и др.

(Тм)

изв. всеос. учебн.
завед. 1962, №4
112-14.

Aug 0

Вср - 1767 - IX 1963
Alexander C. A., Ogden J. S.,
Levy A.

J. Chem. Phys., 1963, 39, n 11, 3057.

Изучение окиси марганца
методом переноса.

[см. $Mg(OH)_2$]

x. 1964. 22

MgO

17

20

p

1475-
899

1 Б356. — Испарение окиси магния и ее реакция с окисью алюминия. Altman Robert L. Vaporization of magnesium oxide and its reaction with alumina. «J. Phys. Chem.», 1963, 67, № 2, 366—369 (англ.)

193:
421

С целью устранения противоречивых данных о величине энергии диссоциации MgO, полученных масс-спектроскопич. и эффузионным методами и пламенной фотометрией, продолжено исследование процесса испарения MgO методом Кнудсена (интегральный вариант) и методом струн (носитель — O₂). Применялись корундовые тигли, вложенные в W-камеры. Опыты проводились с тремя камерами с площадью эффузионных отверстий $8,56 \cdot 10^{-3}$, $8,48 \cdot 10^{-3}$ и $2,31 \cdot 10^{-2}$ см². Получено соответственно для р-ции $\text{MgO(тв.)} = \text{Mg(газ)} + 0,5\text{O}_2(\text{газ})$ $\Delta H_0^0 = 173$; 175 и 172 ккал, что сравнимо с величиной, вычисленной из калориметрич. данных 178 ккал. В действительности, эксперим. результаты должны быть исправлены; так как происходило некоторое испарение материала тигля, и вычисленные ΔH_0^0 должны быть ниже по крайней мере на 2 ккал/моль. Методом переноса

Х. 1964.1

Сол. Клод.

определена теплота сублимации $\text{MgO(тв.)} = \text{MgO(газ)}$, $\Delta H_0^0 = 158 \pm 4$ ккал. За основное состояние MgO(газ) принималось $^1\Sigma$. $D_0^0(\text{MgO}) = 80$ ккал/моль, что согласуется с расчетной величиной, полученной экстраполяцией по Берджу — Шпонеру. Исследование процесса испарения MgAl_2O_4 показало, что остаток обогащается Al_2O_3 : $\text{MgAl}_2\text{O}_4 \rightarrow \text{Mg(газ)} + 0,5\text{O}_2(\text{газ}) + \text{Al}_2\text{O}_3(\text{тв.})$. Поскольку неизвестна активность Al_2O_3 в образующейся твердой фазе, применение 3-го закона к этой р-ции для вычисления ΔH невозможно. Наилучшее согласование между экспериментальными и вычисленными $P(\text{Mg})$ получено в предположении отрицательной теплоты образования MgAl_2O_4 из MgO и Al_2O_3 , ΔH_f равно от -5 до $+6$ ккал.

Л. Резницкий

69-1775-1X

1963

426

MgO

D_0 ,
 ΔH_s

Vaporization of magnesium oxide and its reaction with alumina. Robert L. Altman (Univ. of California, Livermore). *J. Phys. Chem.* 67, 366-9(1963). A Knudsen effusion and oxygen transpiration study of the vaporization of MgO indicates that gaseous MgO is of little importance in the vapor phase at about 2000°K. A dissocn. energy for gaseous MgO of about 80 kcal./mole is obtained. Knudsen expts. with $MgAl_2O_4$ support a neg. heat of formation from the oxides, and this is confirmed by recalcn. of other exptl. results. CA

C.A. 1963. 58. 7
6208h



H_2O

H_2O

P_{act}

SHS

$D_0(H_2O) \approx 80$

$SHS(H_2O) =$

$\approx 158 \pm 4$

объем воды

Altman R.L.,

J. Ph. Ch., 1963, 67, 366

Умеренное H_2O и ее реакция с Ar_2O_3

исследование метода измерения
в процессе испарения. Комплексно.

H_2O в чертах H_2O .

Уравнение по измерению

$H_2O(\tau) = H_p(\tau) + 4 \cdot 10^2$ условлено, что

умеренное SHS совпадает в пределах

материала



или измеренных с

линейным

178 мм SHS 200°

результат.

1963

426



Углерод с углеродом O_2 , углерод

$$\text{угр}(\text{т}) = \text{угр}(\text{у}) \quad M_0 = 158 \pm 4 \text{ км/ч}$$

Примечание угр(15)

IX 2022

1963


CaO, MgO (Tm)

Demain R. S., Baur J. B.,
McNally R. N. Alper A. M.,

J. Amer. Ceram. Soc., 1963,

46, N. 7, 313-316

P. M., 1964, 2A32



MgO
 ΔH°

BQ-12030-IV 1963

Ginnings D.C.

J. Phys. Chem. 1963, 67(9)

1917-18

1963

MgO (крит.) McBride B. 4 гр.

Thermodynamic properties...

NASA SP-3008, Washington, 1963.

[118] 20 - 3000°K - Динион, Агнбалд (1937)

[40] 400 - 1500°K

C_p 3000°K $\approx 14,5$ ккал/моль град (средн.)

	Cp
29815	9,0360
1500	12,7242
3000	14,50

H-H	S
1266,7	6,6459
14984,0	24,3846
22073.0	33,8218

1963

MgO

HfH

AG+

29

† Thermodynamic data for magnesium oxide (periclase). L. B. Pankratz and K. K. Kelley (U.S. Bur. of Mines, Berkeley, Calif.). *U.S., Bur. Mines, Rept. Invest. No. 6295*, 5 pp. (1963). The heat content of periclase was measured at 298–1800°K. by the dropping method. The results were combined with other thermodynamic data for MgO and its constituent elements to obtain improved values of the heat and free energy of formation at 298–2000°K. Periclase is a better substance for checking high-temp. heat-content measuring app. than corundum.

C. W. Schuck

yreen & cyabornine!

C. A. 1963. 59. 13

14656h

MgO
BeO

32086 THERMODYNAMIC PROPERTIES OF MAG-
NESIUM OXIDE AND BERYLLIUM OXIDE FROM 298 TO
1200°K. Andrew C. Victor and Thomas B. Douglas. J. Res.
Natl. Bur. Std., 67A: 325-9(July-Aug. 1963).

As a step in developing new standards of high-temperature
heat capacity and in determining accurate thermodynamic
data for simple substances, the enthalpy (heat content) rela-
tive to 273°K, of high purity fused magnesium oxide, MgO,
and of sintered beryllium oxide, BeO, was measured up to
1,173°K. A Bunsen ice calorimeter and the drop method
were used. The two samples of BeO measured had surface-
to-volume ratios differing by a factor of 15 or 20, yet
agreed with each other closely enough to preclude appre-
ciable error attributable to the considerable surface area.
The enthalpies found for MgO are several percent higher
than most previously reported values. The values are
represented within their uncertainty (estimated to average
±0.25%) by empirical equations. Values of enthalpy, heat
capacity, entropy, and Gibbs free-energy function are tabu-
lated from 298.15 to 1,200°K. (auth)

Cp
298-1200K

1963
XI-679-IX
Bcp - 2379-IX

+1



NSA-1963-17-19

Algo

теплопровод-
ность

1963
Surplice N. A., Jones R. P.

Brit. J. Appl. Phys., 1963, 14,
n10, 720.

теплопроводность окислов
кремния-земельных ме-
таллов.

(См. Вад)

ж. 1964. 10

1963

MgO

BeO

Therm. data
298-1200°K

Thermodynamic properties of magnesium oxide and beryllium oxide from 298 to 1200°K. Andrew C. Victor and Thomas B. Douglas (U.S. Naval Ordnance Test Sta., China Lake, Calif.). *J. Res. Natl. Bur. Std.* 67A (4), 325-9(1963). The enthalpies of sintered BeO and fused MgO were measured by the drop method into a Bunsen ice calorimeter. A detectable effect of a change in the surface-to-vol. ratio on the enthalpy of sintered BeO below 373°K. is ascribed to hygroscopicity. The enthalpies were computed from the exptl. values and other literature data to yield for MgO: $H_T^\circ - H_{273.15}^\circ = 10.7409T + 1.2177(10^{-3})T^2 - 2.3183(10^{-7})T^3 + 2.26151(10^5)T^{-1} - 3847.94$; for BeO: $H_T^\circ - H_{273.15}^\circ = 11.1084T + 7.1245(10^{-4})T^2 + 8.40705(10^5)T^{-1} - 5.31245(10^7)T^{-1} - 5453.21$. The uncertainty in the equations is estd. at 0.25%. Values of enthalpies, heat capacities, entropies, and Gibbs free-energy functions are tabulated. A crit. discussion of the suitability of MgO and BeO as primary heat-capacity standards is given. MgO is probably preferable to BeO at high temps. Marc M. Faktor

1X
Rep-2379c.A. 1963.59.11
12244g

+1



MgO

17 Б365. Термодинамические свойства окисей магния и бериллия от 298 до 1200° К. Victor Andrew C., Douglas Thomas B. Thermodynamic properties of magnesium oxide and beryllium oxide from 298 to 1200° K. «J. Res. Nat. Bur. Standards», 1963, A67, № 4, 325—329 (англ.)

Методом смешения (ледяной калориметр) определены изменения энтальпии в области т-р от 273,15° К до 1173° К, сплавленной MgO и двух спеченных образцов окиси бериллия с различными отношениями поверхности к объему. Энтальпии, найденные для MgO, на несколько процентов выше известных литературных данных. Результаты в пределах погрешностей ($\pm 0,25\%$) передаются уравнениями: для MgO $H_T^0 - H_{273,15}^0$ (кал/моль) = $10,7409T + 1,2177 \cdot 10^{-3}T^2 - 2,3183 \cdot 10^{-5}T^3 + 2,26151 \times 10^5 T^{-1} - 3847,94$; для BeO $H_T^0 - H_{273,15}^0 = 11,1084T + 7,1245 \cdot 10^{-4}T^2 + 8,40705 \cdot 10^5 T^{-1} - 5,31245 \cdot 10^7 T^{-2} - 5453,21$. Вычислены и сведены в таблицы значения энтальпий, теплоемкости, энтропии и свободной энергии Гиббса этих окислов.

А. Гузей

H_T - H₂₇₃

1963

Bp 2379-1x

+1

x.1964.17



1963

20 Б371. Определение теплоты растворения термографическим методом. Вайвад А. Я., Меллер Т. Н. «LatvPSR Zinātņu Akad. vēstis. Ķīm. ser., Изв. АН ЛатвССР. Сер. хим.», 1963, № 6, 701—703 (рез. англ.)

Предложен метод использования фоторегистрирующего прибора Курнакова для регистрации изменения т-ры в калориметре при определении теплоты растворения. Подтверждена целесообразность применения сокращенного графич. метода для определения действительного изменения т-ры в калориметрич. системе. Теплота растворения окиси магния, в зависимости от т-ры обжига и исходного сырья, изменяется в пределах 42,1—35,2 ккал/моля. Реферат авторов

МГО
ДН
ВР-17-2512

х.1964.20

1964,

Alper A. M., Mc Nally R. N

Domar R. C., Keihns F. L.,

J. Amer. Ceramic Soc.,
1964, 47, N1, 30

исследование поведения в
системе $H_2O - H_2O_2$ и O_2

H_2O

H_2O_2

1969
IR 1767
Mg(OH)₂ 1064; MgO 1065, 1113, 1200

Alexander C. A. Ogden J. S.,
Levy H.,

J. Chem. Phys., 1963, 39, N11,
3057-3060. (amr)

M, H₂O

P.X., 1964, 225371

ESTD OXIDE

18 Б390. Характеристические температуры некоторых ионных соединений $A^{II}B^{VI}$, определенные рентгеновским методом. Baldwin T. O., Thompson C. W. X-ray characteristic temperatures of some II—VI ionic compounds. «J. Chem. Phys.», 1964, 41, № 5, 1420—1426 (англ.)

По интенсивностям брэгговских отражений, измеренным в интервале t -р от 100 до 1000° K, определены характеристич. t -ры Дебая (θ) и коэф. теплового расширения MgO, CaO, MgS, CaS и BaTe. Коэф. линейного расширения MgS, CaS, BaTe определены впервые, результаты для MgO и CaO удовлетворительно совпадают с литературными. При вычислении θ учитывалась ее зависимость от t -ры. Поскольку θ вблизи комнатной t -ры почти постоянна, то определялась некоторая подходящая для данного в-ва t -ра и соответствующая ей θ . Все остальные θ определялись по отношениям интенсивностей для измеряемой t -ры и выбранной. Все полученные значения θ хорошо укладываются на прямую в зависимости от величины, обратной параметру решетки. Получены среднеквадратичные смещения атомов в указанных соединениях.

Н. Орлова

20.1965. 18



IX 1951

1964

MgO, CaO, SrO, BaO ($D_0, \Delta H_{298}, \tau_e$)

Chandrasekharaiah M.S.,

J. Phys. Chem., 1964, 68(7), 2020-1

М. НО

сего опус

C.A., 1964, 61, N9, 100546

MgO

1964-65

10 Б349. Рентгенографическое определение параметров решетки и термического расширения окиси магния вплоть до 878°. Dutta B. N. Lattice constants and thermal expansion of magnesium oxide up to 878° C by X-ray method. «J. Scient. Res. Banaras Hindu Univ.», 1964—1965, 15, № 1, 80—85 (англ.)

Рентгенографически (метод порошка) при 25—878° определены параметры куб. решетки и термич. расширения образцов MgO чистотой 99,97%. Коэф. термич. расширения определялся по ф-ле: $\alpha_t = 10,01 \cdot 10^{-6} + 0,5230 \cdot 10^{-8}t + 2,001 \cdot 10^{-12}t^2$. Значения a (А) и α ($\times 10^6$) при 25° 4,2127; 11,14 при 878° 4,2632; 17,14. Установлено, что характер термич. расширения образцов MgO согласуется с величиной эффективного заряда (<2) на ионах в структуре. Полученные результаты находятся в хорошем соответствии с данными предыдущих исследований.

Э. Пудовкина

крист.

решетка

термич.

расшир.

X. 1966. 90

MgO

Goldfinger P.

1964

938

(DH)

Z. Chem. 1964, N3, S-150.

Massenspekt. Untersuchungen
anorganischer Systeme bei
hohen Temp.

1964

Aug 0

Robijn P.

Cp

Silicates Ind., 28: 247-53 (1964)

Measurement of the mean specific heat of refractory materials.

(see. SiO_2)

NSA. 1964. 18. 9

8 Б619. Системы MnO—MgO—CaO и MnO—MgO—FeO и их равновесия распределения с жидким марганцем и расплавом железо — марганец. Schenck Hermann, Froberg Martin G., Nünninghoff Reginald. Das System $\text{MnO(—FeO)—MgO(—CaO)}$ und seine Verteilungsgleichgewichte mit flüssigem Mangan und Eisen—Mangan-Legierungen. «Arch. Eisenhüttenwesen», 1964, 35, № 4, 269—277 (нем.; рез. англ., франц.)

Методами электронографии и рентгеновским определены постоянные решетки спеченных образцов систем MnO—CaO и MnO—MgO . Результаты указывают на образование твердых р-ров в обеих системах с линейным изменением параметра решетки от 4,45 Å (MnO) до 4,8 Å (CaO) в первой системе и с небольшими отклонениями от линейности во второй. Путем наблюдений с помощью микроскопа за началом плавления образцов, нагреваемых в токе Ag в вакуумной печи, конструкция которой была разработана ранее (РЖХим, 1962, 19Б291), определены т-ры солидуса в системах MnO—MgO (до 68,7% MgO) и MnO—CaO (до 81,3% CaO). Результаты подтверждают образование непрерывных рядов твердых р-ров в обеих системах. Т-ры ликвидуса определены расчетным путем по ур-нию

MgO
 CaO
и Mn

X.1965.8

1964

ВР-11-2133

⊗

$$\lg N_{A(\text{жидк.})} = \Delta H_{S(A)} \left(\left(\frac{1}{T_{S(A)}} \right) - \left(\frac{1}{T} \right) \right) / 4,575 + \lg N_{A(\text{тв.})},$$

где $N_{A(\text{жидк.})}$ и $N_{A(\text{тв.})}$ — мол. доли в-ва А в жидкой и твердых фазах соответственно, $T_{S(A)}$ — т-ра плавления чистого А, в °К, $\Delta H_{S(A)}$ — теплота плавления чистого А, в кал/моль. В основу расчета положены измерения т-ры плавления MnO , найденной равной $1842 \pm 10^\circ \text{C}$, и выбранные на основе крит. рассмотрения литературных данных теплоты плавления MnO , MgO и CaO , принятые равными 10,5, 12,0 и 11,0 ккал/моль соответственно. На основе исследования двух двойных систем и выполненного ранее исследования системы $\text{CaO} - \text{MgO}$ (Trojer E., Konopicky K. «Radex-Rundschau», 1949, № 4, 161) построена пространственная модель тройной системы $\text{MnO} - \text{MgO} - \text{CaO}$ и ее разрезы при 2000, 2200 и 2400°C . С привлечением литературных данных по системам $\text{FeO} - \text{MnO}$ и $\text{FeO} - \text{MgO}$ (РЖХим, 1961, 21Б318; 1962, 9Б424; 19Б291) построена пространственная модель тройной системы $\text{MnO} - \text{MgO} - \text{FeO}$ и ее разрезы при 1600, 1842 и 2300°C . Изучено распределение кислорода при различных т-рах между расплавами марганца и MnO и Mn и $\text{MnO} - \text{MgO}$. Также изучено распределение между жидкими сплавами $\text{Fe} - \text{Mn}$ и расплавами $\text{MnO} - \text{MgO} - \text{FeO}$. Результаты плавки Mn в тигле из MnO позволили построить часть диаграммы $\text{Mn} - \text{O}$, близкую к стороне Mn . Температура эвтектики найдена равной 1242°C . Путем экстраполяции кривой растворимости, подчиняющейся ур-нию $\lg [\% \text{O}] = -4823/T + 1,159$, содержание кислорода в эвтектике найдено равным 0,0095%.

Д. А.

MgO (молек. нос)

IX 2343

1964

Trajmar S., Ewing G.E.

J. Chem. Phys., 1964, 40, n 4, 1120 (англ.)

Identification of a new band system
of MgO in the near ultraviolet.

Есть ф. н.

Ризин, 1964, 98164

W

h

MgO

1965

6 E546. Измерение сжимаемости поликристаллического MgO с использованием метода отражения. Anderson L., Glynn Paul. Measurement of compressibility in polycrystalline MgO using the reflectivity method. «J. Phys. and Chem. Solids», 1965, 26, № 12, 1961—1967 (англ.)

Сжимаемость поликристаллич. MgO вычислена по спектру отраженных инфракрасных лучей с помощью ф-лы, предложенной для двухатомных кубич. кристаллов (Szigety B. «Proc. Roy. Soc. London, 1950, 204, 51—62)

$$1/\chi_T = \frac{R_0^2}{3u} \left(\frac{\epsilon_0 + 2}{n^2 + 2} \right)^{-1} m\omega_0^2,$$

ф. 1966. 62

где χ_T — изотермич. сжимаемость; R_0 — межатомное расстояние; u — объем ионной пары; ϵ_0 — диэлектрич. постоянная; n — показатель преломления; m — приведенная масса; ω_0 — отраженная частота. Сжимаемость, рассчитанная по данным спектрометрич. измерений, равна $6,097 \cdot 10^{-7} \text{ (кбар)}^{-1}$. На том же поликристаллич. образце модули упругости были измерены с помощью УЗ-метода и получена величина $\chi_T = 5,889 \cdot 10^{-7} \text{ (кбар)}^{-1}$, что согласуется с величинами, полученными из измерений на монокристаллич. образцах. Аналогичный расчет сжимаемости по известным оптич. свойствам был проведен для SiC и ZnO. Полученные результаты хорошо согласуются с данными прямых измерений упругих свойств, что показывает применимость ф-лы Сцигетти для широкого класса двухатомных соединений, включая сульфиды, окислы, карбиды.

А. Кутсар

MgO

1965

Phase equilibria studies in the system $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$.
Robert Jethro Baker, Jr. (Univ. of Illinois, Urbana). *Univ.*
Microfilms (Ann Arbor, Mich.), Order No. 65-3173, 209 pp.;
Dissertation Abstr. 26(2), 929(1965)(Eng). SNDC

C.A. 1965. 63.12
15615d

CaO, MgO (DH m) IX 2-7 1965

Belton G.R., Sharma R. S.,

NASA Accession No N65-

19778, Rept. No. JND&C-SR-5,

Avail C F STS, 1965, 10 pp

5

(9)

ca 1965

MgO

1965

7 М61. Спекание особо чистой окиси магния с добавками окиси гафния. Budnikow P. P., Matwejew M. A., Janowski W. K. Sinterung von Magnesiumoxid hoher Reinheit mit Zusatz von Hafniumdioxid. «Sprechsaal Keramik, Glas, Email, Silik.», 1965, 98, № 19, 624—628 (нем.)

Исследовался механизм спекания (СП) чистой MgO с добавками до 0,3 мол.% HfO_2 . Образцы $25 \times 3 \times 3$ мм прессовали под давл. 1250 кг/см^2 и обжигали при разных т-рах в течение 1 часа. Чистая MgO после СП имеет кажущуюся плотность (КП), равную 65% от теоретической. Добавки HfO_2 заметно повышают КП и при содержании ее 25% КП максимальна и близка к теоретической $3,62 \text{ г/см}^3$. Улучшение СП добавками HfO_2

х. 1966. 7м

связывается с образованием тв. р-ров. Повышение т-ры СП от 900 до 1300° повышает КП, а с дальнейшим увеличением т-ры до 1500° КП практически не меняется. Размеры зерен зависят от т-ры СП. С повышением т-ры СП от 1300 до 1500° размеры зерен увеличиваются с $1-3$ до $6-8\mu$. Изучено влияние давления прессования на КП до и после СП и на линейную усадку. При повышении давления прессования с 500 до 2500 кг/см^2 линейная усадка уменьшается с 25 до 19% , а КП обожженных образцов не меняется с давлением. Указывается, что механизм СП обусловлен процессами диффузии.

Р. Брескер

МгД(2)

Иурвич Л.В.,

1965

Кр. До

Доклад, обобщающий
исследовательские работы, представленные на соискание
ученой степени д-р. х. н.,
Москва, 1965.

МГО
(2019)

Гурвич Л. В., 1965

Теоретические и экспериментальные
исследов. термодинам. свойств
индивидуальных веществ.

ΔH°, Cp,

Do;

Доклад, обобщающий не-
которые работы, представ-
лен на совещание учё-
ной сессии перен. д. х. н.

Москва, 1965.

MgO (sol.)

JANAF

1985

T. ϕ .

100-3000°K

Mg O

1965

1 4 M51. Окись магния из морской воды. — Sea water magnesia. «Сeraimcs», 1965; 16, № 194, 37—39 (англ.)

На з-де фирмы Steetley Co. (Англия) $Mg(OH)_2$ осаждают из морской воды при взаимодействии с обожженным доломитом. В трубопроводе длиной 600 м, по к-рому поступает морская вода, осаждают $Ca(HCO_3)_2$ при помощи H_2SO_4 . Очищ. морскую воду подают в реакционные емкости, в к-рых ее перемешивают с доломитом. Образовавшаяся $Mg(OH)_2$ отстаивается в открытых бассейнах. Осадок промывают, затем часть влаги удаляют в фильтр-прессах. Полученный кек обжигают во вращающихся печах при $t > 1650^\circ$. Процесс подачи и обработки морской воды автоматизирован и контролируется с центрального пульта.

Я. Орловский

ж. 1966. 4.м

1 Б509. Средняя теплоемкость твердых растворов NiO-MgO. Лукиных Н. Л., Рыбакова Г. А. «Вестн. Ленингр. ун-та», 1965, № 22, 171—172 (рез. англ.)

Измерялась энтальпия тв. р-ров NiO—MgO. В области составов 5—35 мол. % NiO и 70—100 мол. % NiO значения ΔH_{298}^{1010} не зависят от состава тв. р-ра. Значения энтальпии для MgO, NiO и кварцевого стекла сравнены с литературными данными. Рубинчик

+1

Al_2O_3 (ΔH_{aq} , K_p) 1965
 MgO , MgF_2 , CaF_2 , La_2O_3 (ΔH_{aq}) 5 3

Nicollin C. 56310

Thès. Doct. sci. phys. Fac. sci. Univ. Lion. Lyon,
1965, 76p. (фрaнц.)

Contribution à l'étude de la dissolution
de quelques oxydes et fluorures dans la
cryolithe fondue.

Ph. Lum., 1969
25713

9
B (ch)

Mgo (molecul. wt.) ¹⁹⁶⁵ 3200.7

Prajmar S., Ewing G.

Astrophys. J., 1965, 142, v1, 77-83 (comm)

The near-ultraviolet bands of
Mgo: analysis of the D¹Δ-A¹Π
and C¹Σ-A¹Π systems.

Pub. J. 1966, 32202

Мд О. Громбе F.,
Тоех М.

1965

изучение
механизма
окислов

Bull. Soc. chim. France,
1965, n 4, 1070-1080

Использование техники солнечного нагрева для получения гистых окислов.

(см. Al_2O_3) I

х. 1965.21

1965

MgO
CaO
SrO
SnO₂
p

Mass-spectrometric determination of the stability of gaseous molybdates, tungstites, molybdates, and tungstates of magnesium, calcium, strontium, and tin. G. Verhaegen, R. Colin, G. Exsteen, and J. Drowart (Univ. Libre, Brussels, Belg.). *Trans. Faraday Soc.* 61(511), 1372-5(1965)(Eng). A no. of gaseous ternary oxides were identified mass-spectrometrically while vaporizing MgO, CaO, SrO, and SnO₂ and Sn from Mo and W crucibles. The stabilities of the gaseous mols. SrMoO₃, CaWO₃, SrWO₃, MgMoO₄, CaMoO₄, SrMoO₄, MgWO₄, CaWO₄, SrWO₄, SnWO₄, and Sn₂WO₅ were deduced from the measurements. The stabilities are surprisingly high, and this is attributed to ionic contributions to the intramol. forces.

David A. Edwards

C. A. 1965. 63.8
9416 ♀

omm, 1043

1965

VI-3936

CuO, BeO, ZnO, CoO, MgO, NiO, CdO, PbO, CaO,
S₂O, BaO (Haq)

Yokokawa T., Kleppa O.J.

Inorgan. Chem., 1965, 4, N12, 1806-808.

High-temperature calorimetry in liquid
oxide systems. II. The enthalpies of solution
of oxides of type MO in vanadium (V) oxide.

RX., 1966, 16 532

orig.

M, Be

Mgo

B9p - 4040 - $\bar{v}_1$ 1966

Brehat F; et al.

(Kp)

C. Z. Acad. Sci,
1966, 263, N20,
B 1112 - B 1115.

15506b Thermodynamics of the magnesia/magnesium-oxygen vapor system. F. J. Krieger (RAND Corp., Santa Monica, Calif.). AD 630914. Avail. CFSTI \$3.00 cy, 34 pp. (1966)(Eng). The thermodynamic investigation of MgO up to 6000°K. and pressures up to 1000 atm. is given. Two sets of equil. compn. equations are used, 1 representing a pure gas phase, the other a heterogeneous system of gas and condensed (i.e., solid or liquid) MgO. The gas phase of the heterogeneous chem. system, like the homogeneous gas phase, comprises 7 gaseous Mg-O species. A Mollier diagram in which sp. enthalpy is plotted against sp. entropy, with cross plots of temp., pressure, and mol. wt. or moles of condensed MgO is given. From *U.S. Govt. Res. Develop. Rept.* 41(10), 43(1966).
TCVL

C.A. 1967 - 67.4

1966

MgO

24 Б546. Абляция окси магния. Metcalfe A. G., Stetson A. R., Ohnysty B., Rose F. K. Ablation of magnesia. «Thermophys. and Temperat. Control Spacecraft and Entry Vehicles». New York—London, Acad. Press, 1966, 569—585 (англ.)

На основании результатов опытов по уносу материалов в струе плазмы показано, что термохим. теплота абляции окиси магния прямо зависит от энтальпии торможения. Найдено, что шагообразное возрастание теплоты абляции вызывает изменения в составе продуктов абляции. При малых энтальпиях ниже 3300 кал/г состав продуктов абляции определяется р-цией $(\text{MgO})_{\text{ТВ}} \rightarrow (\text{MgO})_{\text{газ}}$. Для энтальпии выше 3300 кал/г определяю-

x. 1967. 24

щей становится р-ция $(\text{MgO})_{\text{тв.}} \rightarrow (\text{Mg})_{\text{газ}} + (\text{O}_2)_{\text{газ}}$, а при высоких энтальпиях порядка $14\,000 \text{ кал/г}$ — р-ция $(\text{MgO})_{\text{тв.}} \rightarrow (\text{Mg})_{\text{газ}} + (\text{O})_{\text{газ}}$. Показано, что эти переходы не зависят от давления и расчеты согласуются с наблюдавшимся сдвигом т-ры абляции, когда давление изменялось в испытательной камере от 2 до 40 мм. Результаты измерений приведены в таблицах и на графиках.

В. Ф. Байбуз

V5402

1965

Al_2O_3 , MgO (H_{aq}), MgAl_2O_4 (H , H_{aq})

Navrotsky A., Kleppa O. J.,

Inorgan. Chem., 1966, 5, No 2, 192-193

High-temperature calorimetry in liquid oxide systems. III. The enthalpy of formation of magnesium-aluminum spinel.

RJXim., 1967, 15B579

M est orig

1066

BeO, MgO, SrO, BaO, TiO, VO, VI-4527
MnO, FeO, NiO, CuO, ZnO (Do, Δ Hs, Δ Hf)

Ормонт Б.Ф.

Докл. АН СССР, 1966, 166, /6/, 1393-6.

Максимум концентр. вакансий в бинарных соединениях.

M, J, Be

F. CA, 1966, 65, N1, 104b

V5405

1966

Pt, Al_2O_3 , Ir, BeO, Mo, UO_2 , MgO , Ta (T_m)

Riley B.,

Rev. internat. hautes températ. et réfract.

1966, 3, #3, 327-335. Discuss., 335-336

The determination of melting points at temperatures above 2000° celcius.

NOT RECORDED

RJXim., 1967, 13B635

Be est orig.

MgO

(L)

1966

7 E432. Параметр Грюнайзена окиси магния. White G. K., Anderson O. L. Grüneisen parameter of magnesium oxide. «J. Appl. Phys.», 1966, 37, № 1, 430—432 (англ.)

Экспериментальные значения коэф. теплового расширения MgO, известные до т-ры 20°K , свидетельствуют о том, что параметр Грюнайзена равен 1,60 при низких и комнатных т-рах. Вблизи т-ры Дебая ($800\text{—}1000^{\circ}\text{K}$) $\gamma \approx 1,5$. Это значение хорошо согласуется с величиной, рассчитанной из зависимости упругих модулей от давления.

ф. 1966. 78

Braunstein A., Braunstein M., Picus G. S., Mead C. A.

Photoemissive determination of barrier shape in tunnel junctions.

Phys. Rev. Letters, 1965, 14, N 7, 219—221.

Определение формы барьера в туннельных переходах по фотоэмиссии.

Мз 0

Юдин Б. Ф.,

Каркнут А. К.

1966

ис. прикл. анализ, 39,

п 3, 537.

термодинамика испарения
окислительных окислов при
высоких т-рах.

(см. SiO_2)

[бор - М 1706 - 17]

MgO

16 B527. Параметр решетки мелкоизмельченной MgO. Anderson P. J., Scholz A. Lattice parameter of finely-divided MgO. «Mater. Res. Bull.», 1967, 2, № 9, 895—897 (англ.)

1967

Показано, что высказанное ранее объяснение (РЖХим, 1967, 16B397) увеличения параметра решетки ионных кристаллов с уменьшением размеров их кристаллов на основе предположения, что полная энергия отталкивания между ионами не зависит от размеров кристалла, неверно. Сделан вывод, что зависимость полной энергии отталкивания от размеров кристалла более существенна, чем от кулоновской энергии. Поэтому энергия двух ионов в решетке равна сумме энергий кулоновской и отталкивания: $U = C\alpha/R + B\eta_1 \exp(-AR)$ (1), где A, B, C — положительные параметры взаимодействия, которые не зависят от размеров кристалла, R — расстояние между ионами, α — коэф., учитывающий кулоновское взаимодействие всего кристалла, η_1 — К4, α и η_1 зависят от размеров кристалла и равны 1,74565 и 6,0 соотв. для бесконечно-

ж. 1968. 16

го кристалла со структурой NaCl. Дифференцируя уравнение (1) по R и подставляя R_0 для равномерных полей, затем рассматривая кристалл с N ионами в грани и снова дифференцируя полученное уравнение по N [т. к. α выражается в виде степенного ряда от N : $\alpha = 1,747565 - 0,391479 N^{-1} - 0,21187 N^{-2} - 0,34036 N^{-3}$, $a\eta_1 = 6(1 - 1/N)$], получают уравнение $1/(N-1) \cdot [-1,747565/N + 0,391479/N + 0,21187/N^2(2 - 1/N) + 0,34036/N^3(3 - 2/N) + \dots] = \alpha/R_0(2 - AR_0)dR_0/dN$ (2). Параметр отталкивания $A = 1(2,5 - 3,0)$. А для различных ионных кристаллов, если взять $R_0 > (A^{-1} + A) > 2,0 A^{-1}$, тогда фактор $(2 - AR_0) < 0$ для всех реальных кристаллов. Поскольку левая часть уравнения (2) должна быть отрицательной, то $dR_0/dN > 0$. След-но, параметр решетки маленького кристалла меньше параметра решетки соответствующего большого кристалла.

И. Чернов

MgO

1967

16 Б528. Параметр решетки тонкодисперсной MgO. Garvie Ronald C. Lattice parameter of finely divided MgO. «Mater. Res. Bull.», 1967, 2, № 9, 897—898 (англ.)

Обсуждается вопрос о причинах ранее установленного (РЖХим, 1967, 16Б397) увеличения параметра решетчатых кристаллов в тонкодисперсном состоянии. Автор считает, что основную роль в этом явлении играет изменение кулоновской энергии, а не энергии отталкивания.

Р. С. Иванова

ж. 1968. 16

ВФ-108-IX

1967

МгО

3 A173. Криостат для измерения теплоемкости от 1,2 до 300° K и результаты измерений теплоемкости окиси магния ниже 36° K. Gmelin E. A cryostat for measuring heat capacities from 1, 2 to 300° K and measurements of the specific heat of magnesium oxide below 36° K. «Cryogenics», 1967, 7, № 4, 225—232, 234, 235, 236, 237 (англ.; рез. франц., нем., итал., русск.)

(ср)

Описаны детали конструкции калориметра, предназначенного для использования в области т-р от 1,2° K до комнатных т-р. Криостат снабжен ключом для охлаждения образца. Теплоемкость окиси магния высокой чистоты измерена в интервале т-р от 1,2 до 3,6° K. Предельное

ф. 1968. 3А

значение т-ры Дебая при низких т-рах найдено равным $945 \pm 1^\circ \text{K}$. Результаты представлены в форме суммы компонент, пропорциональных T^3 , T^5 и T^7 , коэф. при этих членах равны $4,62 \cdot 10^{-2} \text{ мдж/моль} \cdot \text{град}^4$; $-2,77 \cdot 10^{-7} \text{ мдж/моль} \cdot \text{град}^6$ и $1,73 \cdot 10^{-10} \text{ мдж/моль} \cdot \text{град}^8$. Полученные данные в области т-р от 20 до 36°K в пределах точности согласуются с литературными. Значения т-р Дебая согласуются с величинами, найденными из упругих модулей. Обсуждается вопрос о температурной зависимости т-ры Дебая. Библ. 44.

Резюме

MgO

BQ-108-IX

1967

Cp
1.2-36K

90468q A cryostat for measuring heat capacities from 1.2° to 300°K. and measurements of the specific heat of magnesium oxide below 36°K. E. Gmelin (Centre Natl. Rech. Tres. Basses Temp., Grenoble, France). *Cryogenics* 7(4), 225-32 (1967)(Eng). Details are given of the construction of a calorimeter to operate from 1.2°K. to room temp., by using a gas thermometer for temp. calibration and a mech. heat switch for specimen cooling. The sp. heat of high purity MgO was measured from 1.2° to 36°K. and the low temp. limiting Debye θ was found to be $945 \pm 1.5^\circ\text{K}$. The results can be expressed by the sum of contributions proportional to T^3 , T^5 , T^7 , with the coeffs. $A_2 = 4.62 \times 10^{-3} \mu\text{j./degree}^4 \text{ mole}$, $A_4 = 2.77 \times 10^{-7} \mu\text{j./}^\circ\text{K.}^6 \text{ mole}$, and $A_6 = 1.73 \times 10^{-10} \mu\text{j./degree}^8 \text{ mole}$, resp. The data agree with those of other workers from 20° to 36°K. within exptl. error and the Debye temps. calcd. from low temp. elastic const. measurements. The variation of the Debye θ vs. temp. is discussed. 44 references. JDJN

C.A. 1968. 68. 20

IX - 159

1964

MgO, SiO_2 (ΔH , S , T_{tr})

Mg-сумма (термод. св-ва)

Krieger F. J.,

U.S. Clearinghouse Fed. Sci. Techn.
Inform., AD 653925, Avail. CFSTJ,
1964, 51 pp

Б. 4.

MgO

22 Б547. Энтальпия растворения нескольких фторидов и окислов металлов в расплавленном криолите при 1300° К. Nicollin Camille, Lenoir Jeannine, Eyraud Charles. Enthalpie de quelques fluorures et oxydes métalliques dans la cryolithe fondue à 1300° К. «Bull. Soc. chim. France», 1967, № 2, 550—551 (франц.; рез. англ.)

Измерены ΔH р-рения MgO, La₂O₃, MgF₂ и CaF₂, рав-

ные соответственно (ккал/моль) 105, 250, 90 и 40 в расплавленном криолите при 1300° К. Точность определения ~20%. Установлено, что ΔH р-рения в интервале 1280—1313° К не зависит от т-ры. Попытки определить ΔH р-рения SiO₂ и CaO окончились неудачей.

Л. П. Тимофеева

ΔH р-рения

Х. 1967. 22

1967

III
Bp - 3710 - VIII



IX 486

1967

Окислы метал. зем. элементов

MeO, где Me = Be, Mg, Ca, Sr, Ba (OH, ~~OH~~ ^{acid}
Do

Schofield K.

Chem. Rev., 1967, 67(6), 407-415

CA, 1968, 68, p. 4, 16855b.

M, B, H.



CP; BeO; MgO (Do, номени. кривые) 1967-
-1968

Thakur S. N., Singh R. B., IX 4499

J. Scient. Res. Banaras Hindu Univ.,
1967-1968, 18, 11-2, 253-264 (anal.)

Potential curves and bond
strength of CP, BeO and MgO.

ЖХТУБ, 1974, 59122

10

(9)

MgO

1967

17 Б462. Динамика решетки MgO. Verma M. P., Dayal B. Lattice dynamics of MgO. «Phys. status solidi», 1967, 19, № 2, 751—756 (англ.; рез. нем.)

С помощью феноменологич. модели, в к-рой межатомный потенциал содержит 5 параметров, определяемых из значений упругих постоянных и оптич. частот, рассчитаны частоты колебаний для 1000 точек 1-й зоны Бриллюэна и двухфононная комбинированная плотность состояний (КПС) в кристалле MgO. Побочные максимумы в ИК-спектрах поглощения хорошо согласуются с максимумами кривой КПС. Получены дисперсионные соотношения, к-рые согласуются с данными других авторов при малых значениях волнового вектора q . С увеличением q согласие нарушается, особенно на границе зоны. Хорошее согласие между теоретич. и эксперим. значениями теплоемкостей подтверждает справедливость модели.

А. И. Шуб

X. 1967. 17

LiF, BeO, BF, CO, MgO, AlF, SiO, 1967
P.N, CaO, SrO, HCN, FHF⁻, CO₂
N₂O, OCN⁻, FCN, SCO, SCN⁻, ClCN
FO:CH, NCO:CH (D₀) IX-3235

Yoshimine M. McLean A.D.,
Int. J. Quantum Chem., Symp., 1967,
No 1, 313-26
60 24

V 6146

1968

MgO, CaO; ZnO, CuO, α -Al₂O₃, SiO₂ (Cp)
Na₂O, Fe₂O₃; Na₂O, SiO₂; Al₂O₃ · 3H₂O
(Cp; Δ H₁)

Апреток Б.И.,

Жл. урны. химии, 1968, II, 783-787

М, Б

IX
IX

1470

IX 467

1968

Cervitis R. M.

Lett. Res. Bull. 1968, 3, 533-536

Discussion on the paper:

"Lattice parameters of finely divided
LSD." by R. J. Anderson and A. Scholz;
Anderson R. J. Author's reply.

K. P. 5527

P. 5527 (1968)

(1968)
M. (5)

Be, B, Mg, Al (галогениды, окислы 1968
и оксигалогениды) (термодинам. свойства)
IX.821 9 15

Greenbaum M.A., Farber M.
Perform. High Temperat. Syst. Vol. 1, New York -
London - Paris, 1968, 1-8 (англ.)
Studies of the thermodynamic properties
of the light metals

РЖХим, 1970 15
561027



М, Б, Ю (92)

Al₂O₃

1968

Heinsler F. H., Cullen G.

J. Am. Ceram. Soc., 51(10),
557.

Stress, temperature and
strain rate in creep
of Al₂O₃.

MgO

Кузьмин В.Н.

1968

ΔG_f

Kp

(w. SiO) I



Mg + O

Креомис!

X. 1969

8

8 Б909. Исследование реакции паров магния с кислородом на поверхности осадков MgO с помощью атомной абсорбционной спектрофотометрии. Markstein G. H. Study of the reaction of magnesium vapor and oxygen at the surface of MgO deposits by atomic-absorption spectrophotometry. «12th Sympos. (Internat.) Combust. Poitiers, 1968. Abstrs papers». Pittsburgh, Pa, Combust. Inst., s. a., 10—12 (англ.)

Описан метод измерения концентрации паров Mg вблизи поверхности MgO, нанесенного на покрытую Au стеклянную или обогреваемую джоулевым теплом нихромовую пластинку. Показано, что при давл. $(7,5-230) \cdot 10^{-3}$ мм и избытке O₂ в логарифмич. координатах наблюдается линейная зависимость коэф. поглощения резонансного излучения Mg (2852 Å) от расстояния от поверхности MgO (1—2 мм). Константа скорости р-ции с увеличением т-ры падает, при этом эффективность соударения уменьшается от 1 при 410° K до 0,04 при 730° K.

Э. Г. Раков

1968

BeO, CaO, SrO, MgO (cur. nos. Do)
mon. nos. X1Σ.) 1968

Yoshimine M., 9 IX 648

J. Phys. Soc. Jap., 1968, 25(4), 1100-19.

Computed ground state properties
of BeO, MgO, CaO, and SrO in mole-
cular orbital approximation.

Eq. 2 of II.

PA 106970-14 145961

MgO(2)

1969

Donnerstag 12. 2.

Leo Brewer, Gerd Rosenblatt.

"Adv. in High Temp. Chem.

1969, 2, I-83.

Alt ^c 1953

MgO

Co

Guelin &

1969

4. Mays. and Chem. Solids,
30 (12), 2789.

(Cell. BeO) I

MgO

(Cp)
S

ор. 1970.

42

ВФ - 886 - IX

1989

2) 4 E967. Тепловые свойства окислов щелочноземельных металлов. I. Измерения теплоемкости. Gmelin E. Thermal properties of alkaline earth-oxides. I. Specific heat measurements. «Z. Naturforsch.», 1969, 24a, № 11, 1794—1800 (англ.)

Теплоемкость MgO, CaO, SrO и BaO, имеющих структуру типа NaCl, измерена с помощью адиабатич. калориметра в области т-р от 1,2 до 340° K. Для охлаждения образцов использован механич. тепловой ключ, для калибровки т-р выше 4° K применен газовый термометр. Погрешность сглаженных данных <0,8%. Приведены таблицы C_p . Значения энтропии при 273,15° K для перечисленных окислов равны, соответственно, 27,19; 38,3; 51,9 и 66,9 дж/моль·град. Библ. 20. Резюме

+3

17

MgO

B9p-886-IX

1969

Co

S⁰

243.15

36572p Thermal properties of alkaline earth oxides. I. Specific heat measurements. Gmelin, Eberhard (Centre Nat. Rech. Tres Basses Temp., Grenoble, Fr.). *Z. Naturforsch. A* 1969, 24(11), 1794-800 (Eng). The heat capacities of MgO, CaO, SrO, and BaO, with the NaCl structure, have been measured with an adiabatic calorimeter at 1.2-340°K. A mech. thermal switch is used for specimen cooling and the temp. calibration $>4^{\circ}\text{K}$ is performed with a gas thermometer. The entropies at 273.15°K are 27.19, 38.3, 51.9, and 66.9 for MgO, CaO, SrO, and BaO, resp., in J/mole-abs degree. The accuracy of the measurements is $\pm 0.8\%$ (smoothed curve). BGJN

C.A. 1970.

72.8

MgO

Sp

S₂₉₈

✓ 12 Б1148. Термические свойства щелочноземельных окислов. I. Измерения теплоемкости. Gmelin E. Thermal properties of alkaline-earth-oxides. I. Specific heat measurements 1—3. «Z. Naturforsch.», 1969, 24a, № 11, 1794—1800 (англ.)

С помощью адиабатич. калориметра, детально описанного ранее (см. РЖХим, 1968, 7Д31), снабженного тепловым ключом и пригодного для измерений теплоемкости тв. в-в между 12 и 340° К, измерены теплоемкости щел. зем. окислов, имеющих структуру NaCl, с точностью не хуже 0,8% (для сглаженных данных, сведенных в таблицу). Описаны нек-рые детали экспериментов. Энтропия при 273,15° К (в э. е.) равна для: MgO 29,19; CaO 38,3; SrO 51,9; BaO 66,9. Результаты измерения сравниваются с лит. данными. Графич. экстраполяцией получены значения т-ры Дебая (θ, °К) при 0° К, равные соответственно 945±1; 605±2; 401±0,5; 232±0,5.

В. А. Соколов

+3

X. 1970.

12

ВФ-886-1X

ВР-VII-3801

1969

 MgO ZrO_2 $H_T - H_{298}$

+1

X. 1970 3

3 Б760. Измерение энтальпии и теплоемкости окиси магния и двуокиси циркония в интервале температур 1200—2500° К. Кантор П. Б., Фомичев Е. Н. В сб. «Теплофиз. свойства твердых тел при высоких температурах. Т. I». М., 1969, 406—408

На высокот-рной калориметрич. установке методом смешения определена энтальпия MgO (чистота 99,90%) и ZrO_2 (чистота 99,80%) в интервале т-р 1200—2500° К. Предельная погрешность определения не превышает 1,2%. Найденные значения энтальпии MgO выше справочных данных на 2%.
А. М.

K

AlgO(c)

1969

Adviser 1962

Leo Brewer, Gerd Rosenblatt.
"Adv. in High Temp. Chem".

1959, 2, 1-33.

A H Po
1238

CaO , MgO , SrO ; Y_2O_3 , Al_2O_3 , TiO_2 , 1969
 Yb_2O_3 , Er_2O_3 , Ho_2O_3 , Dy_2O_3 ,
 Yd_2O_3 (Tm) VII-5259

Noguchi T., Advan. High. Temp.,
Chem., 1969, 2, 235-62

h

10



ca 1970

VII - 4630

1969

$MgCr_2O_4$, Cr_2O_3 , MgO (Tur)

Pánek Z., Kanceliř E.,

Silikáty, 1969, 13, v3, 225-260

5



celý opis

1X3800

1969

MgO- Al_2O_3 - SiO_2 - CaO (T_h)

Schreyer W., Seifert F.,

Amer. J. Sci., 1969, 267A, 407-443

Есть ф. н.

IX 4625 1969
MgO, CaO, Na₂O, K₂O; SiO₂; Al₂O₃;
FeO, MnO, CrO₃; TiO₂, Zr.

Wänke H.,

Umschau, 1969, N23, 776-778

Есть опечатка.
М.Л.

VI 6696

1969

Mgo, CrO, MnO, FeO (D.)

Zeegers P. J., Townsend W. P.,

Winefordner J. D.,

Spectrochim. acta, 1969, B24, v5, 243-254

10. M. B.

NOTE

Pnax, 1970, 451316

IX 2990 MX_2 , где $M = Be, Mg, Ca, Sr, Ba$
 $X = F, Cl, Br, I$ ($\Delta H f^\circ$)

$M Y$ (крист.) $Y = O, S, Se, Te$ ($\Delta H f^\circ$).

$M'_2 Y$ (крист.) $M' = Na, K, Rb, Cs$ ($\Delta H f^\circ$).

Bousquet J., Diot M.,
Bull. Soc. Chim. France, 1970,
12, 4302-04

(cp)

Ca FI

u

MgO

Cp.

(922802) Thermal properties of alkaline earth oxides. II. Analysis of experimental results for magnesium, calcium, strontium, and barium oxides. Gmelin, Eberhard (Centre Nat. Rech. Tres Basses Temp., Grenoble, Fr.). *Z. Naturforsch. A* 1970, 25(6), 887-93 (Eng). The heat capacities of MgO, CaO, SrO and BaO are analyzed in terms of the frequency spectrum of the lattice with the assumption that the effect of anharmonicity of the lattice may be neglected for $T \leq (\Theta_D/3)$. Following the usual procedure, the n -th moments of the frequency spectrum with $n = -3$ to 6 were calcd. from the exptl. data. From the low frequency expansion, the apparent Debye characteristic temp. at 0°K, Θ_0 , is calcd. to be in good agreement with Θ_0 (elast.), calcd. from elasticity data. Also the limiting values at high temps. Θ_∞ , and the zero point energy, E_z , have been calcd. A comparison between the heat capacity data, the elastic consts., and thermal properties of these oxides and the alkali halides suggest that the interat. forces of the alk. earth oxides are rather similar to those of the alk. fluorides. But no specific divalent character has been detected for these oxides. An appreciable anharmonic effect is present for all oxides.

KWJN

1970

27913

Om

C.A. 1970. 73.18

+3



MgO
Оксиды

щелочно-
земельных
металлов

θ_0

9. 1970. 118

11 E672. Тепловые свойства окислов щелочно-земельных металлов. II. Анализ экспериментальных данных для MgO, CaO, SrO и BaO. Gmelin E. Thermal properties of alkaline earth oxides. II. Analysis of experimental results for MgO, CaO, SrO, and BaO. «Z. Naturforsch.», 1970, 25 a, № 6, 887—893 (англ.)
- Результаты измерений, приведенные в ч. I (РЖФиз, 1970, 4E967) подвергнуты анализу с точки зрения частотного спектра в предположении, что ангармонизмом решетки можно пренебречь для $T \leq \theta_D/3$. С помощью обычного метода по эксперим. данным определены n -моменты спектра частот (n от -3 до $+6$). Определены значения дебаевской t -ры при $0^\circ K$ (θ_0). Величины θ_0 согласуются с рассчитанными из данных по упругим свойствам. Определены также значения θ при высоких t -рах θ_∞ и значения энергии при абс. нуле. Сопостав-



+3

1970

27913
am.



ление данных по тепловым и упругим свойствам рассматриваемых окислов и щелочно-галогидных соединений свидетельствует о том, что межатомные силы у окислов сходны с таковыми у фторидов щелочных металлов. Специфики двухвалентности у окислов не обнаружено. Установлено существование заметного ангармонич. эффекта у всех изученных окислов. Библ. 16. Резюме

МДО, FeO_x (термод. св-ва) 9.16 в. 1970
Лыкасов А.А.; Кожу^жров В.А. № 3887
Сб. науч. тр. Челябинск. политех.
инст., 1970, № 66, 13-20 (русск.)

Термодинамическая твердость
расплавов вюститов и окислов
манганов.

М З
(см. оригинал)

Сд. 1972, 76, № 28457.

Mo, Nb, Ta, Zr, W, C, MgO, (ΔH , 1970
NbC, ZrC, TaC, SiC, TiB₂, (Cp, Ttr,
ZrO₂, ΔH_{tr}) VII 5357

Шейндин А. Э., Тихоновской В. Я.,
Шмидтманн Е. Е.,

High Temp. - High Pressures,
1970, 2, № 1, 1-15 (англ.)

Исследования термодинамичес-
ких свойств твердых тел
при высоких температурах
в ИВИАиСС.

БФ 20 СФ, 1971, 74, N16, 80465W

1970

MgO

Cp

9 E767. Теплоемкость ионов Fe^{2+} в MgO . Smith J. L., Seidel G. Heat capacity of Fe^{2+} in MgO . «Phys. Letters», 1970, A31, № 5, 275—276 (англ.)

На образце MgO с добавкой 0,01% Fe измерена теплоемкость C в интервале т-р $1,3-4^\circ\text{K}$ в магн. поле до 80 кэ с целью исследования теплоемкости в системе с сильной спин—фононной связью. Полученная кривая зависимости C от величины $g\beta H/kT$ (значение букв общепринятое) соответствует ф-ле Шоттки. А. К. Киконин

ф. 1970. 98

MgO

Tm

(103982d) Growth of magnesium oxide crystals from the vapor. Cockayne, Brian; Filby, J. D.; Gasson, Denys B. (R. Radar Establ., Malvern/Worcestershire, Engl.). *J. Cryst. Growth* 1971, 9(1), 340-5 (Eng). The growth of MgO single crystals (m.p. 2850°) from the vapor is described using molten spinel (MgAl₂O₄, m.p. 2105°) as the source material. The substrate temp. is ~1900°, and growth has therefore been achieved some 1000° below the m.p. of the material. Two different classes of growth were obsd. One class consists of a lattice work of spontaneously nucleated whiskers, 10-20 μ thick. The other class is epitaxial growth on an MgO substrate in the form of plateaus or needle-like deposits. The morphol. of these various growth forms have been examd. in detail by optical x-ray and scanning electron microscope techniques. The transport of the MgO from the molten spinel to the substrate appears to be a sublimation process since the gaseous ambient offers no possible chem. reactions with the molten spinel. The morphol. of the various growth features obsd. is explained by an impurity-controlled growth mechanism. Al or AlO₃ compds. obtained from the molten spinel are suggested as the active impurity. RCMT

1971

BP-3120-1X

+1

C. A. 1971. 74.20.



89-3120-IX

1971

MgO

19 Б573. Рост кристаллов MgO из пара. Cockayne B., Filby J. D., Gasson D. B. The growth of MgO crystals from the vapour. «J. Cryst. Growth», 1971, 9, May, 340—345 (англ.)

Монокристаллы MgO (т. пл. 2850°) получены осаждением из пара с использованием расплавленной шпинели (MgAl_2O_4 , т. пл. 2105°) в кач-ве материала источника. Рост происходил в атмосфере азота при т-ре MgO-подложки $1900-1200^{\circ}$, а в нек-рых случаях с добавлением небольших кол-в кислорода и паров воды. Наблюдались два различных типа роста: спонтанное образование усов длиной до 10 мм и эпитаксиальный рост на подложке MgO в форме плато или иглообразных отложений. Мор-

Г. м.

X. 1971 19

фология различных форм роста детально исследовалась рентгенографич. и электронографич. методами. Рассмотрен механизм возникновения различных форм роста, причем авторы предполагают, что активными примесями здесь может быть алюминий или нек-рые формы AlO_x , источником к-рых служит газовая фаза, образовавшаяся за счет частичной диссоциации расплавленной шпинели. Предполагается, что перенос MgO от расплава шпинели к подложке происходит как процесс сублимации.

В. А. Еорякова

Mg O
GMAF
II. egg
(Crystal) 100-4000°K
(Liquid) 100-3000°K
(1965)

1971

1981

MgO

12 Б900. Исследование испарения MgO и ZrO_2 в окислительной среде. Караулов А. Г., Елтышева А. А., Маяускас Ю. С., Янулис В. В., Гринюте Г. А. «Огнеупоры», 1971, № 2, 49—53

Приведены результаты исследования испаряемости MgO и ZrO_2 , стабилизированной CaO , до 2700° на воздухе. До 1900° интенсивность испарения MgO и ZrO_2 близка, при более высокой т-ре интенсивность испарения MgO резко возрастает и при 2200° ее величина на порядок больше, чем у ZrO_2 . Испаряемость ZrO_2 в окислительной среде при т-рах интенсивного испарения (2300°) примерно такая же, как в инертной среде. Резюме

испарение

X. 1981. 12

+1



Иг-Н-О

ΔHf

Ср

T_{из}

Киреев В. А.

1941

Сб. пер. Моск. инт-

строей. ин-т, 1941,

№69, 3-18.

(См. Са-силькаты) I

As (p , ΔH_s , ΔH_m)

XIII 2275

1971

MgO (C_p)

Malaspina L. Gigli R., Bardi G.

Calore 1971, 42(8), 317-26 (Ital).

Determination of thermodynamic
parameters by a Calvet microcalorimeter
for high temperature values.

5

@

CA, 1973, 79, 52, 10567K

Одзор

1971

Al_2O_3 , BeO , CaO , CeO_2 , Cr_2O_3 , ZrO_2 ,
 HfO_2 , La_2O_3 , MgO , SiO , ThO_2 , UO_2 ,
 Y_2O_3 (хим. раз. св-ва) VIII 5634

Осе 3, Когучо Реаметари,
1971, N46, 41-46

св. раз. 20

И, Б
С 972

MgO (m.h.)


IX 3143

1971

Singh M.,
J. Phys. B.,

1971, 4, N⁴,
565-567

CA, 1971, 75, N⁴, 27761j



MgO

1972

31115x Thermodynamics of hydration of magnesium oxide. Vladov, B. F.; Vezentsev, A. I. (USSR). *Tr. Belgorod. Tekhnol. Inst. Stroit. Mater.* 1972, No. 1, 96-8 (Russ). From *Ref. Zh., Khim.* 1973, Abstr. No. 10B735. The temp. dependence of Gibbs free energy of the hydration reaction of MgO with liq. H₂O and vapor was studied. Hydration with vapor $\leq 115^\circ$ was energetically more advantageous than with liq. H₂O.

(ΔH_{hydr})

C.A-1974.80 N 6

1972

MgO

Ср

CaO

SiO

BaO

(ангармон.)

18 Б643. Термические свойства окислов щелочноземельных элементов. III. Анализ эффектов ангармоничности. Gmelin E., Vieira S. Thermal properties of alkaline-earthoxides. III. Analysis of anharmonic effects. «Z. Naturforsch.», 1972, 27a, № 4, 605—612 (англ.)

Предложен новый метод анализа эффектов ангармоничности при обработке высокотемпературных термодинамических данных для окислов щел.-зем. металлов. Ангармоничный вклад в C_p пропорционален температуре. Факторы ангармоничности для MgO $(-0,4 \pm 0,4) \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$, для CaO $(2,3 \pm 1,2) \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$, для SiO $(-2,8 \pm 1) \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$, для BaO $(-3,9 \pm 1) \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$. Положительное значение фактора ангармоничности обнаружено для открытых структур типа CaO, который в этом отношении подобен галогенидам K, за исключением KF. Сообщ. II см. РЖХим, 1971, 1Б745. Л. А. Резницкий

X. 1972. 13

MgO

1972

39866b Thermal properties of alkaline earth oxides. III. Analysis of anharmonic effects. Gmelin, E.; Vieira, S. (Phys. Inst., Univ. Wuerzburg, Wuerzburg, Ger.). *Z. Naturforsch. A* 1972, 27(4), 605-12 (Eng). Exptl. heat capacity data were used to analyze the thermodynamic properties of MgO, CaO, SrO, and BaO at high temp. by a new method in terms of quasi-harmonic and explicit anharmonic contributions. The explicit anharmonic contribution ΔC was consistent with theoretical predictions and proportional to T in a 1st order approxn. The factor of anharmonicity A was for MgO $(-0.4 \pm 0.4) \times 10^{-5}$, for SrO $(-2.8 \pm 1) \times 10^{-5}$, for BaO $(-3.9 \pm 1) \times 10^{-5}$, and for CaO $(2.3 \pm 1.2) \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{K}^{-1}$. The type of anharmonic forces is detd. as well as in the alkali halides primarily by the cation of the salt.

Cp

meprug-
cb-bb

C.A. 1972. 77. 6.

MgO

1972

(442)

(11917Im) Energy of formation of a Schottky defect in magnesium oxide. Harding, B. C. (Aust. Natl. Univ., Canberra, Phys. Dep.). *Phys. Lett. A* 1972, 40(3), 227-8 (Eng). A thermodynamic-type calcn. of the enthalpy of formation of a doubly ionized Schottky defect based on a series of solid-state reactions in MgO gave a value of 4.0 eV, i.e., in agreement with the value $(3.8 \pm 0.3 \text{ eV})$ obtained from cation self-diffusion expts.

C.A. 1972. 44. 18

MgO

Иванова Л.И. 1972

(ϕ^*, S_T^0)

м. физ. химии,
1972, 46, N 3, 766-9.

● (сст. TiB_2 ; I)

MgO

Bp-5050-IX

1972

(P) 48031y Vapor pressure measurement (free evaporation) of aluminum oxide and magnesium oxide. Kroenert, W.; Boehm, A. (Inst. Gesteinshuettenkd., Rheinisch-Westfael. Tech. Hochsch. Aachen, Aachen, Ger.). Glas-Email-Keramo-Tech. 1972, 23(9), 319-23 (Ger). Vapor pressure-temp. relations for these materials were detd. as follows: $\log P_{\text{Al}_2\text{O}_3} = -3.5714.1/T \times 10^4 + 15.0712$, $\log P_{\text{MgO}} = -3.0303.1/T \times 10^4 + 14.7575$. Discrepancies between these measurements and published data were attributed to differences in materials, degree of purity, form of sample, crystallite size, porosity, and differences in measurement technique. S. K. Alley, Jr.

C.A. 1973, 78, N8

(41) Al_2O_3
X

Mgo

1972

(4Gtr)

66727p Approximate activity-composition relations in the system magnesium oxide-zinc oxide at $1205 \pm 5^\circ$. Kenny, D. S.; Navrotsky, A. (Dep. Chem., Arizona State Univ., Tempe, Ariz.). *J. Inorg. Nucl. Chem.* 1972, 34(7), 2115-19 (Eng). Activity-compn. relations in the MgO-ZnO system were derived from the direction of conjugation lines between oxide and spinel phases in the MgO-ZnO- Al_2O_3 ternary system at $1205 \pm 5^\circ$ in air, under the assumption that the spinel phase behaves ideally. For the transformation: $\text{MgO (rocksalt)} = \text{MgO (zincite)}$, the free energy change, $\Delta G = 9.6 \text{ kcal.}$

CA. 1972. 77. 10

Mig 0

1973

Barin J, et al

vol. I; p. 441.

298-3098(78)

3098-3533(2)


(encl. HGF, I)

Be, Si, Mo, Al, Mg, B, Nb, Zr, Hf, Ta, W,
W, Re (элементы окислы, карбиды
и силициды) (НТ-Н₀) 1X 4651

Bondarenko V. P., Fomichev E. N.,
Kondyba V. V., High. Temp. - High.
Pressur., 1973, 5, N1, 5-7

MgO

5 от
св. от



MgO

1973

12 Б698. Энергии решеток кубических окислов щелочноземельных металлов. Сродство кислорода к двум электронам. Cantor Stanley. Lattice energies of cubic alkaline-earth oxides. Affinity of oxygen for two electrons. «J. Chem. Phys.», 1973, 59, № 9, 5189—5194 (англ.)

Энергии
решетки

Энергии решеток кристаллов окислов щел.-зем. металлов рассчитаны из ур-ний, основанных на модели Борна и ур-ний состояния Гильдебранда, и содержащих члены, учитывающие взаимодействия Ван-дер-Ваальса. Расчет проведен с использованием результатов недавних измерений упругих постоянных кристаллов, нового аддитивного набора электронных поляризуемостей щел.-зем. и халькогенидных ионов, новых оценок влияния взаимодействий Ван-дер-Ваальса на энергию решетки

Х. 1974 N 12

(+2)

А

(Сер O, III)

и результатов вычислений нулевых энергий из измерений теплоемкости. Получены след. значения энергии решетки (в ккал/моль): -905 ± 3 (MgO), -815 ± 8 (CaO), $-767 \pm \pm 10$ (SrO), -736 ± 15 (BaO). Эти величины энергии решетки в сочетании с теплотами образования окислов и др. соотв-щими термодим. данными дают значение 149 ± 8 ккал/моль для энтальпии р-ции атома кислорода с двумя электронами. Указывается, что эта величина сродства кислорода к двум электронам значительно меньше большинства значений сродства, ранее полученных др. авторами. Расхождение объясняется использованием уточненных более высоких значений изотермич. сжимаемости кристаллов. В. Ф. Байбуз



Mgo

Bp-4447-IX

1973

Christensen N.H.

(Tr)

Dansk. kemi., 1973, 54
N5, 61-65

MgO

1973.

№ 12 E595. Приближенные термодинамические расчеты температур плавления твердых веществ под давлением. Горбунов Л. В. «Ж. физ. химии», 1973, 47, № 8, 1963—1966

Выведено ур-ние для приближенных расчетов т-р плавления твердых в-в под давлением через изменение изобарно-изотермич. потенциала и мольного объема твердых фаз. Показана удовлетворительная сходимость рассчитанных и эксперим. величины на примере четырех различных в-в. Определены кривые плавления для 10 в-в, опытных данных по которым в настоящее время нет.

Резюме

(T_m)
 $G_{T_0} - G_T$
 $V_{T.p}$


ф. 1973 N 12

общ.

(+9)

✗

сл. на абз.



$$G_{T_0} - G_T$$

MgO

1973

1 Б887. Приближенные термодинамические расчеты температур плавления твердых веществ под давлением. Горбунов Л. В. «Ж. Физ. химии», 1973, 47, № 8, 1963—1966

Выведено уравнение для приближенных расчетов т. пл. тв. в-в под давл. через изменение изобарно-изотермич. потенциала и мольного объема тв. фаз. Показана удовлетворительная сходимость рассчитанных и эксперим. величин на примере четырех различных в-в. Определены кривые плавления для 10-ти в-в, опытных данных по которым в настоящее время нет.

Резюме

x. 1974

11

CaO

CaTiSiO₅

TiO₂

MgAl₂O₄

MgF₂

CaMgSiO₄

FeTiO₃

Ca₂MgSi₂O₇

ZrSiO₄

MgO

CaO

TiO₂ ugp.

(T_m)

1973

65591b Thermodynamic equation of melting curves of solid substances under pressure. Gorbunov, L. V. (Vses. Nauchno-Issled. Inst. Sint. Miner. Syr'ya, Aleksandrov, USSR). *Tezisy Dokl. - Vses. Soveshch. Fiz. Tekh. Vys. Davlenii*, 1st 1973, 207 (Russ). Edited by Galkin, A. A. Akad. Nauk Ukr. SSR, Donetsk. Fiz.-Tekh. Inst.: Donetsk, USSR. An equation is derived to calc. the melting curves of solid substances under pressure. The melting curves were calcd. for MgO, CaO, TiO₂, MgF₂, FeTiO₃, CaTiSiO₅, MgAl₂O₄, ZrSiO₄. The equation is recommended for pressures up to 60 kbar. M. Wiedemann

79 C.A. 1975. 83. N8

(+7) X

30419.1896

Ph. TE

MgO

бакани 42531

Halliburton Larry E., Kappers Lawrence
A., Cowan David L., Dravnieks Frīcis,
Wertz John E. Isotropic ESR line of
the $\underline{v}^{\text{III}}$ center in MgO at room temperatu-
re. "Phys. Rev. Lett.", 1973, 30, N 13,
607-610 (англ.)

0252 сир

843 847

850

ВИНИТИ

MgO -

1973

5 Б802. О процессе гидратации окиси магния при различных условиях. Каминская А. Ю., Валу-
жене Б. А., Матайтис А. И., Причкайте-
не Ю. К. «Ж. неорган. химии», 1973, 18, № 11,
3144—3146.

процесс
гидратации

Изучен процесс гидратации окиси магния при 25 и 95° в чистой воде и в присутствии различных добавок карбоната магния. Показано, что при добавлении небольших кол-в трехводного карбоната магния (около 5%) полностью исключаются нежелательные пересыщения р-ра; кристаллизующаяся при этом однородная тв. фаза по своим физ.-хим. св-вам отличается от обычной гидроокиси магния, что, по-видимому, обусловлено образованием микродисперсных тв. р-ров между гидроокисью и карбонатом магния.

Резюме

X. 1974 N 5

MgO

1973


Литературный обзор

по теме: "Теплоемкость"

кристаллов

пов. теплоемкость
кристаллов

(см. Hall, I)



Резников И. Л., Мокрова Л. Н.,
 Изв. Высш. учеб. завед., Цвет.
 мет., 1973, №1, 67-9 (русск.)

Периодические свойства
 растворов хлорида магния
 в хлориде кальция и хлори-
 де натрия.

М(с) А, 1973, 79, №18, 108769с

MgO

1973

85: 149849w Thermal dissociation of magnesium oxide. Shchedrin, V. M.; Kulikov, I. S.; Telegin, A. A.; Vas'kin, V. N. (Inst. Metall. im. Baikova, Moscow, USSR). *Deposited Publ.* 1978, VINITI 6683-73, 21 pp. (Russ). Avail. VINITI. The pressure of O above MgO was measured mass spectrometrically and thermal decompn. of MgO and reversible oxidn. of Mg were studied in a system in which the condensed decompn. products were measured gravimetrically. The partial pressures (P) of O, at. O, and Mg were calcd. as functions of temps. by the corresponding equations: (1) $\log P_{O_2}(\text{atm}) = -25,389/T + 6.83$; (2) $\log P_O(\text{atm}) = -25,928/T + 6.85$ and (3) $\log P_{Mg} = -25,509/T + 7.30$. A short review is given for thermal dissocn. of MgO and for calcns. of free energy of the dissocn.

ΔG_{free}

C.A. 1976. 85. N20

MgO

1973

3 Б829 Деп. Термическая диссоциация окиси магния. Щедрин В. М., Куликов И. С., Телегин А. А., Васькин В. Н. Ин-т металлургии АН СССР. М., 1973. 21 с., ил., библиогр. 29 назв. (Рукопись деп. в ВИНТИ 28 авг. 1973 г., № 6683—73 Деп.).

С помощью масс-спектрометра (омегатрон) в условиях сверхвысокого безмасляного вакуума впервые непосредственно измерено давление диссоциации MgO. Окисел диссоциирует на кислород и ненасыщ. пар магния, в связи с чем давл. кислорода над ним $lg P_{O_2} =$

$= -25389/T + 6,83$ атм на 10—20 порядков величины (в зависимости от T -ры) выше, чем получаемое по расчету в предположении наличия магниевого конденсата или при давл. его пара, равном 1 атм. Результаты объясняют окисление железа при плавлении в магнетитовом тигле, восстановление магния вольфрамом в катодах косвенного нагрева. Приведены обзор термодим. данных о прочности MgO, методы и результаты расчета равновесного состава газовой фазы и парц. давлений продуктов диссоциации MgO. Автореферат

(кр)

Вр - 4360-11

х. 1974 N 3

30319.8218

Me, TE, Ph, Mt

MgO

30007

1973

4-51

Sinha M.N., Lloyd D.J., Tangri K. Microyield and fracture in polycrystalline MgO. "J. Mater. Sci.", 1973, 8, N 1, 116-122 (англ.)

0833 пик

820 824 8

ВИНИТИ

MgO, $MgSiO_3$, Mg_2SiO_4 , $MgAl_2O_4$, | 1973

Al_2O_3 , SiO_2 , Al_2SiO_5 (ΔH_{aq} , ΔH_f) | 4190

Shearer J. A., Kleppa O. J.

J. Inorg. and Nucl. Chem., 1973, 35,
N4, 1073-1078 (ann.)

The enthalpies of formation of $MgAl_2O_4$,
 $MgSiO_3$, Mg_2SiO_4 and Al_2SiO_5 by oxide
melt solution calorimetry.

PIHXUW, 1973

156755

M, B (C)

ECTB. QM-4
818

MgO (u.n.)

IX-4303 1973

Singh M.,
J. Phys. B: Atom. and Mol. Phys.,
1973, 6, N7, 1339-1343 (anim.)

A new electronic transition of 11π -
 $x^1\Sigma$ of MgO.

ЕСТЬ ОРИГИН.

Рис Ким, 1974, 35154

10

(P)


MgO (u.n.)

Singh M., 1X 4415-1973

J. Phys. B: Atom. and Mol. Phys.,
1973, 6, N9, 1917-1922 (u.n.)

The $G^1\Pi - X^1\Sigma$ and $G^1\Pi - A^1\Pi$ tran-
sitions of MgO.

Proc Lum, 1974, 75139



ВФ-4470-IX

1974

MgO

① 10 Б588. К вопросу о вычислении теплоемкостей по данным оптических спектров. Альбицкий Э. Г., Калмыков В. А., Капацкий Н. А., Курбатов Г. А. «Ж. прикл. химии», 1974, 47, № 1, 227—229

По данным спектров отражения ИК-излучения определены теплоемкости MgO, Al₂O₃ и SiO₂, крист. решетки к-рых принадлежат к различным структурным типам. Вычисленные значения теплоемкостей для т-рного интервала от 50 до 400 К приведены в таблице и сопоставлены с лит. данными. Автореферат

(ср)

+2



X. 1974

N 10

MgO

Al₂O₃

SiO₂

(Cp)

BQP-4470-IX

1974

125462k Calculation of heat capacities according to data of optical spectra. Al'bitskii, E. G.; Kalmykov, V. A.; Kopatskii, N. A.; Kurbatov, G. A. (USSR). *Zh. Prikl. Khim. (Leningrad)* 1974, 47(1), 227-9 (Russ). An attempt was made to calc. heat capacities on the basis of data of optical spectra of light reflected or radiated by solid or liq. phases, viz. according to the frequencies of longitudinal and cross phonons and the forces of oscillators for all parts of optical spectra by using classic dispersion anal. The reflection coeffs. were measured by a spectrograph IKS-14. The contribution of optical vibrations is given by summation of the Einstein function and that of acoustic vibrations by the Debye function. By using this simple relation, heat capacities of 3 oxides of different structural types (MgO, Al₂O₃, and SiO₂) at 50-400°K were calcd. and compared with exptl. values, the agreement being good. Jan J. Linek

C.A. 1974. 80. N22

+2

IX - 5321

1974

MgO, BaO, CaO, Na₂O, Al₂O₃, SiO₂, ZrO₂, P₂O₅
(в H₂SO₄, в H₂SO₄ - в HF)

Авдеевич А.И., Миронов И.И.,
Коваленко Н.В.

М. физ. химии, 1976, 50, № 4, 1043-1044

И. В.

СА, 1976, 85, № 8, 52571 и

LiF, NaF, KF, MgO, 1974.
CaO, SrO (Ter). 174785

Jackson J.N.S., Liebermann R.C.
J. Phys. Chem. Solids, 1974, 35(9)
1115-19.

Melting and elastic shear
instability of alkali halides.

C.A. 1974. 81 n20. 127906c. 10 5 (p)

NaCl , MgO , Al , Cd , Mg , графит, 1974.
(нов. теплоемкость кристаллов)

Onsager L., Moon T.Y., IX 4932
Stud. Nat. Sci. (N.Y.), 1974, 4
(Quantum Stat. Mech. Nat. Sci., [Coral
Gables Conf.], 1973) 227-79.

Surface specific heat of crystals. I.

C.A. 1975.23v2.167267.

Б

8

MgO

Rigaud M,
Giovannetti G.

1974

m.g. eb. bu

"J. Chem. Thermodyn." 1974,
6, N10, 993-998 (curr)

(see Co O; I)

x. 1975. N8.

CaO, MgO, BeO (u.n., Do) 1974

PX - 4628

Stagg N. J., Richards W. G.,
Mol. Phys., 1974, 27, N 3,
727-28

10

2076 gpk

$MgF_2 + H_2O = \underline{MgO} + 2HF$ (кр). 1974.
Щипакин Ю. А., IX 4736

ис. орг. химии, 1974, 48 (II),
2635-8.

Нелинейная экстраполяция
уравнения константы хими-
ческой реакции.

М

С.А. 1975. 82 № 8. 482434

BeO, MgO; CaO, SrO, BaO, 1974.
(Os, W₂), O²⁻. (A) IX-4864
Thakur K.P.
J. Inorg. Nucl. Chem., 1974, 36
(10), 2171-3.
Properties of alkaline earth
oxides in the crystalline state.
C.A. 1975, 22 N14. 90280m. 10.5. (P)

Mg 0 (A) ix 45 49 1974

Tsou K. Y., Hensley E. B.,
J. Appl. Phys., 1974, 45(1),
47-49

10

MgO

ВФ-4529-1X

1974

13 Б846. Энтальпия и теплоемкость окиси магния при высоких температурах. Цагарейшвили Д. Ш., Гвелеснани Г. Г. «Теплофиз. высоких температур», 1974, 12, № 1, 208—210

$H_T - H_{298}$

C_p ;

В калориметре смешения измерено теплосодержание MgO (чистота 99,8%) в т-рном интервале 298—1600° К. Аппроксимированные результаты вместе с значениями теплоемкости и энтропии табулированы с шагом 100°. Т-рная зависимость теплосодержания выражена ур-нием $H_T - H_{298,15} = 11,18 T + 0,67 \cdot 10^{-3} T^2 + 2,27 \cdot 10^5 / T - 4154$. Погрешность измеренных средних теплоемкостей MgO не превышает 1%. Результаты удовлетворительно согласуются с лит. данными

А. Гузей

Х. 1974. N 13

MgO

BP-4529-IX

1974

$H_T - H_{298}$;
(C_p)

30371m Enthalpy and heat capacity of magnesium oxide at high temperatures. Tsagareishvili, D. Sh.; Gvelesiani, G. G. (Inst. Metall., Tbilisi, USSR). *Teplofiz. Vys. Temp.* 1974, 12(1), 208-10 (Russ). Enthalpy and heat capacity C_p of MgO were detd. calorimetrically by the mixing method with a 1% error at $T = 298-1600^\circ\text{K}$. Their values were correlated by empirical equations $C_p = 11.18 + 0.00134T - 2.27 \times 10^5/T^2$ cal mole⁻¹ degree⁻¹ and $H_T - H_{298.15} = 11.18T + 0.00067T^2 + 2.27 \times 10^5/T - 4154$ cal mole⁻¹. D. B. Ocenaskova

C.A.1974 81~6

51009.7557

Ch, TC

22463 GR

MgO (cp, 4H)

1974

- Bibliography Section. "J. Therm.
Anal.", 1975, 8, № 1, 201-228

(англ.)

TSAGAREISHVILI, D. SH., GVELESIANI, G. G.
(Acad. Sci. GeSSR, Met. Inst., Tbilisi,
GeSSR): Enthalpy and heat capacity of
magnesium oxide at high temperatures.
Teplofiz. Vysok. Temp. transl. *High Temp.*
USSR 12 (1974) 183

446 448

14 5 4

ВИНИТИ

ZnO (ΔH_{soln} в MgO)
 MgO (ΔH_{soln} в ZnO)

IX-5091

1975

Башикиров Л.И., Башикирова
М.Т.,

Изв. АН СССР. Сер. неорганич. хим.,
1975, 11 (7), 1276-9

Фазовые равновесия в тройной
системе $MgO-FeO-FeO$

С.А. 1975.83 v24.1984065

Б,И © 52

MgO

9 Б958. Энтальпии образования соединений в системе $\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ при 970°K , полученные методом высокотемпературной калориметрии растворов. Chaglu T. V., Newton R. C., Kleppa O. J. Enthalpies of formation at 970 K of compounds in the system $\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ from high temperature solution calorimetry. «Geochim. et cosmochim. acta», 1975, 39, № 11, 1487—1497 (англ.) 197

(ΔH_s)

В дифференциальном калориметре типа «Кальве» с использованием в кач-ве р-рителя расплава $2\text{PbO} \cdot \text{SiO}_2$ измерены энтальпии р-рения петрологически важных фаз в системе $\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ при 970°K . Приведены кристаллохим. и хим. характеристики исследуемых природных и синтетич. минералов. Показано, что увеличение степени гомогенности расплава — р-рителя и его дегазация ведут к уменьшению ошибки воспроизводимости. С этим же обстоятельством связано небольшое, но систематич. отклонение полученных данных от лит. значений для этих же минералов. Парц. энтальпия р-рения при 970°K ($\Delta \bar{H}_{s, 970}$) MgO равна $1,18 \pm 0,08$ (9), SiO_2 — $1,23 \pm 0,07$ (20), Al_2O_3 $7,73 \pm 0,08$ (19) (ккал/моль, здесь



(15)

X 1976 №9

+

и далее в скобках число определений). MgSiO_3 (энстатит): $\Delta \bar{H}_{s, 970} = 8,78 \pm 0,13$ (24) (среднее из данных для различных образцов), энтальпия образования из окислов при 970°K ($\Delta H_{f, 970}^0$) равна $-8,81 \pm 0,17$; $(\text{MgSiO}_3)_{0,9} \times (\text{Al}_2\text{O}_3)_{0,1}$ (глиноземный энстатит): $\Delta \bar{H}_{s, 970} = 7,74 \pm 0,11$ (9), $\Delta H_{f, 970}^0 = -7,01 \pm 0,15$; Al_2SiO_5 (силлиманит) с примесью 1 вес. % кварца: $\Delta \bar{H}_{s, 970} = 7,07 \pm 0,09$ (II), $\Delta H_{f, 970}^0 = -0,57 \pm 0,14$, энтальпия образования из окислов при 298°K ($\Delta H_{f, 298}^0$) равна $+0,35$; Mg_2SiO_4 (форстерит): $\Delta \bar{H}_{s, 970} = 16,11 \pm 0,24$ (23), $\Delta H_{f, 970}^0 = -14,97 \pm 0,27$, $\Delta H_{f, 298}^0 = -14,40$; MgAl_2O_4 (шпинель): $\Delta \bar{H}_{s, 970} = 14,29 \pm 0,14$ (10), $\Delta H_{f, 970}^0 = -5,38 \pm 0,18$, $\Delta H_{f, 298}^0 = -5,29$; $\text{Mg}_3\text{Al}_2\text{Si}_3\text{O}_{12}$ (пироп): $\Delta \bar{H}_{s, 970} = 27,79 \pm 0,32$ (18), $\Delta H_{f, 970}^0 = -20,21 \pm 0,38$, $\Delta H_{f, 298}^0 = -17,17$; $\text{Mg}_2\text{Al}_4\text{Si}_5\text{O}_{18}$ (кордиерит) синтетический: $\Delta \bar{H}_{s, 970} = 27,54 \pm 0,22$ (8), $\Delta H_{f, 970}^0 = -15,87 \pm 0,31$, $\Delta H_{f, 298}^0 = -11,90$; кордиерит природный с примесью 1 вес. % FeO: $\Delta \bar{H}_{s, 970} = 27,95 \pm 0,42$ (6), $\Delta H_{f, 970}^0 = -16,28 \pm 0,48$, $\Delta H_{f, 298}^0 = -12,31$. Полученные данные могут быть использованы при термодинамич. расчетах модельных петрохим. систем.

К. Г. Кравчук

1) Mg_2SiO_4 ($\Delta H_s, \Delta H_f$)
 2) $\text{Mg}_3\text{Al}_2\text{Si}_3\text{O}_{12}$ ($\Delta H_s, \Delta H_f$)
 3) Al_2SiO_5 ($\Delta H_s, \Delta H_f$)

MgO

CaO

SrO

BaO

(Cr)

5 Б989. Термодинамические и оптические свойства окислов щелочноземельных металлов. Galtier M., Montaner A. Propriétés thermodynamiques et optiques des oxydes alcalino-terreux. «Phys. status solidi (b)», 1975, 70, № 1, 163—172 (франц.; рез. англ.)

Рассмотрена динамич. модель тв. окислов щел.-зем. металлов, имеющих структуру каменной соли (MgO, CaO, SrO, BaO). Для описания межмолек. взаимодействия дальнего порядка использован диполь-дипольный Пт, для короткодействующих сил — трехчастичный Пт. Имеющиеся эксперим. данные по теплоемкости, ИК-поглощению, КР и рассеянию нейтронов сопоставлены с теор. данными, полученными с использованием одно и двухфононных плотностей состояний. Удовлетворительное соответствие теор. и эксперим. данных свидетельствует о применимости модели для интерпретации оптич. спектров изученных кристаллов. Резюме

1975

№ 1946 N5

(+3)

MgO-Si₃N₄-Al₂O₃ IV-5097¹⁹⁷⁵
(parab. group).

Hendry A., Pereira D.S.,
Thompson D.P., Jack K.H.,
Spec. Ceram., 1975, 6, 321-31.

Phase relations in the
MgO-Si₃N₄-Al₂O₃ system.⁵
1975 23 & 24. 198438d 6 (9)

MgO

(T_m ; T_k)

Вср - 4998 - IX

1975

21 Б872. Свойства расплавленной окиси магния. Leu An—Lu, Ma Shao—Mu, Eyring Henry. Properties of molten magnesium oxide. «Proc. Nat. Acad. Sci. USA», 1975, 72, № 3, 1026—1030 (англ.)

Теория характеристич. структур использована для расчета термодинамич. и кинетич. св-в расплавленной окиси магния. При расчете в газоподобной части суммы по состояниям учтено существование равновесия MgO с газ. атомами Mg и молекулами O₂. В интервале т-р от точки плавления (3098,16°K) до точки кипения (3873,2°K) рассчитаны и табулированы значения эн-

x 1975 N21

тропии (S), теплоемкости (C_p), молярного объема, коэф. термич. расширения (α), сжимаемости, коэф. самодиффузии, подвижности ионов и уд. проводимости расплавленной MgO . В интервале t -р от $100^\circ K$ до t . пл. термодинамич. св-ва тв. MgO табулированы и сопоставлены с лит. данными, причем получено разумное согласие для S , C_p и α .

В. Ф. Байбуз

MgO (me)

Bcp-4998-IX

1975

me-puug.
cb-da

- ✓ 16724p Properties of molten magnesium oxide. Leu, An-Lu; Ma, Shao-Mu; Eyring, Henry (Chem. Dep., Univ. Utah, Salt Lake City, Utah). *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 1975, 72(3), 1026-30 (Eng). The Significant Structure Theory of Liquids has been used to calc. the thermodyn. properties, viscosity, self-diffusion coeff., and specific conductance of molten magnesium oxide, taking account of the decompn. of MgO [1309-48-4] to Mg and O₂ species in the gas-like part of the partition function.

C.A. 1975 83 N2

$\text{LaCl}_3 + \text{MgO}$ (дв) IX 4964 1975


Термяков П.Т., Коршунов В.Т.,
Кросин В.А.,

Изв. высш. учебн. заведения.
Сер. цвет. металлы, 1975, (3),
93-5.

Взаимодействие LaCl_3 с MgO .

С.А. 1975.83 №18. 153252х. М (Ф)

3 $\text{MgCl}_2 \cdot 2\text{NdOCl}$ (Тм) ТХ-504-1 ¹⁹⁷⁵



Пермяков Л.Т., Коршунов Б.Т.,
Крошкин В.А.,

Ис. Неорг. химии, 1975,
20 (7), 1965-9

Взаимодействие NdCl_3 и
 YCl_3 с MgO .

С. А. 1975. 23 и 20. 169020f. БФ 5

SiO_2 , Al_2O_3 , MgO 1975
(Damon Zacher) IX-5093

Tossell J. A.,
J. Phys. Chem. Solids, 1975,
36 (11), 1273-80.

Electronic structures of
magnesium, aluminum and sili-
con in octahedral coordination
with oxygen from ...
C.A. 1975. 83 n 24. 199577k. 10 

18-5510

1975

Управление воен.

H_2 , H_2O , CH_4 , NH_3 и т.д.

FeO , Fe_2O_3 , Fe , Al_2O_3

CaO , MgO (вн)

Исследователь В.И., Труды В.И.

Ученый В.И.

Вопросы науки. 1975, 3, 5-45

Исследования В.И. В.И. В.И.

В.И. 1975, 4, 195-196

М.И.

1

MgO

1975

Zhil'tsov Y. I. et al

Справит. Научн. Тр., Пермск Политех.
Инст. 1975, 170, 180-5 (Рус)

ан. Ge - I

MgO

1976

(D₂)

584: 52414s Debye temperature of magnesium oxide powder by elastic neutron scattering. Beg, M. M. (Res. Establ. Risoe, DAEC, Roskilde, Den.). *Acta Crystallogr., Sect. A* 1976, A32, Pt. 1, 154-6 (Eng). The Debye-Waller exponent B and the Debye temp. Θ_D for a powd. sample of MgO was detd. at room temp. by elastic neutron scattering. Detailed calcns. were made to est. the thermal diffuse scattering under the Bragg peaks. This contribution proved to be negligible. The value obtained for B is $0.354 \pm 0.008 \text{ \AA}^2$ which corresponds to a Θ_D of $743 \pm 8^\circ\text{K}$. The Θ_D value for the powd. sample is $\sim 2\%$ lower than the corresponding value obtained from a single crystal.

~~584: 52415t Anomalous thermoelastic properties of the~~

E. A. 1976 84 N8

MgO

1976

Cox J.D.

$\Delta H_f^\circ, S_f^\circ$
H-H

CODATA Bull. 1074,
22pp. (Eng)

en. F-I

MgO

1976

J 86: 47812g High-temperature calorimeter for determining reaction enthalpies. Lazarev, V. M.; Proshina, O. P.; Suponitskii, Yu. L.; Maier, A. I.; Karapet'yants, M. Kh. (Mosk. Khim.-Tekhnol. Inst. im. Mendeleeva, Moscow, USSR). *Zh. Fiz. Khim.* 1976, 50(8), 2160-1 (Russ). A high temp. calorimeter is described for measuring the enthalpies of reaction of substances at 298-1000 K. The calorimeter is a variation of the E. Kalve (1963) type which is a modernization of O. J. Kleppa's (1960) calorimeter. Heat of soln. of MgO and of WO₃ in melts of compn. 3Na₂O.4MoO₃ detd. at 973 K compare favorably with literature data.

WO₃

ΔH_{soln}

⊠ (+1)

C. A. 1977, 86 N 8

MgO (ΔH , ΔH , ΔH_f , D_0) IX-5354 1976

Farber Milton, Srivastava R.D.
High Temp. Sci., 1976, 8, N3, 195-201 (aurp.)

The dissociation energy of magnesium
oxide.

R.H. X. 1977
95626

8.10

M, B, Ю (CP)

BeO, MgO, CaO, SrO, BaO (Do.) 1976

Srivastava R. D. IX-5429

High Temp. Sci., 1976, 8, N3, 225-232 (curr.)

The dissociation energies of alkaline
earth monoxides

РЖХим., 1977

95625

M, 10 (CP)

У пер. цен

AlgO

1976

Смаишев Д.С. и др.

($\Delta M, \Delta S, \Delta G$)
р-изм

Ж. физ. Хим. 1976,
50, N 12, 3109-11.

(сд. Ли Б М, I)

1977

7 Д859. Хемилюминесценция цепных реакций горения щелочноземельных элементов в смеси $N_2O + CO$. Benard D. J., Slafer W. D., Hecht J. Chain reaction chemiluminescence of alkaline earth catalyzed $N_2O + CO$ flames. «J. Chem. Phys.», 1977, 66, № 3, 1012—1016 (англ.)

Исследована хемилюминесценция (X) газофазных реакций окисления Mg, Ca и Sr в смеси ($N_2O + CO$) в потоке He при давлениях реагентов $\leq 1 \cdot 10^{-2}$ мм рт. ст. Наряду с атомарными линиями переходов $^3P_1 \rightarrow ^1S_0$ в металлах (M) и основными молекулярными полосами MO^* в спектре X зарегистрирован ряд полос в УФ- и видимой областях спектра, соотношенных с переходами между высоковозбужденными состояниями MO^* . Отме-

+2



P. 1977. № 2

нено, что аналогичные полосы наблюдались в спектрах излучения дуговых разрядов в воздухе между электродами из соответствующих металлов. Наиболее интенсивные полосы с длинами волн около 372, 550 и 595 нм соотнесены с переходами типа $^3\Delta \rightarrow a^3\Pi$ в MgO , CaO и SrO соответственно. Проведены измерения коэф. поглощения или усиления на переходах МО с излучением в области 530—700 нм при расположении реакционной зоны внутри оптического конфокального резонатора. На основании этих измерений, а также определения квантового выхода X сделан вывод о перспективности использования исследованных химич. систем в качестве активной среды химич. лазеров на электронных переходах молекул.

С. Л.

Mg O(c)

1977

Cox J.D.

J Chem. Thermodyn. 1977,
9(8), 705-6 (Eng.)

$\Delta H; 8^\circ,$
 $H_{298} - H_0^\circ$

ca. $SO_4^{2-} - I$

MgO

Hirata K.

1977

направ.
ручекки

"J. Mater. Sci"

1977, 12, N 4, 838-839

(англ.)

● (cu ThO₂; I)

Мгдо

1977

Савиенкова Е. Л., Лешкова
Р. П., Браздоловская В. И.

(ДНтр) Ж. прикл. химии, 1977,
50 (10), 2155-7.

Кристаллизация Мгдо в
растворе ● Мгс₂-Кс₂-NaCl

С. А. 1977. 87 и 26. 209607 н.

MgO
крас.
0-4000
(св.)
0-5000

м.жк.св.в

1978.
Chase u.v. et al.
J. Phys. Chem. and Ref.
Data, 1978, 7(3), 933-940
JANAF Thermochemical
Tables. 1978. Supplement.

P 937 - 938

(см. индекс; III)

МгО

1948

Кирмизбаев Р. А. и др.

Ср

Геммотехника, 1948, (6),
36-40.

1 см. Al_2O_3 ; I)

1978

MgO (r)

p n

Lee H.L., Saba T,

Yogyo-Kyokai - Shi 1978,

86 (1) , 28-34

MgO

[ommuu 7081] 1978

Maeda E., et al.

$\left(P, \Delta H_{298}^{\circ} \right)$
 ΔG_f

J. Ceram. Soc. Jap;
1978, 86 (998), 491-9

Alg0

ommu 7262

1978

Puri U, et al

Hamming.
cis. nov.
Dr. Karam,
Uromayz.

Indian J. Pure
and Appl. Phys.
1978, 16, 692-93

Alg O (ic) [commuck 12737] 1978.

Sata T., et al.

(p) Rept/Res. Laboratory
of Engineering Materials
1978, N3, 41-52

MgO (κ) Commerce 12739 | 1978.
Gata T., et al.

(P) Proc. Intern. Sympos.
of Factors densification
and sintering of oxide
and non-oxide ceramics,
1978, Japan, p. 182 - 187

1978

MgO
Ga₂O₃
SiO₂

(Tm)

(+2) 17

15 Б940. Фазообразование в системе $\text{MgO}-\text{Ga}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$. Smart R. M., Glasser F. P. Phase formation in the system $\text{MgO}-\text{Ga}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$. «J. Mater. Sci.», 1978, 13, № 3, 671—674 (англ.)

С помощью оптич. микроскопии, петрографии и дифрактометрии изучено соотношение фаз в системе MgO (I)— Ga_2O_3 (II)— SiO_2 (III). Синтезировано 18 сплавов различного состава. Исходными в-вами для синтеза служили II, III и MgCO_3 . Образцы после тщательного перемешивания спекали при $\sim 1100-1500^\circ$. Установлено, что при 1420° в течение 12—24 час. получается Ga—сапфирин (IV), к-рый при отношении $\text{I}:\text{II}:\text{III}=4:5:2$ плавится инконгруэнтно при $1490 \pm 5^\circ$, превращаясь в Ga—шпинель. IV обладает монокл. структурой, $P_{21/a}$: a $11,598 \pm 0,005$; b $14,757 \pm 0,006$; c $10,233 \pm 0,005$ Å; β $125,64^\circ$. Получен также метастабильный Ga—муллит. Представлено изотермич. сечение системы при 1390° . В системе миним. т. пл. $1392 \pm 7^\circ$, по-видимому, принадлежит составу $\text{I}:\text{II}:\text{III}=2:2:5$.

Л. Г. Титов

x, 1978, N15

MgO

1949

Castellanos m., West A.R.

J. Mater. Sci., 1949, 14, n. 2, 450-
-454,

T_{tr}

(cer. Li_2TiO_3 ; I)

Algo

1979

Farber M.

(ΔHf)

Gov. Rep. Announce
Index (U.S.), 1979, 79
(24), 98

(see. BaD; III)

1979

MgO

MnO

№ 13 Б766. Энтальпии смешения в твердых растворах MgO—MnO. Gripenberg H., Seetharaman S., Staffansson L. - I. Enthalpies of mixing in MgO—MnO solid solutions. «Chem. scr.», 1978—1979, 13, № 5, 162—164 (англ.)

Энтальпии смешения ΔH^M при образовании тв. р-ров из MgO и MnO измерены в калориметре р-рения ЛКВ-8700 (6 М HCl, 40°, 50 мг в-ва на 100 мл р-ра). Тв. р-ры получены керамич. способом из оксидов прокаливанием при 1200° 48 час. в Аг. Установлена линейная зависимость параметра решетки от содержания MgO (порошкограмма, метод Гинье — Хегга, Cu, K_{α} -излучение). Определены $\Delta H_{\text{раств.}}$ тв. р-ров с мольной долей MgO равной 0,164, 0,320, 0,532, 0,635 и 0,736. Установлены небольшие положит. значения ΔH^M , максим. значение 5 кДж/моль при $X_{\text{MgO}} \approx 0,45$. ΔH^M , вычисленные по модели Вазаштерна — Хови, приводят к хорошему согласию с экспериментом, давая $\Delta H = 3,5$ кДж/моль при $X = 0,5$.

Л. А. Резницкий

(ΔH_{soln})

⑦1

A

№ 1980 № 13

Mg-окисл.

Б1136 К. Роль процесса испарения легколетучих металлов в механизме их высокотемпературного окисления и воспламенения. Препр. Ин-т хим. физ. АН СССР. Фурсов В. П., Шевцов В. И., Гусаченко Е. И., Стесик Л. Н. Черногоровка, 1979. 15 с., ил. 197

*роль процесса
испарения
металлов*

Приведены результаты анализа эксперим. данных по высокот-рному окислению легколетучих металлов с учетом испарения и газофазных р-ций. На примере Mg показано, что в большинстве реальных случаев, когда металл покрыт пористой окисной пленкой, лимитирующей стадией процесса окисления паров является процесс испарения, ограничивающий скорость окисления величиной кинетич. скорости испарения в вакуум предельно возможной при данной т-ре. Проведены расчеты скорости окисления магния в широком диапазоне т-р и сравнение их с эксперим. данными, известными из лит. Установлено, что в области высоких т-р, в к-рой происходит незащитное окисление Mg вклад гетерог. р-ции в механизм окисления может стать незначит. Показано, что доля окисления паров Mg становится существенной при т-рах, значительно более низких, чем наблюдаемые на опыте т-ры воспламенения, что ставит под сомнение тезис о гетерог. воспламенении этого металла.

Резюме

Д. 1980.113

MgO (ΔH soln)

1979

Mg₂SiO₄

(ΔH_f)

91: 97622u Determination of the heat of dissolution of magnesium oxide by a high-temperature calorimetric method. Kiseleva, I. A.; Ogorodova, L. P.; Topor, N. D. (Geol. Fak., Mosk. Gos. Univ., Moscow, USSR). *Vestn. Mosk. Univ.*, Ser. 2: *Khim.* 1979, 20(3), 243-7 (Russ). Heats of soln. of MgO in molten 2PbO.B₂O₃ are 2.02 ± 0.18 and 1.68 ± 0.23 kcal/mol at 1170 and 1070 K, resp. Measurements were carried out at 700-907° by using a high-temp. differential microcalorimeter. Heat of soln. of forsterite (Mg₂SiO₄) at same temps. are 19.24 ± 0.19 and 18.03 ± 0.28 kcal/mol and heat of formation (from oxides) are $-(13.90 \pm 0.33)$ and $-(13.98 \pm 0.55)$ kcal/mol.

(+1) ☒



C.A. 1979, 21, N/2