

С 14 гр.
ионн

$S^{-}(2)$
(ΔfH)

~~1966~~
18-II-ТКВ

Сродство к электрону атомарной серы,
11 с.

1968

S_2^-, S_2^{2-} и др.

1 Б1016. Ионно-молекулярные реакции отрицательных

ионов. I. Отрицательные ионы серы. Dillard John G., Franklin J. L. Ion-molecule reactions of negative ions.

I. Negative ions of sulfur. «J. Chem. Phys.», 1968, 48, № 5, 2349—2352 (англ.)

и. — с.

$\Delta H_f(S^-)$

$\Delta H_f(S_2^-)$

2. 1969. 1

$S_2(D_0)$; $SH(D_0)$ 12 $S^+(SH)$ 1168
 $OS-O(D_0)$; $HS-H(D_0)$ $S^+(SH)$ XII 56

Robeler V.H. Boston S.K.

J. Chem. Phys., 1968, 49 (2), 482-5

Mass-spectrometric study of
photoionization of hydrogen sulfide
and sulfur dioxide

CA 1968, 63, 820, 8039H.

Котяхметов С. М. и др. | 1983

8-
Сумманды

(книга)

Применение МС и ЭВМ
в термодинамич. исследованиях
суммандов

ЛСР в 5-ке
ИВТАИ

J^d-
(ray)

[OM. 34049]

1990

Molbrook J.B., Sabry-
Grant R., et al.,

(A Ht)

J. Chem. Educ. 1990,
67, N4, 304-307.

S⁺.

1990

Margreiter D., Walder G.
et al.,

эксперим.
серия
ионизации

Int. J. Mass Spectrom.
Ion. Processes 1990, 100,
143-56.

(Cur. ● SF₅⁺; I)