

Вх-г.соедин.

$Am(SCN)_n$, $Cm(SCN)_n$, VII 553, 1972
 $Bk(SCN)_n$, $Cf(SCN)_n$, $Es(SCN)_n$ (Kp)

Harmon H.D., Peterson J.R., McDowell W.J.,
Coleman C.F.

J. Inorg. and Nucl. Chem., 1972, 34, N4, B31-B37 (aia)
The tetrad effect: the thiocyanate complex
stability constants of some trivalent actinides

P.H. Yusa, 1972
19871



B (P)

Ламтаниды, актианиды, ацетатные
комплексы тина (HOCH_2CO) Ag^{2+}
(термог. образ.) 1972
 $M = \text{Br}$

Muenze R.,
J. Inorg. and Nucl. Chem., 1972,
34, N2, 661-68

B

Ca 72

$\text{Ce}(\text{SCN})^{2+}$, $\text{Eu}(\text{SCN})^{2+}$, $\text{Am}(\text{SCN})^{2+}$, $\text{Cm}(\text{SCN})^{2+}$, $\text{Bk}(\text{SCN})^{2+} (\text{Kp})$ 1974

Kinard W. F., Choppin G. R.

J. Inorg. and Nucl. Chem., 1974, 36, N3,

1131-1134

B

Hg - Bk

1996

Puminski C.,

J. Phase Equilib. 1996, 17(5),
443-444.

одеж
мер.
гаченых

(см. Hg - ● Cm; I)