

CaO



CaO

K₂S II -151,9 ± 0,5

NBS -151,9

Flux. Ross. -151,7

K₂S I -151,9 ± 0,5 (Bich. Ross)

K₂SO₄ -150,65 ± 0,4

Er (1953) -151,7 ± 0,5 (Bich. Ross)

Xyden, Kalden -151,78 ± 0,21

K₂S III -151,9 ± 0,5 (NBS)

1875

CaO

Berthelot

Ann. chim. phys., 1875, 4, 531

DMf

Tenuee pacp.

CaO 8 lice. 330420

~~Al₂O₃~~ = -46, 17

w. 298

Bp CaO ; $\frac{1 \times 2143}{\text{up}}$ (pH sol.) 1899

Gautier H.

X. Compt. rend. 128, 939 (1899,)

-941

3

Circ. 500

B

1899

1906

CeO

Mabignan

Ann. chim. phys., 1906, 8, 242

ΔHf

Temelone post.

CeO 8 HCl · 110 H₂O

ΔH = -47.0

IX - 3090

1908

$\text{BaCO}_3; \text{BaSO}_4; \text{CaO}$ (H_T-H₀)

Zaschschenko P. N.,

C. z. Acad. sci., 1908, 147, 58.

Note sur les chaleurs d'échauffement de
la barytine la withérite et de la chaux
fondue.



50 ~~92~~

Kennu N° 584

IX-3069

1910

BaCO_3 ; BaSO_4 ; CaO (Нт-Нб)

Лащенко П.Н.

Ж. рус. физ-хим. об-ва, 1910, 42, 1604

Теплоемкость BaCO_3 ; BaSO_4 и CaO .



Б~~Ф~~

Келли N° 584

CaO

Bq - 7035 - IV

1913.

Bq - V - 711

Magnus A.

(Cp)

" Phys. Z.

1913, 14, 5-11.

CaO

Kanolt C. W.

1914

(T_m)

Bull. BS 10, 295-313; also,
J. Wash. Acad. Sci, 3, 315-318.
(corrected 2614°C) (1913);

[37]

$T_m = 2572^\circ\text{C}$ also, Z. Anorg.

Chem., 85, 1-19
(1914)

(on air. map., under H_2)

CoD

Bsp - 3660-VI 1914

Kernst W., Schwerst F

(Gp)

Sitz. Königl preuss
Akad. Wiss.

1914, 355-70

~~222~~

IX 2390

9^u *Chen* 1917

CaO; (Δ Hm)

C; (cr, Δ Hcomb)

Washburn

4. Trans. Am. Ceram. Soc., 1917,
19, 195

~~222~~ Be

F

Circ. 500

6 ●

Е С Т Ъ Ф. Н.

IX-3110

1919

CaO; MgO (H_T-H₀)

Wartenberg H., Witzel G.,

Z. Elektrochem., 1919, 25, 209.

Einige molekulargewichte bei sehr hohen
Temperaturen.



5 ~~⊗~~

Kennu №584

CaO

Ruff O., Schmidt P.,

Z. anorg. Ch., 1921, 117, 172

Работа в области высших температур,
Деление нитратов окислов кремния,
~~алюминия, кальция и др.~~

Наблюдения величин позволили
Р, а оценить Т. кип. CaO в индифферентной
атмосфере при 2850°C .

Опыты затруднены взаимодействием SiO_2 с углеродом с образованием силикарбидного расплава при $1900 - 2100^\circ\text{C}$. Не помогло покрытие графита магнезью из карбида V вольфрама. Поэтому опыты при высоких давл. (50 - 760 мм) не дали определенных результатов

$P_{\text{мм}}$	$t^\circ\text{C}$	Ватмосфере азота
12	2480	данные предварительные, предполагается работу продолжить в сосудах из вольфрама
20	2570	
25	2470	
40	2640	

CaO

Biltz

Hohorst

1922

Z. anorg. Chem., 1922, 121, 1

AlR

1925

CaO

Bäckstrom

YACS, 1925, 47, 2432

SHf

Packboxen

CaO 8

4ce. 55H₂O

SH₂O = -46, 17

CaO

Рассе S, Kelley K. R. / 1926
J. Phys. Chem., 1926, 30, 47.
Теплоемкость некоторых
окислов металлов

Ср 298

Камбачумовский CaO;
анализ дал 98,8% CaO,
0,4% H₂O и от содержания SiO₂

тотр. 20, стр. 6

T ^{OK}	Cp.
87,2	3,00.
87,7	3,00.
91,1	3,24.
92,2	3,32.
150,3	6,50.
194,0	8,12.
197,1	8,26.

T ^{OK}	Cp.
2454	9,88.
247,8	9,94.
282,1	10,06.
292,7	10,14.

CaO

Schumacher & Co.

1926

(T_m)

J. Am. Chem. Soc., 48, 396 -
405

[43]

$$T_m = 2576^\circ\text{C}$$

(corr. mp., atm. H_2 0,2 atm)

1928

CuO (141) Roth Chell
 $\text{Cu(OH)}_2 \text{ (142)}$ Z. Elektrochem., 1928, 34, 185

Temperatures CuO

γ -ray P.U.C. 27,5410

$\Delta H_{293} = -46,15$

Cu(OH)_2

$\Delta H_{293} = -30,71$

7032

VI 3670

1929

SiO_2 ; Fe; Fe_2O_3 ; Fe_3O_4 ; Al_2O_3 ;

CaO; CaSiO_3 ; Na_3AlF_6 ; NaCl ; PbI_2 ;

W. F., (Cp, Tn, Hn, Hf)

Roth ^V and Bertram W.,

1. Z. Elektrochem., 1929, 35, 297 - 308

Be

Electrochem.

BP-X-3400

1929

CaO

Thorwaldsen

Brown

Pearce

CaO & HCl

JACS, 1929, 51, 2673

BM f

BP-X-2324

Temple Hill.

CaO & HCl 2004.0

BM 293: -46, 46

IX - 3089

1930

CaO ($H_7 - H_0$)

Kolossowsky N. A., Skoulski J.,

Bull. soc. chim (France), 1930, ser 4, 47, 136.

Sur les écarts de la loi de Neumann, Foule, et
et sur la chaleur moléculaire apparente de
l'eau dans les combinaisons solides.



Б. (CP)

Кенли № 584

IX 2325

1930

CaO (3 Mag)

Thorwaldson T., Brown W. G.,

Peaker C. R.,

J. Amer. Chem. Soc., 1930, 52,

B10-5

B

C.A., 1930, 2369


IX 2441.

1930

CaS , CaO , CaSO_4 (ΔH)

Zawadzki J., Syrezyński Z.,

Rocz. Chem., 1930, 10, 715-27



C. A., 1931, 1174.

IX 2119

1931

CaO, CaCN_2 , MgO , MgCN_2 (кр)

Франк Н.Н., Кейтманн Н.,

Z. angew. Chem., 1931, 44, 372-8

alt, 85

C.A., 1931, 3924

ВФ-1966-18

1933

CaO

SrO

BeO

Claassen A., Veenema C.F.,

Z. Physik, 1933, 80, 342

Определение радиуса изотопов BaO,
CaO, SrO и их смеси по спектру
поверхности BeO

P, as



Измеряет спектр поверхности BeO
микрофотографией на ф. поверхности

используя оптический микроскоп. Поверхность не подвергается
химической обработке. Вывод: поверхность BeO
поверхности BeO

Применение



Температура поверхности BeO
(100-200 мм). Измеряет "спектр"

СССР

B91-7030-IV B9-VI-3903 1933

CaO, Fe_3O_4 , Cu, Pt, Al_2O_3 , SiO_2
(Cp)

Esser H., Averdieck R., Grass. W.

Arch. Eisenhüttenw.

1933, 6, 289-292

5

лето п. к.

1933

Gronow H.E., Schwiete H.E.,

Z. anorg. Chem., 1933, 216, 185-196

(CaO)
Al₂O₃

B9-V-3679

CaO
 $t^{\circ}\text{C}$

$\overline{C_p}$ kcal/2

$t^{\circ}\text{C}$

$\overline{C_p}$

0-100

0,1865

20-100

0,1880

300

- 1996

0,2010

500

0,2047

0,2057

700

0,2095

0,2109

900

0,2121

0,2129

1100

0,2146

0,2153

1300

0,2164

0,2170

1500

0,2180

0,2185

Geo


Schwiete

Pranschne

1935

Zement , 1935, 24, 593

DHL



VON GRONOW H.E., schwierte H.E.

Zement, 1935, 24; 271-2

C. J., 1937, 5258

M.

$\text{CeO}(\text{H}_2\text{O})$

$\Delta H^\circ = -151,7$
 CaCeH_2O

$\text{CaO} + \text{H}_2\text{O}$

Bichowsky F.R., Rossini F.D. 1936
Бих. Росс., (Справочник)

Данин Р.И. исследование
катион в растворе HCl измерен
Биксфорд¹ в HCl(55): $\Delta H_{298} = -46,17$,
Бергман²² в HCl(330) $\Delta H_{298} = -46,1$
Джонсон⁴ в HCl(110) $\Delta H = -47,0$

Торбергенсон, Браун и Пикер³ в HCl(9.0) -
 $\Delta H_{298} = -46,46$

Ковен и Гиббс¹ в HCl(25) $\Delta H = -46,1$

Таллер¹⁵ в HCl(200) $\Delta H = -46,03$

[и Ротт  Зейл¹ в HCl(27,5) $\Delta H_{223} = -46,15$]

По данным Гюте' для восстановл. водорода
и H_2 с Ni , измеренных при 1000, 1200 и
2000°C в Ni (110) имел. следующие
 $\Delta H = -46,54; -46,47; -46,40$ и $-46,57$

[Теплота ΔH для H_2 и H_2O и H_2O и H_2
температура $\Delta H_{238} = -46,79 \pm 0,06$ и в Ni (200)
 $\Delta H_{239} = -46,29 \pm 0,07$]

IX 1702

1937

CaO; $\text{SiO}_2 \cdot 2\text{CaO}$; $\text{SiO}_2 \cdot 3\text{CaO}$ (4 F)

Shauldick H. A.,

J. Phys Chem., 1937, 41, 625-8



C.A., 1937, 60968

VII 1208

1942

MgO, CaO, $MgCl_2$, $LaCl_3$ (ΔH)
 Cr_2C , $CrCl_2$, $CrCl_3$, $CrCl_4$ (T_m , ΔH_m , T_s , ΔH_s)

Maier C.G.

Bull. Bur. Mines (U.S.) 436,

1942, 109 pp

5

chem. p.k.

CaO

Young F.E.

1944

DACS, 1944, 66, 773

Tenure of preparation $Al_2(VO)_2$, $Al_2(VO)_2 \cdot 6H_2O$, $Ca(VO)_2$, $Ca(VO)_2 \cdot 4H_2O$, $Ba(VO)_2$
Lysopferer Al y. c. c. p. e 1 M. H. C.

Al₂VO₄

Al₂O₃


$Al_2 + 2H^+ \rightarrow Al^{3+} + H_2$ -111,322 $\pm$ 0,041 -200

from Schwanitz, Hoffmann, 1940

$Ca + 1/2 O_2 \rightarrow CaO$ -151,800 $\pm$ 0,200


(Lysopferer u.  Rich. Ross, preparation u 288, 11)

Pyrolysis of pyrolyzed nickel. CaO



Onuma - yfereine eompafone onume
 yfereine (Pettine, Deming, Y. Wash. Acad. Sci, 1938, 28, 416)

$$1\text{N HCl} \equiv 1\text{ gr. meq/mole} = 1\text{ meq/55.5 mmole H}_2\text{O}$$



MgO, BaO, CaO

IX 1383.

1946

(P) (~~CaO~~) CaO

Lustman B.,

Steel Processing, 1946, 32, 669,
676

"Dissociation pressures of metal
oxides formed on various solid
metals"

C.A., 1947, 332h



HK

emm
gpc

1947

CaO

Latimer W.M.

T.B.

U.S. Atomic Energy Comm., Rep. MMDC-

T.O.

I462

2000-5000°K

Tables of free energy functions for
elements and compounds in the tem-
perature range 2000-5000°K.

C.O.

Torgeson

Shomate

1947

2ACS, 1947, 69, 2103

AMR

Ольшанский З. И.

1948

ДМ, 1948, 59, 1105

Новый метод экскеримен-
тальной работы при
высоких т-рах

[т. пл. $\text{BeO} = 2550^\circ\text{C}$]

BeO

CaO Mo

Т° пла

	CaO	BeO	Mo
T_{m} (3Kcm)	2620	2570	2450

$T_{\text{m}}(\text{mm})$	2585	2570	2420
---------------------------	------	------	------

Δ	35°	0	30°
----------	-----	---	-----

└──────────┘

A. Ruff, Z. anorg. Chem.,
1933, 46, 1

K 1193

1949

CaO (ΔH_m, p)

Inoue Y.,

J. Chem. Soc. Japan, Ind. Chem. Sect.,

1949, 52, 135-4

5

C.A., 1951, 18506

V 65 B1

Osborn Al, Si, Ba, Ca, C, Co, Cu, H₂, Pb, Mg,
Ni, Ag, Na, 'Sn, 'Zn (Δ H_f)

Osborn C. J.,

Tids. Kjemi, Bergvæsen Met., 1949, 9,
79-83.

A review of the thermodynamic
properties of metallurgically impor-
tant oxides

met & ore

C.A. 1961 429c

IX 1697

1949

$\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$, CaO , $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ (o H)

Segawa K.,

J. Japan. Ceram. Assoc., 1949, 57,
87-99

M

C.A., 1951, 7419e

1950
 $\text{Cd}(\text{OH})_2$ (cr, ΔH_f)

CaO (b H₂O)

Kobayashi K.

Science Repts. Tohoku Univ, 1950

First ser, 34, 153-9

all, 5

C. A., 1952, 46, no 2, 332c

1950

CaO

Kobayashi K.,

Science Repts. Tohoku Univ., First Ser.
1950, 34, 153 ; Ch. J. J. 1952, 46, 332

OHR

Зачислено

в 9 часов 15 мин

1950.05.06

1950.05.06

CaO

(X)

Barrow, Drummond

1951

Drummond G., Barrow R.,

Trans. Farad. Soc.,
1951, 47, 1275

D.

B99-2038-IX

D. = 118,6 $\mu\text{m}^2/\text{mole}$

Penelope Reilly

Ландер

ВФ-1347-IX

1951

CaO и др.

Lander J. J.

JACS, 73, 5794-7 (1951)

ср $> 298^{\circ}$

Теплосодержание

SrO , BaO , CaO , SrCO_3 , BaCO_3

$$C_p = 11,86 + 1,080 \cdot 10^{-3} T - 1,66 \cdot 10^{-5} T^2$$

(564 - 1176°K, 8 измереннй,

точность $\pm 2,5\%$

(Оценки Э.К. 1956г.)

IX 1621

195I

CaO, H_2S (ΔF°)

Rosenquist T.,

J. Metals, 195I, 3, Trans. 535-40.

A thermodynamic study of the reaction
 $CaS + H_2O \rightleftharpoons CaO + H_2S$ and the desulfurization
of liquid metals with lime.

Ch. A., 195I, 6910e

u, B

IX 2364

1951

CaO, Ca S., (K)

Uno T.,

Tetsu-to-Hagane, 1951, 37,
N1, 14-17

M

C.A., 1952, 2382a

IX 2365

1951

CaS, CaO (K)

Muo T.,

Tetuto-Magane, 1951, 37, 78-80

M

C.A., 1954, 3219 f.

X 1886

1952

CaO, $\text{Ca}_4\text{P}_2\text{O}_9$ (v.c.)

Brookey J.B., Richardson F.D.

Welch A.Y.E.,

J. Iron. Steel Inst. (London)

1952, 171, 404-12

© 1952, 1980

E.C.L. M.R.

Этот документ, хранимый и
(ΔGf). *аналитический журнал* и
термодинамический журнал) Mg, Ca, Sr, Ba, Be

A-906

1952

Emley E.F.

Chem. Eng. Sci., 1952, 1, 131-44.

The free energies of the fluorides, chlorides, and oxides of the alkali, alkaline earth, and rare earth metals, and the occurrence in fused salt mixtures of double-decomposition reactions involving these substances.

M,

CA, 1953, 1481b.

VI 3925

1952

CaO, $MgO \cdot H_2O$, MgO , $MgSiO_3$, $MnSiO_3$
(ΔH_{aq})
 $Ca Mg (SiO_3)_2$ (ΔH_f)

Newonen K. J.

Bull. comm. geol. Finlande,

1952., 158, 50pp

M

leimä op. k.

Cal

Bop - 5813 - V

1952

Aenvonen K.

Δ H. f

"Bull. Comm. Geologie
de Finlande"

1952, N 153, 6-57

1857

Geo (1/2)

Geo

Geo

Brewer L.

Chem. Rev., 1853, 53, 1

Tenno isigoban, omelet 12.3.11.
Jury's date isigoban. no p...
conclusion p...
weat, isigoban wayne date copy.

Alt = -151.7 ± 0.5

Unit (one)

(no Rich. Ross)

in Kelley H.K., Anderson C.T., U.S. Rev.

Mines, Bull 331 (1835). U.S. Rev.

isigoban

Buts



Ge, Geo. Re no Rich.

isigoban conclusion

CaO

Bp - 1516 - VIII 1953.

Geach G. A.; Harper M. E.

(Tm)

Metallurgia, 1953,
47, v283, 269-71

1557

CeO₂(un)

Huber E. J.,

Am. Chem. Soc., Abs. of papers
presented at Los Angeles, Calif.
Mar 15-19, 1953

OH 299.16 =

= -150.65 ±
0.4 mm

Bp-VII 852

1953

CaO, MgO, BaO, TiO₂

(Ff, Hf, S)


Kubaschewski O., Dench W.A.

J. Inst. Metals, 1953, 82, Part, 2, 87-91.

The free-energy diagram of the
system titanium-oxygen.

RX., 1954, N9, 25992

M



CaO

For.

1954

Bäck J.

Acta chem. scand., 1954, 25,
N^o 9, 884-888.

Cuermura CaO - CaF₂.

x-56 - 22 - 44135.

CaO

De-Bruin, Pou, Odoorn. 1954
De Vries R.E., Osborn E.J., Roy R.
J. Phys. Chem, 1954, 58, N: 12,
1069-1073.

Газовые равновесия в
системе CaO-TiO₂.

+1

x-36-22-74136.

Cal

De Keyser W.L.

Bull. Soc. chim. Belges,
1954, 63, 11-2, 40-58T₂

1854

CaO

SiO

BaO

P, as

Pelchowitch J.

Philops Res. Rep., 1354, 3, 42-79

Углеродный углеродный
окисел углерод-углеродный металлОкисел углеродный в углеродной
металлической форме, углеродная
форма: углеродная масса-углеродная.

Окисел углеродный углеродный в T

Ca на Pt
Углеродная

Термическая реакция

с окислом с виде Ca

Углеродный домен углеродный,
не в виде BaO и др.

с Ca, с Ca углеродный BaO

schreiben. 6. Uebung. 1, 5. 10⁻²
 Temperatur von 1550 K bis 1800 K

$\log \eta = -\frac{A}{T} + C$ ~~abhängig von der Temperatur~~ ~~abhängig von der Temperatur~~

~~1550 - 1800 K $A = 28,5 \cdot 10^3$ $\log \eta = 130,41$~~
~~1800 - 1750 K $A = 91,5 \cdot 10^3$ $\log \eta = 58,39$~~

für Cu (1550 - 1800 K) $A = 34 \cdot 10^3$

für CuO (1625 - 1800 K) $A = 32 \cdot 10^3$

für Cu⁺ (1650 - 1800 K) $A = 47 \cdot 10^3$

CaO₂
CaO

Самнерсон, Снейм.

1954

Satterfield C.N., Stein F.W.

Industr. and Engng Chem., 1954,
46, N° 8, 1734-1736.

Самнерсон перенос катализаторов
катализатор-кислород.

Х-56-13-38949.

Бере, Норвегия.

1955

CaO

Birss F.W., Thorvaldson J.

механизм
модификации

Canad. J. Chem., 1955, 33, № 5,
881-886.

Механизм модификации
оксида кальция.

Х-56-20 - 64694.

Тимозун Д.М., Баранова Р.И. / 1955

Ca - соедин. Мр. Всес. ин-та содовой
CaO, пром-сти, 1955, 8, 103-108.

CaCO₃

К термодинамической
характеристике кар-
бонатов и окисей калие-
вый и лантанд.

к-84-3-44/1/1.

CaO

1856
Brunauer S., Kantro D. L., Weise C. H.,
Y. Russ. Chem., 1856, 60, 771

Тепло при растворении трикальций-
силиката в β-трикальций силикат
и окиси кальция

Тепло
растворения

CaO
Температура
охлаждения

BP. TX 2282 1956
Huber E. J., Colley Ch. E.,
J. Phys. Chem., 1956, 60, 488 - 499

Температура сгорания метана

Ca сгорает при 250 °C и выше.
давление. $P_{O_2} = 502 \text{ атм.}$, давление сго-
рает 15806 ^{атм.} гм/гм. Эн. сгорания
сгорает $\Delta H_f^{\circ} \text{ CaO} = 635,08 \pm 0,85$

CaO

атм. килограмм/моль. ккал
 $= -151,73 \pm 0,21 \text{ ккал/моль.}$

(B NPS -151,9).

X-57-2-3695 амальгама - температура
охлаждения

IX 1321

1956

$\text{Na}_2\text{CO}_3; \text{CaO}, \text{Na}_2\text{O} \cdot 28\text{SiO}_2, \text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{CaO}.$


$3\text{SiO}_2, 2\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{CaO} \cdot 3\text{SiO}_2;$

$\text{Na}_2\text{O} \cdot 3\text{CaO} \cdot 6\text{SiO}_2$ (alk. natr.)

Kröger C., Kreiflow G.,

Glasterh. Ber., 1956, 29, 110,

393-400



B, 11

P.X. 1957, 45014

see doc

^{VI 6372}
CaO, CaSO_4 , FeO, MgO, MnO, S (Kp) 1956

Richardson F.D., Fincham C.J.B.,

Rev. métallurgie, 1956, 53, 113, 215-232
(France)

Le soufre dans les laitiers de
silicate et d'aluminate.

M.B. нем. с 8-го номера №

P.H. Rev. 1957 18508

1956

мгд, вао, сво, вао ^{IX 2522} (2)

Вейс И. В., Цурбур А. В.,

Оптика и спектроскопия, 1956.

1/1, 22-33

ГО

ЕСТЬ Ф. К.

РХ 1956 74123

IX 1945

1957

CaO, Al_2O_3 , $12CaO \cdot 7Al_2O_3$;

$3CaO \cdot Al_2O_3$; $CaO \cdot Al_2O_3$; $CaSiO_3$;

Ca_2SiO_4 (ΔG)


Carter P.T., Macfarlane T.G.,

J. Iron. and Steel Inst, 1957,

185, IV, 54-66



P.X., 1957. 68344



Bqp - 4171-IV, 1957

Dutt Nihar Kumar
Sur B.

(Ke) "Z. Anorg. Allg. Chem."
1957, 293, 195-203.

1957

VI-1160

FeO, MnO, CaO, MgO, SiO₂

(Hmix)

Концевов В.А.

В сб. "Физ-хим. основы прокатки стали"
М., АН СССР 1957, 413-422, Дуксис.
'505-12.'

Est/F.

M, W.

139-IX-2671 1957
Марон Р.С.

Ca-соедин. Ж. прикл. химии, 1957, 30,
№ 6, 851-862.

Пальмеву, перлюминасильный
(правот) анализ смесей Ca-C-O.
(CaO, CaC₂)

X- 58-6-16995

CaO, CaCl₂ (ΔZ , ΔH_{mix} , ΔS_{mix}) № 2782 1957
ВФ

Смирнов М.В., Пальгуев С.Р., Ляпина Л.А.,
Краснов Ю.Н.,

М. крик. химии, 1957, 30, №11, 1687-1689

Термодинамика взаимодействия 3
расплавленного CaCl₂ с расплавами
хлоридов щелочных металлов

Ртсб, 1958, 14215

М

CaO

ВФ-А-1534

1957

Муровский В.В.

ΔH, ΔF, ΔS

Мр. Св.-Кавказск. горно-
металлург. эк-та, 1957,
№15, 210-31

CaO
(T_m)

Ol'shanskii Ya. I. 1958
Альманский Я. И., ДАН СССР,
Reports Acad. Sci. USSR,
59, 1105-1107.

[46] $T_m = 2620^\circ\text{C}$

(outgr, тугоплав, среда - N_2)

IX 2676

1958

CaO, CaO. Al_2O_3 ; 3CaO. Al_2O_3 ;
12CaO. Fe_2O_3 (A Z, Kp)

Матвеев И. И.

Тр. ин-та химии. Уралск.

физ. СССР, 1958, вып 2, 37-109

см

Р.Х., 1959, 45037

IX 1466

1958

Ba_2O , CaO , Si , M , $\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$

(K₂, L)

Morris W., Ridgdon L.M.
Canad. J. Chem., 1958, N 6, 36.
910-914

The vapor pressure of ...

M

EX-111

IK 2528

1958

Mg, Ca, Fe, Ba, MgH, CaH, SrH, BaH, MgO,
CaO, SrO, BaO ($\frac{E_0}{T}$, S, H₂-H₂)

Всех и.в., Турбин и.в., Пиннеба Н.П.

Ис. физ. химии, 1958, 32, 111, 2532-42

М, Б


11 2626

1959

CaO (ΔH_f°); Al_2O_3 (ΔH_f°),
Ca Al_2 (ΔH_f°); $CaAl_4$ (ΔH_f°)

Кочеров П.В., Тертман Ю.М.,
Гельс П.В.,

Ж. неорг. химии, 1959, 4, №5,



1106-1112

11

Р.Х., 1959, 81293

Z, Tm, p (CaO, Ac_2O_3 ,
 Th_2O , Ce_2O_3 , BeO , HfO_2 , ZrO_2 , TiO_2)

VII 984 1959

Livey D.T.

J. Less-Common Metals, 1959, 1, N2, 145-51.

The high temperature stability of oxides
and sulphides.

RX., 1960, 37893

Be, M

ЕСТЬ Ф. Н.

1960

A-478

CaO, SrO, BaO, ZnO, CdO, HgO, Al_2O_3 ,
 SeO_3 , Y_2O_3 , La_2O_3 , Ga_2O_3 , In_2O_3 , Tl_2O_3 , Mn_2O_7 ,
 FeO_4 , InO_4 , PtO_4 , RaO. (Δ Hf)

Ключников Н.Г.

Уч. Зап. Моск. гос. пед. ин-та им. В.И. Ленина, 1960,
№146, 228-33.

Определ. термодинам. констант веществ на
основании порядкового номера элемента в периодической
системе Д.И. Менделеева. Сообщ. I. Теплос
образования окислов.

RX., 1961, 176311

М

Есть ф. к.

IX - 1025

1960

Окислы щелочно-земельных металлов
(Ср)

Weistum E.F.

U.S. At. Energy Comm. TJD-11300,
1960, 24 pp.

CA, 1964, 60, #9, 9980g

Б

Кем в 5-ке

VI 3695

1968

5683
Нмix (Fe_2O_3 , CaO , MnO , SiO_2)

Кожеуров В.А.

В сб. Физ-хим. основы произ-ва стали.
М., АН СССР, 1961, 232-237

О неразличимости...

М



5
ЕСТЬ ф. к.

IX 2682

1961

BeO , MgO , CaO , SrO , BaO (p, d, Δ Hs)

Медведев В. А.

Же. физ. химии, 1961, 35, N 4, 1481-8

Б, Ю

Р. М., 1962, 10А16

есть ориг

1961

CaO

14Б348. Исследования окиси кальция методом дифференциального термического анализа. Subba Rao B. V. S., Datar D. S., Ali Abde. Differential thermal analysis studies of calcium oxide. «J. Scient. and Industr. Res.», 1961; В20, № 7, 347—348 (англ.). — Методом дифференциального термич. анализа изучен переход $\alpha \rightarrow \beta$ в CaO. Переход обратим, точка перехода соответствует $442,5^\circ$. Резюме авторов

полимер. превращение
 $442,5^\circ\text{C}$

x. 1962. 14.

CaO

J. H. Welch, W. Jutt
J. Chem. Soc., 1961, N10, 4442

1961

Взносная энергия
перехода кальция CaO-P₂O₅

2CaO (ΔZ , l_g , l_p)

VIII 2770 1961

ThO_2 (ΔZ , l_g , l_p)

Зарембо Ю.И.,

Атомн. Энергия, 1961, ^{№2,} II, 185-186

Термодинамика восстановления двуокиси
тория кальцием

есть ори

РЖХим. 1962. I35347

М

1962

IX 1813

CaO (P, Δ C°)

Baker E.H. ,

J. Chem. Soc, 1962, Febr, 464-470

Б.М.

P.X. 1963 1 Б 472

Б.М. Ф.К.

Вар-1803-IX

1962

CaO

6 Д101. Масс-спектрометрическое определение теплоты испарения CaO. Babeliowsky T. P. J. H., Boerboom A. J. H., Kistemaker J. Mass spectrometric determination of the heat of vaporization of CaO. «Physica», 1962, 28, № 11, 1155—1159 (англ.)

На масс-спектрометре исследована зависимость равновесного давления газообразного CaO над твердым CaO. Испарение CaO производилась в ячейке Кнудсена, расположенной в ионном источнике масс-спектрометра. Ячейка была изготовлена из ZrO_2 ; измерения производились в диапазоне t -р 2165—2259° К. Регистрация зависимости тока ионов CaO^+ от t -ры позволила вычислить стандартную теплоту испарения CaO. Эта величина оказалась равной $\Delta H^{\circ}_{2210}(\text{исп.}) = 139 \pm 15 \text{ ккал/моль}$. Пересчет к 298° К приводит к величине $\Delta H^{\circ}_{298}(\text{исп.}) = 147 \pm 15 \text{ ккал/моль}$.
Е. Франкевич

Вар-1802-IX

№. 1963. 689

CaO

B97-1803-IX

1963

Mass spectrometric determination of the heat of vaporization of CaO. T. P. J. H. Babeliowsky, A. J. H. Boerboom, and J. Kistemaker (Lab. Massascheiding, Amsterdam). *Physica* 28, 1155-9(1962). Mass-spectrometric detns. were made of the rate of vaporization of CaO as a function of the temp. of a Knudsen cell inside the ion source. $\log[IT]$, where I is measured ion intensity in arbitrary units and T is abs. temp., as a function of $1/T$ gives directly the heat of vaporization at 2210°K. (139 ± 15 kcal./mole), which leads to a value of 147 ± 15 kcal./mole at 298°K. in good agreement with Drummond and Barrow's calens. (CA 46, 6478h). CA

B97-1803-IX

C.A. 1963. 58.5

3963c-3964a

1392-1803-IX

1962

✓ CaO

24 Б473. Масс-спектрометрическое определение теплоты испарения CaO. Babeliowsky T. P. J. H., Boerboom A. J. H., Kistemaker J. Mass spectrometric determination of the heat of vaporization of CaO. «Physica», 1962, 28, № 11, 1155—1159 (англ.)

При 2165—2259° К по наклону кривой $\lg[IT]-1/T$ рассчитана теплота испарения ΔH° CaO, равная $139 \pm \pm 15$ ккал/моль. Стандартная теплота испарения $\Delta H^\circ_{293} = 147 \pm 15$ ккал/моль сравнивается с литературными данными. М. Тихонов

ΔH°

1392-1803-IX

X.1963.24

CaO

39-1802
18-1802

6 Д103. Исследование химического равновесия с помощью масс-спектрометра и влияние остаточных газов. V. a b e l i o w s k y. T. P. J. H. Measurement of chemical equilibrium with the mass spectrometer and the influence of residual gases. «Physica», 1962, 28, № 11, 1150—1154 (англ.)

Теоретически рассмотрено влияние остаточного газа в ионном источнике масс-спектрометра на точность определения равновесного давления газа, выходящего из ячейки Кнудсена. Показано, что молекулы остаточного газа, проникая в ячейку Кнудсена, проводят там значительное время, и продукты их диссоциации могут исказить давление газа исследуемого соединения. Рассмотрено испарение твердого CaO при 2200°K, который находится в равновесии с $\text{Ca} + \text{O}_2$. Остаточный газ CH_4 дает в ячейке CO и H_2O ; эти продукты при давл. $> 10^{-8}$ мм рт. ст. могут заметно исказить результаты исследования равновесия системы $\text{CaO} \rightleftharpoons \text{Ca} + \text{O}_2$.

Е. Франкевич

ф. 1963. 68

CaO Doman R.C. et al. 1962
(T_m) Barr, Mc Nally, Taper
Bull. Am. Ceram. Soc. 41,

584

[50] $T_m = 2630^\circ\text{C}$?
(подобно селитре)

CaO

SrO

BaO

16 B38. Исследование формирования эмиссионного слоя катода, покрытого окислами щелочноземельных металлов. Déjardin Georges, Mesnard Guy, Uzan Robert, Cabaud Bernard. Contribution à l'étude de l'évolution des matériaux émissifs des cathodes à oxydes alcalino-terreux. «C. r. Acad. sci.», 1962, 255, № 15, 1712—1714 (франц.)

Исследованы продукты, выделяющиеся при прогреве карбонатов Ba, Sr и Ca в ионном источнике масс-спектрометра при 1100—1800° К. Карбонаты, нанесенные тонким слоем на поверхность платинового или графитового тигля, превращались в соответствующие окислы. Нейтр. продукты, выделяющиеся при нагреве, ионизировались электронным ударом и анализировались. Исследование зависимости ионных токов от энергии электронов позволило установить происхождение различных ионов. Показано, что при прогреве BaO в газовой фазе имеются BaO и Ba, причем Ba образуется при восстановлении BaO на графитовой поверхности. При прогреве SrO обнаружены только ионы Sr^+ и Sr^{2+} , возникающие при ионизации Sr. Последний образуется при термич. разложении SrO. При прогреве CaO обнаружены ионы Ca^+ и CaO^+ ; ионы Ca^+ обусловлены ионизацией Ca, образующегося при термич. разложении CaO. Е. Франкевич

X. 1963.16

1962

1962

Са О

Гурвич Л.В. и др.

крист. и
жидк.

Москва, 1962

т.ф.

Термодинамические св-ва индиви-
дуальных веществ.

ΔG (CaO)

IX 1596

1962

Honner Th.

J. Phys. and Chem. Solids, 1962, 23,
Nov., 1587-1596 ()

Die Leerstellenkonzentrationsreihe
und ihre Anwendung auf die Technologie
von Halbleitern

Pr., 1963, 21 6 164



БМЮ

1962

CaO
MgO

) Thermodynamics of the reduction of manganese and calcium oxides with silicon. I. V. Ryabchikov and A. S. Mikulinskii. *Zh. Prikl. Khim.* 35, 1656-61 (1962). Heating CaO with 4-30% cryst. Si at 1700-1800° gave a product contg. 60.70% Si and 35.8% Ca, i.e. CaSi_2 . Similar treatment of Ca, dolomite, and magnesite with 75% ferro-silicon yielded products contg. 23.05, 12.42, and 0.70% Ca and 55.12, 58.86, and 70.67% Si. These results confirmed the thermodynamic calcus. of 6 possible related reactions. The only neg. free energy, -44 kcal., was given by the reaction forming CaSi_2 : $3\text{CaO}(s) + 5\text{Si}(l) = 2\text{CaSi}_2(l) + \text{CaO} \cdot \text{SiO}_2(l)$; $\Delta Z^\circ = 5550 - 26.73T - 0.18 \times 10^{-3}T^2 + 0.64T \log T$. Redn. of MgO was less favorable. The most rapid increase of the free energy with the temp. was shown by the reaction $3\text{MgO}(s) + \text{Si}(l) = 2\text{Mg}(g) + \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2(l)$; $\Delta Z^\circ = 136400 - 71.43T + 0.24 \times 10^{-3}T^2 + 5.13T \log T$. CA

C.A. 1962-57-13
15892c

Ca
(p)

1962.

Smith J.F.

U.S. At. Energy Commission
Rept TID 4500 Ames Lab.
Iowa State Univ.

(as X-rayed) (checked) as is

Далее крест измерен
в интервале 874-965°K

Эр. мюгелю Полюс

$$D_{288} = 43,079,05 \text{ л/мол}$$

Измерен основ. из. отобразил
в NBS (1985)

VIII 2540

1962

UO , UO_2 , U_4O_9 , U_3O_7 , U_3O_8 , UO_3 ,
 ThO_2 , NpO_2 , PaO_2 , AmO_2 , CmO_2 , BkO_2 ,
 CfO_2 ; сульфиды, селениды и теллу-
риды урана, окислы щелочнозем.
элементов (термодин. св-ва)

Westrum E. F., Groenvold F.,
Thermodynamic Nucl. Mater.,
Proc. Symp., Vienna, 1962, 3-36 (Publ. 1963)

CA, 1965, 62, NB, 15493g

Б

1962
VI-3314
MgO, CaO, BaO, NiO, ZnO,

MnO, MgS, CaS, ZnS, CaSe, BaSe (Tm)

Задумкин С.Н., Хуламханов В.Х.

Изв. высш. учебн. заведений, Физика,
1962, №4, II2-II4.

Be

Est/orig.

CA, 1963, 58, N4, 2856b

Ta

CaO, Ga($\Delta H_{298}^{\circ}, \Delta H_v$)

Babeliowsky T., Boerboom A.J.E.

Advances Mass Spectrom.,

Oxford-London-New York-Paris,

Pergamon Press, 1963, vol. 2, 135-140

E G T L A. S.

~~БФ - 1804 - IX~~

1963

CaO

Babelian sky T.P.J.K.

Давление

J. Chem. Phys., 1963, 38, 2036 (138)

наров

Длинные агаритовые газы на
измерение кинетического равнове-
сия при высоких температурах -
раа кинетическим методом.

1
БФ - 1805 - IX

ка агаритовые кинетическим
методом газы, кинетическим
и кинетическим методом, кинетическим
равновесие пар. - давлению на

2

CaO в кинетическом состоянии при 1800 и 2200°K

1963

Heat of sublimation of CaO. T. P. J. H. Babeliowsky (Lab. Massascheiding, Amsterdam). ~~J. Chem. Phys.~~ 38, 2035-6 (1963). The heat of sublimation of CaO was detd. with a mass spectrometer by detg. the shutter effect on mass 56 (CaO^+). The standard heats of sublimation at 2210 and 298°K. were calcd. to be 139 and 147 kcal./mole, resp.

Henry Leidheiser, Jr.

CaO
 ΔH_s
 139-1804-1X

C.H. 1963.59.5

4598c

CaO

ВФ-1804-IX

1963

16 Б425. Теплота сублимации CaO. Babeliowski Т. Р. J. H. Heat of sublimation of CaO. «J. Chem. Phys.», 1963, 38, № 8, 2035—2036 (англ.)

Масс-спектрометрически определена теплота сублимации CaO при 2165—2259° К. Использовалась Мо-ячейка Кнудсена, покрытая ZrO_2 . ΔH_{2210}^0 (исп; CaO) = 139 ккал/моль для р-ции CaO (тв.) = CaO (газ). В. Ш.

ΔH_3

Ж-1965-16

1963

CaO

Babeliowsky, T. P. J. K.

J. Chem. Phys., 1963, 38, 2035 (x:8) ΔH_s

Теплота сублимации CaO.

Масс.-спектрометрическим в инерт.

при 2165 - 2259 °K измерено

 $\Delta H_{2210} = 139 \text{ ккал/моль}$, ~~при 2210~~,

представлен графиком отст. в инерт.

 $\Delta H_{298} (\text{CaO изд.}) = 147 \pm 15 \text{ ккал/моль}$.

Важные массовые изотопы изотопно-

бедны и состав  в кристаллах при сублимации

неизменен

2-й

CaO

B92-1805-K

1963

Influence of residual gases on the measurement of chemical equilibriums at high temperatures with the Knudsen method. T. P. J. H. Babeliowsky (Lab. Massscheiding, Amsterdam). *J. Chem. Phys.* 38, 2036-7 (1963); cf. CA 59, 4598c. The equil. compn. of metal oxide vapor effusing from a Knudsen cell may be affected by a reducing atm. (entering the cell through the orifice), as is likely with oil diffusion pumps. The equil. pressures were calcd. for solid CaO assuming that the reducing atm. can be expressed as an equiv. CH_4 pressure, which is independent of temp., that every CH_4 mol. that enters the cell leaves it as $\text{CO} + 2\text{H}_2\text{O}$, and that CaO vaporizes congruently. The pressure of Ca becomes significant at CH_4 pressures as low as 10^{-11} atm.
Henry Leidheiser, Jr.

C.A. 1963. 59. 6

5844e

1963

Doman R.C., Barr J.B.,
McNally R.N., Alper M.M.
J. Am. Ceram. Soc.,
1963, 46, N7, 313

CaO -
MgO


BP-18-2022

T_m

Газовое равновесие в
системе CaO - MgO

T_m(CaO) 2625° (2621 - 2631°C) ± 5°C

T_m(MgO) 2825° (J. Am. Ceram. Soc.,
1961, 44 [10], 491)



CaO

Потенциалы
появл.
ионов
из
окислов.

20 Б44. Потенциалы появления ионов, образующихся из окислов щелочноземельных металлов, измеренные с помощью масс-спектрометра. Mesnard Guy, Uzan Robert, Cabaud Bernard. Potentiels d'apparition des ions obtenus dans un spectromètre de masse à partir d'oxydes alcalino-terreux. «Cahiers phys.», 1963, 17, № 156, 333—343 (франц.) 1963

Измерены потенциалы появления ионов, образующихся при электронной бомбардировке паров, находящихся над нагретыми твердыми окислами щел.-зем. металлов. Приведены потенциалы появления (в эВ): $\text{Ca}^+ 6,1 \pm 0,2$; $\text{Ca}^{2+} 28,5 \pm 2$; $\text{Sr}^+ 5,8 \pm 0,2$; $\text{Sr}^{2+} 13,3 \pm 0,2$; $\text{Ba}^+ 5,2 \pm 0,1$, $13,2 \pm 0,2$; $\text{Ba}^{2+} 11,5 \pm 0,3$; $20,6 \pm 0,5$; $\text{Ba}^{3+} 57$; $\text{BaO}^+ 6,5 \pm 0,3$. Е. Франкевич

2.1964.20

CaO

[138-IX - 1471]

1963

Mukerji

Mem. Sci. Rev. Met. 1963,

(Tim)

60,

785-98



(all. CaF_2 , I)

1963

CaO, SrO
MgO, BaO
occupies

The conductivity of oxide cathodes. XVI. Thermodynamic consideration of matrix stability. G. H. Metson (Post Office Res. Sta., London). *Proc. Inst. Elec. Engrs.* (London) 110, 845-7(1963); cf. CA 58, 3983g. Under conditions of free evapn. *in vacuo* from a Pt substrate, the sublimate from BaO was almost wholly oxide, whereas that from SrO was a mixt. contg. a high proportion of metallic Sr. This difference in behavior was attributed to the energy difference between the heats of formation and sublimation of the two oxides. This hypothesis predicted that both CaO and MgO should behave in a manner similar to SrO, and expts. have shown that the prediction was correct. A further prediction suggested that BaO should behave like the other 3 alk. earth oxides if its evapn. was physically restricted, and this was demonstrated. The hypothesis was used to provide an explanation for the emission of excited Sr-metal vapor from a mixed-oxide matrix under heavy current loading.

James O. Wear

C.A. 1963. 59.6
5854 fg

1963

CaO

Surplice N.A., Jones R.P.

Темнопро-
водность.

Brit. J. Appl. Phys., 1963, 14, N10,
720.

Темнопроводность оксидов
переходно-земельных эле-
ментов.

(см. BaO)

Х. 1964-10

Mo, Ni, Ta, Pd, Rh, ~~Cu~~, CaO, CaO₂,
(ΔH_v)

1964
A-894

Boerboom A.J.H.,

Mass Spectrometry, NATO Advan.

Study Inst., Glasgow, 1964, 251-63.

High-temperature mass spectrometry.

M, J,

CA, ~~1966, 65, N6, 8160h~~

E

Q. H.

CaO

Baldwin T. O.

1964

Tompson C. W.

J. Chem. Phys., 41, N 5, 1420.

Характеристические температуры некоторых ионных соединений $A^{II}B^{VI}$, определенные рентгеновским методом.
(см. MgO)

B4-1951-1X

1964

CaO

Chandrasekharaiah M.S.

Q_0 , ΔH_s

J. Ph. Ch., 1964, 68, 2020.

теоретич.
расчет

Термическая диссоциация оксидов
и сульфидов тяжелых металлов

(см. 1960)

CaO

Goldfinger P.

1964

938

(AH)

Z. Chem. 1964, N3, S-150.

Massenspekt. Untersuchungen
anorganischer Systeme bei
hohen Temp.

CaO
(mc)

Drowart J.
Bateen G.
Verhaegen G.

1964

от. 77.

Вр-2037-IX

Trans. Far. Soc., 1964, 60, N 11,
1920.

Масс-спектрометрическое
определение термической дис-
социации молекул H_2O , CaO ,

SrO u Sr_2O .

(see. lgo)

MgO, MnO, Co (Stm) 2133-VI 1964

Schenck H, Froberg M. G., Werninghoff L. R.
Arch. Eisenhüttenwesen, 1954, 35, 114, 269-277 (нем.)
Das System MnO(-FeO)-MgO(-Co) und
seine Verteilungsgleichgewichte mit
flüssigem Mangan und Eisen-Mangan-Legierungen.

Platt Kohn, 1965,
25619

Есть оригинал.

+2

5



CaO, MgO (SH m) IX 27/1965

Belton G.R., Sharma R. S.,

NASA Accession No N65-

19778, Rept. No. JND&C-SR-5,

Avail CF STS, 1965, 10 pp

5

(97)

ca 1965

CaO

1968

7 М62. Спекание окиси кальция и окиси кальция, содержащей окись стронция. Brown R. A. Sintering in calcium oxide and calcium oxide containing strontium. «Amer. Ceram. Soc. Bull.», 1965, 44, № 9, 693—695 (англ.)

Исследовали влияние т-ры предварительного и окончательного обжига на об. плотность CaO и CaO с добавками 1, 2 и 5 мол. % SrO. В кач-ве исходных в-в использовали CaC_2O_4 и SrC_2O_4 . Описывается технология их получения. 20 г CaC_2O_4 с добавками SrC_2O_4 подвергались предварительному обжигу в интервале 800—1300° с 5-часовой выдержкой. Макс. об. плотность наблюдается при 1000° не зависимо от состава шихты. Об. плотность возрастает по мере увеличения содержания SrO. Из полученных после предварительного обжига

х. 1966. 7 м.

масс формовали диски под давл. 1500 кг/см^2 , к-рые обжигали при $1350\text{—}1550^\circ$ с разной выдержкой. Об. плотность возрастает с повышением т-ры выдержки, а при данной т-ре линейно возрастает от логарифма времени выдержки. Вычисленная энергия активации процесса уплотнения для CaO оказалась равной $44 \pm 2 \text{ ккал}$, а для состава с 1% SrO $77 \pm 2 \text{ ккал}$.

Р. Брескер

CaO

1965

Турвин Л.В.,

Теоретические и экспериментальные
исследов. термодинам. свойств
индивидуальных веществ.

$\Delta_f H^\circ$, ккал

До

Доклад, обобщающий некоторые
работы, представленные
на соискание ученой
степени д-ра хим. наук.
Москва, 1965.

1965

CaO

~~zeroed out~~

MgO

Al₂O₃

+1

Phase diagrams of the systems $\text{MgF}_2\text{-MgO}$, $\text{MgF}_2\text{-CaO}$. Geoffrey R. Belton, and Ram A. Sharma (Univ. of Pennsylvania, Philadelphia). NASA Accession No. N65-19778, Rept. No. INDEC-SR-5. Avail. CFSTI \$3.00 cy, 10 pp.(1965) (Eng). The acceptably large values of the heat of fusion of CaO and MgO prompted an investigation of the phase diagrams of the binary systems $\text{MgF}_2\text{-CaO}$ and $\text{MgF}_2\text{-MgO}$ by differential thermal analysis. Eutectic compn. and temps. were detd. for the systems. Results indicate the formation of true eutectic systems. From *Sci. Tech. Aerospace Rept.* 3(9), 1585-6(1965)

TCSL

C.A. 1966. 65.5

6363 de



M 1959

1965

ΔH (CaCO_3 , CaO , CO_2)

Inghram T.R., Marier P.

Canad. J. Chem. Engng., 1965, 43, N 6, 354

Activation energy calculation from a
linearity - increasing - temperature
experiment. Part II.

PX., 1967, 126753

J

CaO

Kalff P. J., Hollander 1965

Do

Tj., Alkemade C. Th. J.

J. Chem. Phys. 43 (7), 2299-304

Flame - photometric determination of the dissociation energies of the alkaline-earth oxides. cell CaO, III

IX 2593

1965

5Fe CaO, $\text{Ca}(\text{PO}_4)_3$ (З, Δ 6/1P)

Калашников С.Б., Шварцман Л.А.,

Тр. научн. ин-та удобрений и ин-
сепр. удобрений, 1965, №208, 122-33

М Б

Сот, 1965, 63, №8, 9430

Fe

9.11

IX 2351


1965

CaO, CaSc_2O_4 (Tm)

Trzebiatowski W., Maryn R.,

Bull. Acad. Polon. Sci. Ser.

Sci. Chim., 1965, 13(5), 315-17.



Cat. 1965, 63. N 11. 141176

Ca O

Frombe F.

1965

Toex M.

изучение
кислотных
окислов

Bull. Soc. Chim. France,
1965, n 4, 1070-1080.

Использование техники
сосудного нагрева для
получения кислотных окислов.
(См. Al_2O_3) I

х. 1965.21

1965

G. Verhaegen, R. Colin,
G. Ezsteen, J. Dzwart

cao

Trans. Faraday Soc.
1965, 61, 1372-5

Om m. 1043

1965

BP VI-3936

CuO, BeO, ZnO, CoO, MgO, NiO, CdO, PbO, CaO,
S₂O, BaO (Haq)

Yokokawa T., Kleppa O.J.

Inorgan. Chem., 1965, 4, N12, 1806-808.

High-temperature calorimetry in liquid
oxide systems. II. The enthalpies of solution
of oxides of type MO in vanadium (V) oxide.

RX., 1966, 16 532

orig.

M, Be

CaO

Foex №.

A-710

1966

Протокол ВНИИ

Rev. internat. hautes
températ. et réfract.,
3, n°3, 309-328.

$T_{\text{жидк.}} =$

$= 2900^{\circ}\text{C}$

Измерение масс-пр
зависимости ширины
их осей ● пов.
(см. Al_2O_3)

V 5224

1966

Cad, ZnO₂, HfO₂, Se₂O₃, Zn₂O₃, Al₂O₃.
(Tm)

Koryu Togyo, Mugzyne Macao, Kogyo Tansu,

J. Chem. Soc Japan, Industr Sec., 1966, 69, n9,
1705-1709, A94

CaO , MgO , SrO , Y_2O_3 , Al_2O_3 , TiO_2 , 1966,
 Yb_2O_3 , Er_2O_3 , Ho_2O_3 , Dy_2O_3 ,
 Gd_2O_3 (Tm)

VII-5959

Noguchi T., Advan. High. Temp.,
Chem., 1969, 2, 235-62

h 10

ca 1970

CaO

Bsp - 93 - 17

1966

Cp

Determination of heat content and specific heat of crystalline calcium oxide between 0° and 1720° . Wilhelm Anton Fischer and Werner Ertmer (Max-Planck-Inst. Eisenforsch., Duesseeldorf, Ger.). *Arch. Eisenhuettenw.* 37(4), 275-81(1966)(Ger). The heat content of single crystals of CaO was detd. between 0° and 1720° using a small water calorimeter. The sample was enclosed in a Ni sheet to prevent hydration but was found to be an insufficient protection producing an error of $\pm 3.5\%$. Further measurements were made using a calorimeter filled with mineral oil by which the error was reduced to $\pm 0.5\%$. The mean sp. heat was calcd. for 25° from the exptl. results. True and mean sp. heat and heat contents are listed.

U. J. C. Ende

C.A. 1966. 65. 4

47358

1966

CaO

Ср,

Теплосодерж.

1 11 E430. Определение теплосодержания и теплоемкости кристаллов плавной извести в интервале температур $0 \div 1720^\circ \text{C}$. Fischer Wilhelm Anton, Ertmer Werner. Die Bestimmung des Wärmeinhalts und der spezifischen Wärme von Schmelzkalkkristallen zwischen 0 und 1720°C . «Arch. Eisenhüttenwesen», 1966, 37, № 4, 275—281 (нем.; рез. франц., англ.)

Описаны 4 калориметрич. установки для измерения теплосодержания кристаллич. CaO. Приведены результаты определения теплосодержания и теплоемкости до $t_{\text{ры}} 1700^\circ \text{C}$.

X-36-658

ар. 1966. 118

Физ. 1

530.1

Jehle H., Parke W. C.


Relationship of the Foldy—Wouthuysen transformation to Lorentz transformations.

Phys. Rev., 1965, 137, N 3B, 760—762.

Связь преобразования Фолди—Вутуйзена с преобразованием Лорентца.

12113

1966



Гребенников Р.Г., Носачева Р.А.

Докл. АН СССР, 1966, 171, 15, 1142-1144

Температура образования гермوناتов кальция.

ИЗВ., 1967, 156587

Ф

И

CaO, BeO

Cp

ВФ - 1142 - К

1966

6 Б541. Измерение теплоемкости окиси бериллия и окиси кальция при низких температурах. Gmelin Eberhard. Mesures de la chaleur spécifique de l'oxyde de beryllium et de l'oxyde de calcium à basse températures. «С. г. Acad. sci.», 1966, С262, № 20, 1452—1455 (франц.)

1.

Измерена теплоемкость (C_p) BeO и CaO в интервале т-р 1,2—70° К. Погрешность определения составляет для BeO: 10% при 2° К, 2% при 4° К и 1% выше 4° К; для CaO: 2% при 2° К и 1% выше 4° К. Результаты представлены графически и в области 0—5° К уравнениями: для BeO $C_p = (1,41 \pm 0,03) \cdot 10^{-3} \cdot T^3$ и для CaO $C_p = (17,5 \pm \pm 0,2) \cdot 10^{-3} \cdot T^3$ мдж/моль° К. Т-ры Дебая в исследованной области т-р изменяются от 1400 до 1100° К для BeO и от 605 до 545° К для CaO. Т. Ровная

+1

20. 1967. 6

14

Bp - 1142 - IX

1966

CaO
BeO
Cp

/ Specific heat measurements of beryllium oxide and calcium oxide at low temperatures. Eberhard Gmelin (Centre Rech. Tres Basses Temps., Grenoble, France). *Compt. Rend., Ser. C* 262(20), 1452-5(1966)(Fr). The sp. heats were detd. with a Nernst-type classical adiabatic calorimeter for samples of CaO (cubic, NaCl-type; 44 g.) in the form of a crucible 26 mm. in diam. and 50 mm. long and of BeO (hexagonal, compact; 102.5 g.) in the form of a cut cylinder 30 mm. in diam. and 50 mm. long. The Debye temps., at 4-80° K., varied from 1400 to 1100° for BeO and from 605 to 545° for CaO. 16 references.

GRJF

+1

+1

C.A. 1966. 65. 4

4734 f



A-1030

1966

CaO, CaCl_2 , CaSO_4 , CaSiO_3 , NaCl и др.
(Ср, ΔH , S)

Ксенченко В.И., Цаманов С.,
Заммочен, Н. А.,

Докл. АН СССР, 1966, 167, 838-840



М.Б

есть ори.

CaO

[1899]

1966

УЗ Б602. Поведение окиси кальция при высоких температурах. Măsaşovici Dan. Le comportement de l'oxyde de calcium a de hautes températures. «Rev. roumaine chim.», 1966, 11, № 2, 233—238 (франц.)

Методами высокот-рым, рентгенографическим и термич. анализа изучено поведение CaO в интервале t -р 20—1000°. При 470—90° и 700—15° отмечены 2 полиморфных превращения. В 1-м случае куб. форма переходит в тетрагональную. Во 2-м случае CaO остается тетрагональным. Оба перехода обратимы, но обратный переход при охлаждении происходит медленно (заканчивается за 24 часа). Переходы от низкот-рым к высокот-рым формам в обоих случаях эндотермичны, причем для 2-го перехода тепловой эффект ~ в 3—4 раза меньше, чем для первого.

И. Семенов

T_{tr}

[1899]
807]

X. 1967. 3

Čakajdova I, 1972, Chem. Zvesti,
26, 41

CaO

T_{tr}

1966

Behavior of calcium oxide at high temperatures. Dan Macarovici (Inst. Chem. Acad. RSR, Cluj). *Rev. Roumaine Chim.* 11(2), 233-8(1966)(Fr). An endothermal effect was observed near 500°, in the course of the differential thermal analysis of the solid state reaction between $\text{Ca}_2\text{P}_2\text{O}_7$ and CaO, and was attributed to a phase transformation of the CaO. CaO, obtained by calcination of pptd. CaCO_3 at 1200° for 2 hrs., was studied by differential thermal analysis over the range 20-1000°; x-ray diffraction spectra were also taken of specimens in a quartz capillary and exposed successively to room temp., 550°, 720°, and again room temp. Differential thermal analysis indicated 2 endothermal effects, one at 470-90°, and a 2nd one, $\sim 1/3-1/4$ as intense, at 700-15°. The 1st effect was attributed to the transition from α -CaO into β -CaO. The 2nd effect indicated a transition from β -CaO to γ -CaO. Similar examn. of the closely related $\text{Ca}(\text{OH})_2$ showed an extremely intense endothermal effect between 525 and 620° with a min. at 580°, corresponding to dehydration; a 2nd endothermal effect was observed at 780-800°. This shift of the 2nd endothermal effect towards higher temps.

C.A. 1966. 65. 1
289 fgh



was explained by the fact that the dehydration occurred at a temp. above that of the 1st endothermal effect, and occurred close to the temp. of the 2nd effect. No thermal effect was observed when the specimens were cooled and were reheated indicating apparently the absence of a reversible phenomenon. If, however, the specimen was cooled slowly in the course of 24 hrs., and was reheated, both thermal effects reappeared, indicating that the transformation phenomenon was reversible but not instantaneous. The x-ray diffraction spectra obtained at 25, 550, and 720° differed, and corresponded, resp., to α -, β -, and γ -CaO; the α -phase was demonstrated in the specimen cooled to room temp. from 720°, thus confirming the reversibility. The spectra were discussed, and it was suggested that the transformation observed was from the cubic into the tetragonal crystal system. The transformation at 720° did not change the elementary lattice and the cryst. system existing, but apparently formed a superstructure, which is not yet definable. The high reactivity of CaO (in the presence of various salts) at 500-10°, was attributed to the reactivity of the β -CaO. Modifications of the elec. cond. observed by some author (Mee, CA 57, 5408g), was attributed in part to the modifications in the crystal structure of the CaO.

M. Ben Elieser

V 5224

1966

CaO, Sc_2O_3 , Lu_2O_3 , ZrO_2 , HfO_2 , Al_2O_3

(Ti)

Noguchi T., Mizuno M., Kozuka T.,

J. Chem. Soc. Japan. Industr. Sec.
1966, 69, n 9, 1705-1709,

A94

6. 1966. 9. 1705-1709.

СаО
Термодинамика
кальция

восста-
новления

1966

12 Б612. Термодинамика восстановления кальция из его окиси силикоалюминием. Жуковелкий В. В. «Изв. высш. учебн. заведений. Цветн. металлургия», 1966, № 4, 49—54

Предложен метод расчета давл. паров (P) M при восстановлении его из окиси и показана ошибочность «уоредненного» метода расчета в подобных случаях. Рассчитаны P Са при восстановлении его из окиси силикоалюминием при t -рах от 950 до 1300°. При t -рах восстановления порядка 1200—1250° р-ция протекает по ур-нию $6CaO_T + 2Al_{ж} = 3Ca_T + 3CaO \cdot Al_2O_3_T$. При остаточном давл. 0,01—0,02 мм Si при этих t -рах в восстановлении не участвует. P Са при восстановлении его силикоалюминием понижается до известного предела, а затем остается постоянным до полного исчезновения Al . Для достижения одинакового выхода Са t -ру процесса нужно поднять примерно на 50°, по сравнению с t -рой восстановления чистым Al .

Резюме автора

x. 1967. 12

CaO

Юдин Б. Ф.,

1966

Карклит А. К.

пс. прикл. химии, 39,
№ 3, 537.

Термодинамика испарения
окислительных окислов при
высоких температурах
(сис. SiO_2)

ВФ - М 1706 - IV

GeO_2 , CaO , (ΔH_2) X296 1967
 Ca_3GeO_5 , Ca_2GeO_4 , CaGeO_3 (ΔH_2 , ΔH_f)

Требеницкий Р.Г., Паченова Р.А.

Изв. Акад. наук СССР, 1967, 12, № 1131-1132

Энтальпии образования герматов в
кальцус Ca_3GeO_5 , Ca_2GeO_4 и CaGeO_3 .

Министерство науки

РИИХ СССР, 1968

65749

М, В (4)

CaO

Вар - 131 - IX

1984

6 E805. Упругие постоянные CaO в интервале температур 80—270° K. Hite H. E., Kearney R. J. Elastic constants of CaO in the temperature range 80°—270° K. «J. Appl. Phys.», 1967, 38, № 13, 5424—5425 (англ.)

Обычным ультразвуковым методом измерены скорости звука для CaO и вычислены упругие постоянные. Измерена также температурная зависимость упругих постоянных. На основе известных методов вычислены т-ра Дебая ($648 \pm 6^\circ$) при 0° K, модуль Юнга, модуль сдвига, сжимаемость и отношение Пуассона. Е. С. Алексеев

5. 1988. 62

CaO

Cp

Bp - 131 - IX

1967

72509z Elastic constants of calcium oxide at 80°-270°K. H. E. Hite and R. J. Kearney (Univ. of Idaho, Moscow). *J. Appl. Phys.* 38(13), 5424-5(1967)(Eng). The elastic consts., C_{11} , C_{12} , and C_{44} of polycryst. CaO were measured in the title temp. range. The isotropy coeff., $(C_{11}-C_{12})/2C_{44}$ varied from 0.97 to 1.06. The Debye temp. was detd. to be $648 \pm 6^\circ\text{C.}$ at 0°K. The Young's modulus, shear modulus, compressibility, and Poisson's ratio were detd. and found to be nearly independent of temp. BGJN



C.A. 1968.

68.16

CaO

1967

T/g cut-in

85567w Thermodynamics of the calcia/calcium-oxygen vapor system. F. J. Krieger (Rand Corp., Santa Monica, Calif.). U.S., Clearinghouse Fed. Sci. Tech. Inform., AD 648525. Avail. CFSTI, 36 pp.(1967)(Eng). The purpose of the study is the thermodynamic investigation of calcia, CaO, to 6000°K. and pressures up to 1000 atm. Two sets of equil. compn. equations are used—1 representing a pure gas phase, the other a heterogeneous system of gas and condensed (i.e., solid or liquid) calcia. The gas phase of the heterogeneous chem. system, like the homogeneous gas phase, comprises 9 gaseous Ca-O species. The latter is a conventional Mollier diagram in which sp. enthalpy is plotted against sp. entropy, with cross plots of temp., pressure, and mol. wt. or moles of condensed calcia. From U.S. Govt. Res. Develop. Rep. 67(9), 85(1967). TCVL

C. A. 1967. 17. 18

IX 486

1967

Окислы метал. зем. щелочных

MeO, где $Me = Be, Mg, Ca, Sr, Ba$ (OH_2, H_2SO_4)
Do

Schofield K.

Chem. Rev., 1967, 67(6), 707-715

CA, 1968, 68, 4, 16855b. U, B, H.

BPP 254-IX

1967

CaO (Δ Hf)

Sommerfeld R.A.,
J. Geol., 1967, 75 (4), 477-487

1968

V 6146

CaO, MgO, Na₂O. Fe₂O₃, Na₂SiO₂,
Al₂O₃, Al₂O₃ · 3H₂O, ZnO, CuO.
(Cp, ΔH_f).

Арцок Б.И.,

Ил. прикн. химии, 1968, 71, 783-784

М.Б

$\text{SiO}_2, \text{TiO}_2, \text{SiO}_2, \text{CO}_2, \text{ZrO}_2, \text{MgO}, \text{CaO}$ 9 5714 1968
 $\text{Al}_2\text{O}_3, \text{BeO}, \text{NbO}, \text{CO}$ ($\Delta G^\circ, V_p$) ~~1968~~
VIII 3867

Кузьмин В.Н.,

Научн. Тр. Зв. Научно-Иссл. Проект.

Ин-та Редкозем. Металлов. 1968,

20, 68-74. (МФ) 18 некоторые

Термодинамический расчет реакции окис-
ления в ин-те 300-3000°K. СД, 1969, 20, 126, 118796

CaO

ΔG

X. 1970.

14

(+1)

1968

14 B858. О превращении CaO в CaS в интервале 1400—1650°. Sander L. F., Healy G. W. On the transformation of CaO to CaS at 1400° to 1650° C. «Trans. Metallurg. Soc. AIME», 1968, 242, № 6, 1039—1042 (англ.)

Пропусканием смеси газов CO , CO_2 и SO_2 над образцами CaO исследовано равновесие р-ции $\text{CaO} + 1/2 \text{S}_2 = \text{CaS} + 1/2 \text{O}_2$ (1). Т-ра печи контролировалась Pt-PtRh -термопарой с точностью $\pm 2^\circ$; содержание серы определялось методом сжигания с чувствительностью 0,025 вес.%. Для каждой т-ры (шаг равен 50°C) определено критич. отношение $P_{\text{S}_2}/P_{\text{O}_2}$, ниже к-рого сера в образцах не обнаруживается. Результаты экспериментов показывают, что р-имость серы или CaS в CaO меньше, чем 0,025 вес.%. Для р-ции (1) получено в этом т-рном интервале $\Delta G = 19\,300 \pm 300$ кал. П. М. Чукуров

X

1968

22683b The transformation of calcium oxide to calcium sulfide at 1400 to 1650°. Sander, L. F.; Healy, G. W. (Villanova Univ., Villanova, Pa.). *Trans. Met. Soc. AIME* (Amer. Inst. Mining, Met., Petrol. Eng.) 1968, 242(6), 1039-42 (Eng). The standard free energy of the reaction: $\text{CaO} + 1/2\text{S}_2 = \text{CaS} + 1/2\text{O}_2$ was investigated by treating thin disks of CaO with gas mixts. of CO_2 , CO, and SO_2 . Its value was $19,300 \pm 300$ cal., independent of temp. at 1400-1650°. No solid soly. of S in CaO was detected within the limits of the exptl. method and it is estd. to be below 0.025 wt. %. 17 references. Nat L. Shepard

+1

C.A. 1968. 69. 6.



$\text{CaO}, \text{SiO}_2, \text{Na}_2\text{O} (\Delta Z)$ 9 10 4 1968

18382


Тишуро Т.Я.

Укр. хим. н., 1968, 34, N3, 257-262

Разовые состав двойных и тройных систем,
составленных из $\text{SiO}_2, \text{CaO}, \text{Na}_2\text{O}, \text{B}_2\text{O}_3$.

РИИ Хим., 1968

186832



5

BeO, CaO, SrO, MgO (crystal. Do
mon. nos. $\chi^1 \Sigma$). 1968

Yoshimine M., 9. 19648

J. Phys. Soc. Jap., 1968, 25(4), 1100-19.

Computed ground state properties
of BeO, MgO, CaO, and SrO in mole-
cular orbital γ -approximation.

10. 1969, 20, 14, 14596

Системы $\text{CaF}_2 - \text{H}_2\text{O}_2$; (Тм) 1969
 $\text{CaF}_2 - \text{CaO}$ 9 X 924

Евсеев П. П.; Крючкова Р. А.; Уваров
В. А.; Филиппов А. Ф.

Изв. высш. учебн. завед.; Терн. мет.
1969, 12(9), 47-9.

Система фторид кальция -
диоксид титана - оксид
кальция.

Б 7 (Ф) О СХ, 1970, 72, N 8, 36518a

MgO; CaO; SrO; BaO (Cp, S_{243,15}) 1969

Gmelin E. 9 1x 886

Z. Naturforsch. A 1969, 24 (11), 1794-800

Thermal properties of alkaline
earth oxides. I Specific heat
measurements.

6

(97)

○

4
CA, 1970, 72, N8, 36572P

CaO (approx. 6 mg) 9 1969

Henney J.W.; Jones J.W.S. IX 820

Trans. Brit. Ceram. Soc. 1969, 68(4),
201-3.

Solid solubility of calcia and
silica in magnesia and its
effect on the magnesia-calcia
-silica system at 1750°.

M (P)

5

CA, 1969, 11, N16, 7473/6

CaO

Noguchi T.

1969

T_m

Advan. High Temp.
Chem., 2, 235.

(Calc. ZrO_2) I



CaO (2)

summary 1862

1969

Leo Brewer, Gerd Rosenblatt.

"Adv. in High Temp. Chem."

1969, 2, 1-83.

"Dissociation Energies and

Free Energy Functions of

Gaseous Monoxides.

44/198

CaO(c)

1969

DeWick 1862

ΔH_f°
1298

Leo Brewer, Gerd Rosenblatt.
"Adv. in High Temp. Chem."
1969, 2, 1-83.

1969

CaO

ΔH_{aq}
MgO

b

(74731b) Solid solubility of calcia and silica in magnesia and its effect on the magnesia-calcia-silica system at 1750°. Henney, John W.; Jones, James W. S. (Mater. Develop. Div., At. Energy Res. Estab., Harwell, Engl.). *Trans. Brit. Ceram. Soc.* 1969, 68(4), 201-3 (Eng). The soly. of CaO and SiO₂ in MgO at 1750° was measured by observing the change in the MgO lattice parameter in quenched specimens by x-ray diffraction by using a powder method and counter diffractometer. The lattice parameter of pure MgO was detd. as 4.2115 ± 0.0002 Å. The soly. of SiO₂ in MgO was very low, and ~1.9 wt. % CaO dissolved in MgO. The heat of soln. of CaO was 18,000 cal./mole. The results are discussed with reference to the MgO-CaO-SiO₂ system at 1750°.

BVJN

C.A. 1969 H. 16

NiO-CaO (*Pyrobae patulorum*) 31. 1969
Smith D.E.; Tien T.Y.; Van Vlack G.H.
J. Amer. Ceram. Soc. 1969, ¹⁸⁹¹¹52(8), 459-60
Nickel oxide-calcium oxide
system.

6

5

~~Pyrobae patulorum~~

CA, 1969, 71, 120, 954731

CaO, SrO, CaZrO₃, SrZrO₃ (Tm) 1969

Fraser J.P., Fox M., 12 2940

High Temp. - High Pressures, 1969, 1, №4,
409-27 (ppamy.)

Zirconia - strontia and zirconia-
- lime systems.

59 @

CA, 1970, 73, 1124, 1240586

omm. 10506, a

IX-4625

1969

MgO , CaO , Na_2O , K_2O ; SiO_2 ; Al_2O_3 ; FeO , MnO , Cr_2O_3 , TiO_2 , ZrO_2
(copper)

Wänke H.,

Umschau, 1969, 23, 776-778

Me

ee76 Q.K.

CaO

Sp
S

[X]-
Bp-886-IX
988-dg

Gmelin 8.

1969

(Z. Naturforsch., 24a (11),
1794.

(cu. MgO) I



Cal

(DM 27913)

1970

Gmelin E.

Z. Naturforsch.

1970, 25a, n6, 884

0

● (Cm. 1120) I

IX 2990 MX_2 , где $M = Be, Mg, Ca, Sr, Ba$ / 97
 $X = F, Cl, Br, I$ ($\Delta H \neq 0$)

MY (крист.) $Y = O, S, Se, Te$ ($\Delta H \neq 0$).

M'_2Y (крист.) $M' = Na, K, Rb, Cs$ ($\Delta H \neq 0$)

Bousquet J., Diot M.,

Bull. Soc. Chim. France, 1970,

N12, 4302-04

(CP)

CC: 71

CaC_2O_4 ($\Delta H, \Delta G$) (ΔH_{aq}) 9 1970
IX 3548

$\text{CaO}, \text{C}_2\text{O}_3$ (ΔH_{aq})

Prasad K.K., Abraham K.P.

Proc. Symp. Mater. Sci. Res. Nat.

Aeronaut. Lab., Bangalore, 1970, Vol. 2, S. 1.

S. 2., 127-133 (curr.)

Thermodynamic properties of calcium chromite

P.H. Yoon, 1972

55941

10 B, M (op)

CaO

1970

Vozdvizhenskii V. M.

ΔH_f

Zh. Fiz. Khim. 1970, 44, 317-19.

(см. Cu_3Si) I

см. окислы и
сплавы
перех. металлов

SiO_2 , CaO , H_2O_3 , $\text{NiO}(\text{Kp})$

1971

Кушников И. С.,

183885

Изв. Акад. Наук СССР, Неорг. ма-
тер, 1971, 7; №, 1557-60 (русск.)

Конкурентные условия для
испарения химических сое-
динений.

М. 12

CA, 1972, 76, №, 280156

BO ; CaO ; SrO ; ZrO (paccëm m.n.) 1971

Liszt H.S., Smith W.H., 5 15 7 VII 6211

J. Quant. Spectrosc. and Radiat.
Transfer., 1971, 11, N4, 1043-1062 (am.)

RKR Franck-Condon factors for blue
and ultraviolet transitions of
some metal oxides.

Sov. Phys., 1972, 18187

10

⑦

1971


Возор

Al_2O_3 , BeO , CaO , CeO_2 , Cr_2O_3 , ZrO_2 ,
 HfO_2 , La_2O_3 , MgO , SrO , ThO_2 ,
 UO_2 , Y_2O_3 (хим. физ. св. ба)
VIII 5634

Осе С., Когдо Реаметаре,
1971, N 46, 41-46

сн опис

М.Б. Сагд



1971

фаз.
диаг

) 8454g Thermodynamic and physicochemical properties of melts in the calcium oxide-calcium fluoride and calcium meta-silicate-calcium fluoride-system. Starkova, N. K.; Starkov, L. N.; Sryvalin, I. T. (USSR). *Sb. Nauch. Tr., Perm. Politekh. Inst.* 1971, No. 93, 123-9 (Russ). From *Ref. Zh., Khim.* 1972, Abstr. No. 9B832. On the basis of heats of mixing and phase diagrams of the CaO-CaF₂ and CaSiO₃-CaF₂ systems, the activity, and excess entropies of the components were calcd. at 1775 and 1790°K. The concn. and temp. relations of elec. cond., d., molar vol. and the activation energy of elec. cond. agreed with the corresponding relations of thermodynamic values of the components. Where high CaF₂ activity is necessary, the use of the slags contg. ≤40-50 mole % CaF₂ at ≥1450-1500° is preferred.

C. A. 1973, 78, ~2.

CaO

[807]

1972

17 Б858. К проблеме образования модификаций окиси кальция. Šaňdová I. To the problem of the formation of modifications of calcium oxide. «Chem. zvesti», 1972, 26, № 1, 41—43 (англ.)

Методом рентгенофазового анализа (высокотемпературная камера, $\lambda\text{Cu-K}_{\alpha}$) показано, что CaO не претерпевает полиморфных переходов при t -рах 590 и 700°, а характеризуется только термич. расширением кубич. крист. решетки. Д. В. Дробот

172

X, 1972, 17

MgO, CaO, SrO, BaO (Cp, ^{b. ba} ferro) - 1972

Gmelin Z. Viera S., X 3958

Z. Naturforsch A 1972, 27(4), 605-12
(8ug).

Thermal properties of alkaline
earth oxides II. Analysis of
anharmonic effects.

B (C) 7

CA, 1972, 74, 39866B

Саотв. (Кр. обр.)

IX 4051

1972

Иванов Т. А., Савицкая Л. С.,
Изв. Акад. Наук СССР, Неорг.
Матер., 1972, 8, № 1319-20 ○
(русск.)

Диссоциация окиси кадмия
в процессе испарения.

М (Ф)

СН, 1972, 77, № 18, 1190114

CaO

Ivanova L. I.

1972

"Zh. Fiz khim"

$(\Phi_T^x; S_T^o)$

1972, 46, №3, 766-9.

(см. TiB_2 ; I);

CaO

1972.

„ 2 Б772. Испарение окиси кальция с никелевой под-
ложки. Князева И. М., Васильев В. П. «Ж. физ.
химии», 1972, 46, № 9, 2401—2403

испарен.

Со помощью радиоактивного Ca^{45} исследована зависи-
мость скорости испарения CaO. Получено, что в интер-
вале т-р 1280—1470° К скорость испарения CaO из си-
стемы CaO—Ni описывается ур-нием $\lg G$ (г/см²сек) =
= 7,85—25580/T. Автореферат

Х. 1973. № 2.

CaO

1973

Barin I., et al

mol I, comp. 174

Sol 298-2888

liq 2888-3500



(see AgF) I

1973

CaO

Canton Stanley

J. Chem. Phys. 1973, 59 (9)
5189-94 (8ng)

supr.

pennmu

(all D. III.)

(all MgO; I)



CaO

CaCl₂

растворяющийся

в CaCl₂

и CaCl₂+NaCl

7 B851. Некоторые термодинамические свойства расплавленных систем CaO—CaC₂—CaCl₂ и CaO—CaC₂—CaCl₂—NaCl. Первая часть. Предельная растворимость CaO и CaCl₂ в расплавленных хлоридах, в чистом CaCl₂ и в смеси CaCl₂—NaCl. Gentaz C., Bienvenu G., Boussiba A. Quelques aspects thermodynamiques des systèmes fondus CaO—CaC₂—CaCl₂ et CaO—CaC₂—CaCl₂—NaCl. Première partie. «Rev. int. hautes temp. et réfract.», 1973, 10, № 3, 161—167, III (франц.; рез. англ., нем.)

С использованием специально сконструированной печи I (приведен чертеж печи, максим. т-ра 1300°, автоматич. регулирование т-ры с точностью ±2°) изучена р-римость CaO (I) и CaC₂ (II) в расплавленном CaCl₂ (III) и в смеси расплавов III+NaCl (IV). Найдено, что р-римость I и II в расплаве III при увеличении т-ры от 842 до 1000° меняется от 13,60 до 11,58% (миним. р-римость 9,25% при 950°) и от 2,94 до 9,45% (монотонно) соотв. В смеси расплавов III+IV при уве-

и
66: 4

X. 1974 N 7

(+1) 12

1973

1835-4381
39-1X-11-16-9

личении т-ры от 800 до 1000° р-римость I и II меняется от 11,20 до 8,90% (миним. р-римость 8,17% при 950°) и от 3,73 до 7,04% (монотонно), от 6,70 до 6,85% (миним. р-римость 5,30% при 850°) и от 5,08 до 8,75% (монотонно), от 2,77 до 0,41% (монотонно) и от 5,33 до 9,75% (монотонно) при содержании IV в расплаве 7,60; 24,6 и 44,0 мол.% соотв. Энтальпия (ΔH) и энтропия (ΔS) р-рения I и II в III равна 10,130 ккал/моль и 7,00 э. ед. соотв. Значения ΔH и ΔS р-рения I и II в смеси III+IV при увеличении конц-ии IV в смеси от 7,57 до 44,0 мол.% меняется от -1,53 до -1,502 ккал/моль и от -2,78 до -2,42 э. ед. соотв. В т-рном интервале 1000—1300° коэф. активности II в расплаве III закономерно уменьшается от 4,79 до 1,49, а в расплаве III+IV — закономерно увеличивает-ся от 1,88 до 2,24, от 1,73 до 1,94 и от 1,59 до 1,89 при конц-ии IV в смеси 7,57; 24,3 и 44,0 мол.% соотв. Указано, что в изученных расплавах наиболее термодинамически выгодным является взаимодействие между ионами C_2^{2-} и Na^+ .

С. С. Плёткин

CaO, CaCl₂

1973

K guce.

20019t Thermodynamics of calcium oxide-calcium carbide-calcium chloride and calcium oxide-calcium carbide-calcium chloride-sodium chloride melts. Gentaz, C.; Bienvenu, G.; Boussiba, A. (Cent. Rech. Geneve, Battelle, Geneva, Switz.). *Rev. Int. Hautes Temp. Refract.* 1973, 10(3), 161-67 (Fr). The solubilities of CaC₂ and CaO in molten CaCl₂-0-50 mole % NaCl were detd. at 800-1000°. These results and published thermodyn. data were used to calc. the partial enthalpy and the partial excess entropy of dissolved CaC₂ and CaO for different solvent compns. The application of the regular-soln. model to the systems is discussed. In the molten CaC₂-CaO-CaCl₂-NaCl system at 800-1000° for a given NaCl concn., the sum of the solubilities [expressed in mole fractions (X)] of CaC₂ and CaO were essentially independent of temp. By increasing the temp. at const. NaCl mole fraction [$X(\text{NaCl})$], the dissocn. consts. of CaO and CaC₂ were decreased and increased, resp. The activation energies (in cal/mole) for the dissocn. of CaO and CaC₂, resp., are: -11,430, +21,000 for $X(\text{NaCl}) = 0$; -25,130, +7800 for $X(\text{NaCl}) = 0.440$. The decrease of CaO soly. with increasing NaCl concn. was caused by interactions between Na⁺ and C₂²⁻ ions.

ASCH-4321
89-17-68

C.A. 1974.80. NY

⊗ (+1)

1973
 MgO , CaO , TiO_2 , MgF_2 ,
 $FeTiO_3$, $CaTiSiO_5$, $MgAl_2O_4$,
 $ZrSiO_4$ (Тм) IX-5741

Горбунов Л.В.,
тезисы докл. - I Всесоюзн. совещан.
по физ. и техн. вые. давлению,
1973, 207 (ред. Галкин А.А., Донецк)

Термод. уравнение кривых
плавления тв-ердых веществ...

С.А. 1975. 83 и 8. 65591н. Т (Ф) 5


MoO_3 ; CaO ; TiO_2 ; MgF_2 ; 1x4475 1973
 FeTiO_3 ; CaTiSiO_5 ; MgHfO_4 ; T_m
 CaMgSiO_4 ; $\text{Ca}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7$; ZrSiO_4

Горбунов Л. В.,


БФ Восп.
Давл.

Ж. физ. хим., 1973, 47, №8, 1963-6
(русск.)

Приближенные термодина-
 мические расчёты точек плавления и твердения х веществ под
 давлением. Σ СЖ, 1973, 73, №24, 140336v



1973



Voichak, V.P.; Messerle, V.E.;
Sakipov, Z.B. (USSR).

"Problem. Teploenerg. Prikl. Teplo-
fiz." 1973, No. 9, 206-13. (Russ.)

"Thermodyn. calculation of reac-
tions for obtaining phosphorus from
phosphorus compounds.

И 7 (op)

C.A. 1974, 80, N16, 87882n

CaO
(m)

JANAF Suppl 1974

0-4500°

CaO

(K)

0 - 3500°

JANAF Suppl 1974

LiF, NaF, KF, Al_2O_3 , 1974.
CaO, SrO (Tex) 174785

Jackson J.N.S., Liebermann R.C.
J. Phys. Chem. Solids, 1974, 35(9)
1115-19.

Melting and elastic shear
instability of alkali halides.

C.A. 1974. 81 iv 20. 127906c . 10 5 (9)

CaO (крит)

(Q.D.;

Δ H atomiz;)

Thakur L. P.
J. Inorg Nucl Chem

1974, 36 (10) 2171-3 (Eng)

(all BeO, III)

1974

CaS, CaO ($K_p, \Delta G$) IX-5281 1945
($\Delta G_T^\circ, K_p$)

Filipovska N. Z., Bell H. B.,

Glas. Hem. Drus., Beograd 1945,
40(9-10), 491-8

A study of equilibrium in the reac-
tion $\text{CaS} + \text{H}_2\text{O} = \text{CaO} + \text{H}_2\text{S}$ in the temp. range
746 - 1431°C.

C.A. 1946, 85, N 10, 6626/2

M (9)

CaO

Baltier M., et al 1975

Phys. status solidi (b),
1975, 40, n1, 163-172.

Cp

X. 1976. n5

Cu MgO; I

Cal
(me)

LANA F
Suppl.

1975

0-4500°

CaO
(K)

JANAF
Suppl

1975

0-3600°

IX-5314

1975

САО (Т₂)

Стрекаловский В. Н., Розанов И. Г.,
Тр. ин-та электротехники Уралвек
научн. Центра АН СССР,
1975, № 22, 97-99

СА, 1976, 84, № 18, 128985 в Б, М

IX - 5510

1975

Управление. всем.

H_2 , H_2O , CH_4 , NH_3 и т.д.

FeO , Fe_2O_3 , Fe , Fe_2O_3

CaO , MgO (вд)

Исследователь В.И., Инженер В.П.,

Ученый В.И.

Всего: 1975, 3, 5-45

Исследования: 1975, 3, 5-45

В.И. 1975, 3, 5-45, 1975, 3, 5-45. Все. 4

IX-5321

1976

CaO, BaO, MgO, Na₂O, P₂O₅, SiO₂, Al₂O₃
(soluble in H₂SO₄, insoluble in HF)

Августиник А.И., Мironov И.И.,
Коваленко Н.В.

МР. жур. химии, 1976, 50, № 4, 1043-1044

И, В

СА, 1976, 85, № 8, 52571 и

CaO

1976

Cor y.D

CODATA Bull. 1977,

22, 6 pp. (Eng)

$\Delta H, S^\circ$

H-H

Kmolecal
be. cal mol

cell F - I

CaO

Bqp-5333-IX 1976

Farber M. et al

(ΔH_s)

High Temp. Sci., 1976
8, 73-80



(see CaO, III)

CaO, TiO, VO, Cr₂O₃, MnO, Fe₂O₃, 1976

CoO, NiO, CuO (ΔG_f) IX-5398

Торнqvеr У.Г., Лашхярyч Ф.Г.
Редколлекция "Ж. физ. химич" АН СССР. М.,
1976, 7с. ил. Рукопись деп. в ВНИИТИ 20 окт.
1976, N 3688-76 деп.) Зависимость стандартных
изобарно-изотермических потенциалов
образования оксидов первых переходного периода.

РИХ Хим., 1977

56840 деп

МФ
у кн. Г. е. и з

CaO

1976

Slobodin, B. V. et al.

ΔH

Tr. Inst. Khim., Ural. Nauchn.
Tsentr, Akad. Nauk SSSR
1976, 35, 75-87 (Russ)

av. Na₂O-I

CaO

1976

Стасеневиц Д.С. и др.

Ж. геоф. кл. 1976,

50, №12, 3109-11.

(Δ K. ...
Δ S. ...
Δ G. ...)

расчет

(see Lib M₄; I)

CaO

1976

(Tr)

184: 128985b Concerning the problem of calcium oxide polymorphism. Strekalovskii, V. N.; Rozanov, I. G. (USSR). Tr. In-ta Elektrokhimii Ural'sk. Nauch. Tsentr AN SSSR 1975, (22), 97-9 (Russ). From Ref. Zh., Khim. 1976, Abstr. No. 1B486. Title only translated.

C.A. 1976 84 N18

CaO(c)

1977

Cox J.D.

$\Delta H, 80^\circ$
 $H_{298} - H_0$

J. Chem. Thermodyn. 1977, 9(8),
705-6 (Eng.)

av. $\text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) - \text{I}$

Ca O (p-p в ZrO_2)

1977

Юсуп Жикимов

ЭДс

Δ Hf

Δ ff

Δ Sf

Термодинамические исследо-
вания некоторых термоэлектри-
ческих материалов на осно-
ве оксидов щелочноземельных
металлов.

Автореферат на соискание
ученой степени КХН.

CaO^+

1974

Rosenstock M. M. et al

J. Phys. Chem. Ref. Data,
1974, 6. suppl. v1, p 1-488

T.G.

cbba

CaO

ommuck 7262 1978

Puri U, et al.

ΔH амолуу.
сум. пост.

Indian J. Pure

Res; парам.
Трюннэз.

and Appl. Phys.
1978, 16, 692-93

CaO(κ) Commu 12737 | 1978.

Sata T., et al.

(P) Rept Res. Laboratory
of Engineering Materials,
1978, N3, 41-52.

ommuca 12739 | 1978

CaO (κ)

Sata T., et al.

(p) Proc. Intern. Sympos. of Factors
densification and sintering
of oxide and non-oxide ceramics,
1978, Japan, p. 182 - 187.

Cal

[Ummueck 15854]

noel
1978

Toshiyuki Sata, Tadashi Sa-
samoto, Kazutoshi Mat-
sumoto,

Do, SHf,
SHf

Research Laboratory of Engi-
neering Materials, Tokyo Ins-
titute of Technology, Nagatsuta,
Midori Yokohama, 227, Japan.

CaD

1979

Farber M.

Gov. Rep. Announce

(ΔHf)

Index (U.S.), 1979, 79
(24), 98.

●
(см. Вад; III)

CaO

1979

Левинский В. А. и др.

грануло-
окислов

Изв. АН СССР, геогр. ма-
териалы, 1979, 15, № 1,
138-142.



(см. BaO; I)

CaO

1979

91: ... Determination of the characteristics of the liquid-gas phase transition of some oxides by calculation of equilibrium states. Moiseev, G. K.; Vatolin, N. A. (Inst. Metall., Sverdlovsk, USSR). *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 1979, 246(3), 656-8 [Phys. Chem.] (Russ). A generalized computer program (G. B. Sinyarev, et al., 1973) was used to calc. liq.-vapor equil. parameters for CaO, Al₂O₃, SiO₂, FeO, Nb₂O₅, TiO, Ti₂O₃, VO, V₂O₄, Cr₂O₃, MgO, ThO₂, Ce₂O₃, HfO₂, ZrO₂, and Eu₂O₃ at 1 atm and 1500-5000 K at 25-50° intervals. Calcd. b. ps. and heats and entropies of vaporization are compared with exp'l. values.

$T_m, p, \Delta H_v, \Delta S_v$



(+15°)

CA 1979, 9, 1110

CaO

IX - 5726

1979

91:146135y Melting temperatures of calcium oxide and magnesium oxide. Panek, Zdenek (Inst. Inorg. Chem., Slovak Acad. Sci., 809 34 Bratislava, Czech.). *Silikaty (Prague)* 1979, 23(2), 97-102 (Eng). Melting temps. of CaO and MgO were redetd. and are 2617 ± 30 and $2823 \pm 40^\circ$, resp.

MgO

(Tm)

(+1) ☒

C.A. 1979, 91, 118

1973

CaO-MgO-
-SiO₂

ΔH°

Топор Н.Д. и др.

8 Всесоюзн. конференция
по калориметрии и хими-
ческой термодинамике.

25-27 сентября 1973г. г. Иваново

Тезисы докладов стр. 19-22.

CaO

MgO

(T_m)

IX-5726

1979

23 B848. Температуры плавления CaO и MgO. Pá-
tek Zdeněk. Melting temperatures of CaO and MgO.
«Silikáty», 1979, 23, № 2, 97—102 (англ.; рез. словац.,
рус.)

В высокочастотной печи в среде CO, N₂, CO₂ и O₂ с
помощью оптич. пирометра проведены сравнительные
измерения т. пл. монокрист. MgO (>99,3%) и керамич.
CaO (содержание MgO < 1,1%). Усредненные значения
т. пл. с учетом всех погрешностей составили $2617 \pm$
 $\pm 30^\circ$ для CaO и $2823 \pm 40^\circ$ для MgO. Резюме

$$\begin{array}{rcl} \text{MgO } 2823 \pm 40 & \text{CaO } 2617^\circ\text{C} & \\ \hline 2773 & + 273 & \\ \hline 3096 \pm 40 & 2890 \text{ K} \pm 30 & \end{array}$$

(+1) ☒

2.1874, 1623

CaO

commence 10014 1980

Alcock C.B.

(ΔGv)

Pure and Appl. Chem.
1980, 52, 1817-27.

CaO

[commun 12946] ? 1980.

Hlaváč &

(T_m) IUPAC Commission on High
~~Temperatures and Refractory~~
materials.
Melting temperatures of
refractory oxides. Part 1.

IUPAC Commission on High
temperature and Refr. materials.

1980

CaO

CaC₂(H₇-H₀)

①

☒

94: 128553r Enthalpy measurements at high temperatures. Emons, Hans Heinz; Moehlhenrich, Siegfried; Hellmold, Peter (Sek. Chem., Tech. Hochschule "Carl Schorlemmer", Leuna-Merseburg, Ger. Dem. Rep.). *Wiss. Z. Tech. Hochschule "Carl Schorlemmer" Leuna-Merseburg* 1980, 22(4), 489-99 (Ger). A slit calorimeter for high-temp. detns. of the temp. dependences of the enthalpy functions of oxides and carbides consists of an Al unit with exterior thermistors, and an exterior oven for heating the graphite crucible contg. the sample before inserting it in the Al unit. Measurements can be made up to 2300 K. Tests on CaO and CaC₂ agreed with prior detns.

C.A. 1981 24 N 16

CaO Commua 9717 | 1980

Chaisas S.V., et al.

миссия.
аккумуля,
(ΔHv)

J. Phys. Soc. Japan,
1980, 48 (5), 1795-96.

1980

CaO . Chaisas S.V., et al.,
(SHV) J. Phys. Soc. Jap., 1980,
48, N 5, 1795-1796.

(all. MgO; I)

CaO

Коммисс 9467

1980

параметры
гидровых
переходов

Василь А. А. и др.

М. Груз. химии.

1979, 54 (4), 1042-43.

Pтх

CaO

1981

Freez R.

Th; F. Mater. Sci., 1981, 16,
(11), 3225 - 3227.

(see BaO; ~~X~~) I

CaO

1981

24 Б902 Деп. Определение энергий диссоциации окисей кальция и стронция на основании спектрофотометрических измерений в пламенах. Беляев В. Н., Гурвич Л. В., Лебедева Н. Л., Краснов К. С., Иванов. хим.-технол. ин-т. Иваново, 1981. 33 с., чл., библиогр. 41 назв. (Рукопись деп. в ВИНТИ 14 июля 1981 г., № 3479—81 Деп.)

$D_0, \Delta H;$

Определены энергии диссоциации окислов кальция и стронция методом спектрофотометрии пламен $\text{CH}_4 + \text{O}_2 + \text{N}_2$. Для изучения равновесия р-ций типа $\text{M} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{MO} + \text{H}_2\text{O}$, где $\text{M} = \text{Ca}, \text{Sr}$, измерены интенсивности резонансных линий Ca (λ 4227 Å), (Sr , λ 4607 Å) и молек. полос CaO (λ 8160 Å), (SrO , 7860 Å), относящихся к электронному переходу $\text{A}^1\Sigma^+ \rightarrow \text{X}^1\Sigma^+$ и возникающих при введении в пламена аэрозоля водн. р-ра соли кальция (стронция). По 2-му закону термодина-


⊠
(+1)

so

X. 1981, 19, N24.


мики найдены тепловые эффекты соотв-щих р-ций, к-рые пересчитаны к энергиям диссоциации окислов кальция и стронция $D_0(\text{CaO}) = 378 \pm 16$ кДж/моль и $D_0(\text{SrO}) = 412 \pm 16$ кДж/моль. Полученные данные находятся в хорошем согласии с результатами масс-спектральных работ.

Автореферат



94:166859c A study of the calcium oxide-water vapor system by means of the transpiration method. Matsumoto, Kazutoshi; Sata, Toshiyuki (Res. Lab. Chem. Mater., Tokyo Inst. Technol., Yokohama, Japan 227). *Bull. Chem. Soc. Jpn.* 1981, 54(3), 674-7 (Eng). The system of CaO and water vapor was studied using the transpiration method. Under the conditions of 1678 to 2016 K and $P_{\text{H}_2\text{O}}$ values from 1.2×10^{-2} to 4.7×10^{-1} atm, the predominant reaction in this system is $\text{CaO}(s) + \text{H}_2\text{O}(g) = \text{Ca}(\text{OH})_2(s)$. The std. Gibbs free energy of the reaction is given by the equation: $\Delta G^\circ_r = (61300 \pm 820) - (12.8 \pm 0.48)T$ (cal/mol) in this temp. range. From the thermochem. cycle, the dissoen. energy, $D^\circ_0(\text{Ca}-(\text{OH})_2)$, is 206.4 kcal/mol.

$\Delta G^\circ_{\text{peak}}$



P.A. 1981/54/20

CaO

[Dmmuck 18488] 1981

Maas F.L., Robinson G.R.,
Hemingway B.S.

measurement.
op-iii

J. Phys. Chem. Ref. Data,
1981, 10, N 3, 575-669.

CaO

1981

21 Б1363. Определение коэффициента диффузии Ca^{2+} и растворимости CaO в расплавах KNO_3 — $(\text{Ca}(\text{NO}_3)_2)$ вольтамперометрическим и хронопотенциометрическими методами. Ткаленко Д. А., Чмиленко Н. А. «Электрохимия», 1981, 17, № 6, 816—820

Показано удовлетворительное совпадение результатов определения р-римости CaO вольтамперометрич. и хронопотенциометрич. методами. Вычислено произведение р-римости CaO в нитратных расплавах при t -ре 360°C . Определены коэф. диффузии ионов Ca^{2+} , NO_3^- и O^{2-} . Оценена толщина диффузионного слоя в нитратных расплавах.

Автореферат

(Пр)

Х. 21. 1981

$\text{CaO}, \text{CaF}_2, \text{H}_2\text{O}, \text{H}_2\text{F}_2, \text{Al}_2\text{O}_3, \text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F},$
 $\text{NaCa}_2\text{H}_3\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{22}\text{F}_2, \text{KAl}_3\text{AlSi}_3\text{O}_{10}\text{F}_2$ 1981
 ΔP_H

Westrich H. R., Navrotsky A.




Am. J. Science, 1981, 281, N8, 1091-1103

Some thermodynamic properties of
fluorapatite, fluorpargasite, and
fluorphlogopite


при 985 K измерены $\Delta H_{\text{мел.}}$ и $\Delta G_{\text{мел.}}$
связанные с образованием минерала

Ввн. 15, 10, 86.

DM. 24415



(magnesian Si)
(AlF₃ dilution)



fluoropargasite



CaO

Ommuck 15686

1982

Banon S., Chatillon Ch.,
et al.

High Temp. Sci., 1982,
15, N 2-3, 129-149.

исслед.
термостат.
испарен.

CaO

От. 15662

1982

8 Б855. Вычисление теплот плавления CaO и MgO.
Calculation of the heats of fusion of CaO and MgO.

Chang Do R., Howald Reed A. «High Temp. Sci.», 1982, 15, № 2—3, 209—218 (англ.)

Термодинамические св-ва системы CaO—MgO вычислены с учетом опытных лит. данных по р-римости в тв. состоянии с использованием интерполяц. ур-ния Редлиха—Кистера. Отклонения от закона Рауля оказывают большое влияние на $\Delta H_{пл.}$ компонентов. Рекомендованы т-ры $\Delta H_{пл.}$ для MgO 3105 и $57,65 \pm 8$, CaO 3173 К и $59,05 \pm 6$ кДж/моль.

Л. А. Резницкий

ΔH_m ;

(H) ~~A~~

MgO



Дубликаты

X. 1983, 19, № 8.

Вф-IX-10001

CaO

1982

Endo Shoichi, Ito Keisuke,

Разовый
переход

High-Pressure Res.
Geophys. Tokyo; Dordrecht
e.a., 1982, 3-12.

(ser. BP; I.)

CaO

Ommuck 14035
Ommuck 13510

1982

Meavac J.,

Tim;

Pure J. Appl. Chem.,

1982, 54, N3, 681-688.

CaO

1982

Ko H. C., Ahmad N.,
Chang Y. A.

Δ H soln
6 HCl

Rep. Invest. - U.S., Bur.
Mines 1982, RI 8647,



13pp.

(see CaCO_3 ; I)

$\text{CaO}(x)$

1982

Pan Kratz L. B.

Thermodynamic Properties
(298-2000) of Elements and Oxides
USA Bur. Mines Bull. 672.

• (yollegbegebo)

CaO(x,ae)

1982

Robinson G. R., et al.
U. S. Dep. Interior Geolog.
Survey, OPEN-File Report
83-79, 1982, p. 174.

200-1800K

m. sp.

Витрув у. Ч. П. Ходяковского 174

CaO

om. 16413

1982

) 14 Б884. Высокотемпературное испарение оксида кальция. High-temperature vaporization of calcium oxide. Sata Toshiyuki, Sasamoto Tadashi, Matsumoto Kazutoshi. «High Temp. — High Pressures», 1982, 14, № 4, 399—408 (англ.)

С помощью метода Лэнгмюра измерено давл. паров CaO (I) в вакууме в интервале 1500—1900°С, а также с помощью метода переноса измерено давл. I во влажной атмосфере при 1405—1743°С. Представлены описание и схемы аппаратуры. Основным газ. компонентом над I_(тв.) в вакууме является Ca_(г.). Давл. Ca_(г.) над I_(тв.) описывается ур-нием: $\lg[(P_{Ca})/\text{атм}] = (5,96 \pm \pm 0,15) - (25\,800 \pm 290) (T/K)^{-1}$ ($T = 1773 - 2173$ K). Основным газ. компонентом над I во влажной атмосфере является Ca(OH)_{2(г.)} (II). Давл. II над I_(тв.) описывается ур-нием $\lg K_p = (2,80 \pm 0,10) - (13\,400 \pm 180) (T/K)^{-1}$ ($T = 1678 - 2016$ K), где K_p взята для р-ции $I_{(тв.)} + x H_2O_{(г.)} \rightleftharpoons II_{(г.)} + 1/2 (1-x) O_{2(г.)}$. Представлены зависимости давл. паров Ca_(г.), I_(г.), CaOH_(г.) и II_(г.) для различных давл. кислорода и воды. Рассчитаны нек-рые термодинамич. характеристики ряда р-ций с участием I и II.

Л. Г. Титов

р, Кр;

(H) 

Х. 1983, 19, N14.

CaO

Sata T., Sasamoto T., et al.,¹⁹⁸²

Высоком-рное испарение оксида
кальция (399).

IUPAC Conference on the chemis-
try of materials at high tem-
perature, Marwell, 1981. "High
Temp-High pressures", 1982,
367-485.

P. A. X. 14, N 4,
1983, N 17, 17A8

CaO

1982

Singh R. K., Sanyal S. P.

Phys. status solidi,

1982, B113, N1, K23-K26.

позов.
переход.

(ср. BaO; I)

CaO

[Ommuck 15597]

1982

Sommers C., Ray D.K.,

ΔHf;

Solid State Commun;
1982, 44, N3, 339-343.

CaO (nc)

1982

Stout N.D., Piwin-
ski A. J.

Cp

High. Temp. Sci. 1982,
15 (4), 275-292.

(cer. SiO₂(nc); T)

CaO^+

[Om. 17069]

1983

$\text{D}_0, \Delta_f H^\circ$

Murad E.,

J. Chem. Phys., 1983,
78 (11), 6811-6813.

Cal

1983

Pedley J. B., Marshall

AfM,

J. Phys. Chem. Ref. E.M.,

Do

Data 1983, 12 (4),



967-1031.

D₀
CaO
CaOH

Беляев В.Н., Лебедева Н.И.,
Краснов К.С., Турвин Л.В. 1984

Температура высок. Температур
1984, 22 (5), 1008-1011.

"Вир. разнацион. параметров и энер-
гии диссоциации молекул на основа-
нии спектров поглощения и равновес-
ных реакций в пла- ● мена. Переход
B²Σ - X²Σ CaOH. $Ca(r) + H_2O = CaO(r) + H_2(r)$
 $Ca(r) + H_2O(r) = CaOH(r) + H(r)$

CaO

Дм. 18792 1984

13 Б3015. Энтальпия и теплоемкость CaO в интервале температур 1220—2550 К. Иргашов Х., Тарасов В. Д., Чеховской В. Я. «Теплофиз. высок. температур», 1984, 22, № 1, 59—63

В интервале т-р 1224—2542 К в калориметре смешения измерены энтальпии переплавленных образцов CaO (чистота 99,2—99,4 мас. %). Результаты аппроксимированы уравнением $H_T - H_{298,15} = 48,536C + 1,8809 \cdot 10^{-3}T^2 + 674460/T - 16900,36$ Дж/моль. Общая погрешность 0,32% при 1300 К и 0,75% при 2200 К. Полученное уравнение согласовано с наиболее точными низкотемпературными измерениями C_p и м. б. использовано для интервала 298—2600 К. Обсуждены надежность и источники ошибок имеющихся лит. данных для интервала 1200—2000 К.

А. С. Гузей

$C_p, H_T - H_0$

Х. 1984, 19, № 13

CaO

1984

100: 127691q Enthalpy and heat capacity of calcium oxide at 1220-2550 K. Irgashov, Kh.; Tarasov, V. D.; Chekhovskoi, V. Ya. (Inst. Vys. Temp., Moscow, USSR). *Teplofiz. Vys. Temp.* 1984, 22(1), 59-63 (Russ). Literature data were combined with exptl. values for the interval 1200-2000 K. New exptl. data were obtained at 2000-2600 K. Enthalpy and heat capacity data were fitted to empirical relations and recalcd. at 298-2600 K.

G, HT-Ho

C.A. 1984, 100, N16

CaO

1984

Jog K.N., Singh R.K.,
et al.

фазовый Phys. status solidi,
переход 1984, A85, N2, 417 -
- 421.

(cer. MgO; $\bar{I}$)

CaO

Письмо № 38
от 5/III - 84

1984.

Гюмш (1969) определил $38,10^{30} = 9,106 \text{ г/взв.м.}$
ЖАНАТ (1971) пересчитал $38,21 \pm 0,13 = 9,133 \text{ г/взв.м.}$

CaD(k)

[om. 20145]

1984

of 6

Nakamura T.,
Report of the Research
Laboratory of Engineering
Materials, Tokyo Institute
of ~~the~~ Technology, 1984,
NG, 121-130.

CaO

1985

Bukowinski M.S.T.

Geophys. Res. Lett.,
1985, 12, N 8, 536-539.

уп-ал
соедин.

(соедин. MgO; I)

Сад

1985

Иргашов Х., Тарасов В.Д.
и др.,

НТ - Но, Ср;
до 3100K

Термодинамика в экологии,
I Всесоюзной сессии,
Суздаль, 1985

(у Меркулова В.А.)

CaO(x, u)

1985

JANAF

m. q. III изг., 1985, с 713

нашем 1971

нашем 1973

CaO

[OM-21957]

1985

Смороди Е.Б.

Fog K. N., Singh R. K.,
Sanyal S.P. ~~et al.~~,

Структурн.

произв.

переход,
взвеш.

гравит.

Phys. Rev. B: Condens.
Matter, 1985, 31, N 9,

6047-6057.

CaO

1985

106: 202646h The Ca-O (calcium-oxygen) system. Wriedt, H. A. (Pittsburgh, PA 15218 USA). *Bull. Alloy Phase Diagrams* 1985, 6(4), 337-42, 387-8 (Eng). The Ca-O phase diagram was critically assessed. Crystal structure and lattice parameter data are given for the various phases. Calcd. fugacities of O_2 in equil. with CaO, α Ca, β Ca or liq. Ca are given. Heat capacity, enthalpy and entropy values are tabulated for CaO. The thermophys. properties of CaO_2 were not measured.

C_p , $H_T - H_0$,
 S_0

C.A. 1987, 106, N 24

CaO (к)

1986

19 Б3325 Деп. Исследование растворимости CaO и Ca(OH)_2 в системе $\text{CaO-H}_2\text{O}$. Алексеев А. И., Баранов В. А., Рогачева Н. П., Кулинич О. В.; Ред. «Ж. прикл. химии». Л., 1986. 13 с., ил. Библиогр. 11 назв. Рус. (Рукопись деп. в ВИНТИ 21.05.86, № 3691-В)

Изучена р-римость CaO (I) и Ca(OH)_2 (II) в системе I- H_2O . Использованы I, полученный прокаливанием химически чистого препарата CaCO_3 при 1100°C в течение 1 ч (активность 99%), I реактивный химически чистый; II, полученный путем гашения химически чистого I водой при 95°C в течение 1 ч. Определено значение теплового эффекта р-рения. Рассчитан среднеионный коэф. активности II в зависимости от ионной силы р-ра. Показано, что с учетом рассчитанных среднеионных коэф. активности для определения активной конц-ии II в р-ре необходимо использовать ур-ние Гринберга.

Из автореферата

Дад, Н, Кр;

(4) 

Л. 1986, 19, N 19

Ca(OH)_2 (к)

$\text{CaO}, \text{CaOH}, \text{SrO}, \text{SrOH}, \text{BaO}, \text{BaOH} (2)$ ΔpH 1986
Беляев, Валерий Николаевич.

Определение радиационных и энергетических характеристик молекул оксидов и гидрооксидов щелочноземельных металлов методом спектрофотометрии пламен : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. наук. (02.00.04) / МГУ им. М. В. Ломоносова. — М., 1986. — 17, [1] с. : граф.

Библиогр.: с. 17 — 18 (10 назв.).

№ 20960
А 9 № 986 [86-7263а]
ВКП 15—19.12.86
Изд-во «Книга»

CaO

1986

10 Е390. Экспериментальное исследование энтальпии и теплоемкости оксида кальция до температуры 3100 К. Чеховской В. Я., Иргашов Х., Тарасов В. Д. «Теплофиз. высок. температур», 1986, 24, № 3, 616—617

Представлены результаты измерений энтальпии высокочистой переплавленной окиси кальция (CaO) в интервале т-р 1200—3100 К. С использованием литературных данных получено значение энтальпии в интервале 298,15—3100 К: $H_T - H_{298,15} = 49,315T + 1,518 \cdot 10^{-3}T^2 + 7,3587 \cdot 10^5 \cdot T^{-1} + 1,4351 \cdot 10^8 \cdot \exp(-33300/T) - 17306,2$ (Дж/моль), а теплоемкость $C_p = 49,315 + 3,036 \cdot 10^{-3}T - 7,3587 \cdot 10^5 T^{-2} + 4,779 \cdot 10^{12} T^{-2} \cdot \exp(-33300/T)$ (Дж/моль К).

В. Е. Зиновьев

H-Ho, Cp;

ф. 1986, 18, N 10

CaO

1986

19 Б3016. Экспериментальное исследование энтальпии и теплоемкости оксида кальция до температуры 3100 К. Чеховской В. Я., Иргашов Х., Тарасов В. Д. «Теплофиз. высок. температур», 1986, 24, № 3, 614—617

В калориметре с изотермич. оболочкой методом смешения измерена энтальпия CaO в интервале т-р 1224—3086 К. Результаты аппроксимированы ур-нием $H_{T-298,15} = 49,315T + 1,518 \cdot 10^{-3}T^2 + 7,3587 \cdot 10^5/T + 1,4351 \cdot 10^8 \exp(-33300/T) - 17306,2$ Дж/моль. А. М.

энтальпия

X. 1986, 19, N 19

CaO.

1986

Jog K.N., Sanyal S.P.
et al.

no-scope-
puz-4.

Phys. status solidi
1986, 94, N1, 107-114.

(cell.  MgO; I)

CaO

1986

Казмас Е. К., Саломов
У. О.

4 H₂O,
20;

Ин-т металлургии АА
СССР. М., 1986. 34 с., ил.
Библиогр. 13 назв. Рус. (Рус-
копис деп. в ВНИИТИ 16.
07.862., № 5749-В).
(см. MgO; I)

CaO^+

1986

Lopatin S. I., Semenov
G. A.

(P) Dokl. Akad. Nauk SSSR
1986, 287 (2), 380-1.

($\bullet$ CaO_2^+ ; ~~CaO_2^+~~)

CaO

1986

($H_T - H, C_p$)

105: 67577y Experimental study of the enthalpy and heat capacity of calcium oxide up to a temperature of 3100 K. Chekhovskoi, V. Ya.; Irgashov, Kh.; Tarasov, V. D. (Inst. Vys. Temp., Moscow, USSR). *Teplofiz. Vys. Temp.* 1986, 24(3), 614-17 (Russ). The enthalpies of 16 samples of CaO were measured at 1224-3086 K. Data were correlated and av. values are tabulated for 298.15 and 300-3100 K for both the enthalpy and heat capacity.

C.A. 1986, 105, N8

CaO

1986

Mehl M. J., Hemley R. J.;
et al.

Phys. Rev. B: Condens
Matter, 1986, 33, N 12,
Pt 2, 8685-8696.

(cur. MgO; I)

T_{tz};

Cal

Yamada

1986

T_m ,

(± 17)

$$T_m = 2899 \pm 3^\circ \text{C} \quad (\pm 17^\circ \text{C}?)$$



2899
273
3172

C.A. 1986, 105, N 2.6

105: 232727g Reinvestigation of the solidification point of calcium oxide by digital pyrometry. Yamada, Toyooki; Yoshimura, Masahiro; Somiya, Shigeyuki (Gov. Ind. Res. Inst., Nagoya, Japan). J. Am. Ceram. Soc. 1986, 69(10), C243-C245 (Eng). The solidification point of calca which has been distributed by the Commission on High-Temp. and Solid-State Chem. of the International Union of Pure and Applied Chem. was measured by digital pyrometry by using an arc imaging furnace. The solidification point was detd. to be 2899° with $\pm 3^\circ$ as the std. deviation for this sample. The reliability of this solidification point was detd. to be within $\pm 17^\circ$ based upon discussions of the measuring system and the material.

CaO(k) (Dm. 27369) 1987

Klein J., Müller F.,

H_T-H₂98 High Temp. - High Pressures,
1987, 19, N 2, 201-209.

Термохимия CaO(k) +  B₂O₃(x) при 1725-1775[!]K.

CaO

1987

Farber M., Srivastava
R. D., et al.

$\Delta H, 4H_f$; J. Chem. Soc. Fara-
day Trans., 1987,
Pt 1, 83, N 11, 3229-3236.
(see CaOH(2); I)

CaO

1988

/111: 201936u MNDO parameters for calcium. Bliznyuk, A. A.; Voityuk, A. A. (Inst. Bioorg. Khim., Novosibirsk, USSR). *Zh. Strukt. Khim.* 1988, 29(5), 156-7 (Russ). The MNDO parameters for Ca were taled. using a method proposed earlier by the authors (1937) and the structures, the heats of formation and the ionization potentials of CaO , CaH , CaF , CaCl , and CaOH were calcd.. The calen. reproduces well the Ca-O , Ca-F , and CaCl distances and gives lower distances than expt. for Ca-H , Ca-Br and Ca-I . The av. error in the heats of formation is 8.7 kcal/mol.

$\gamma, \Delta_f H;$

□

(44)

C.A. 1989, 111, N 22

CaO

1988

Pak V.M., Serov G.V.,
et al.

пересог. Rasplavy 1988, 2 (5),
21-8.
св-ка

● (св. FeO; I)

CaO

1988

17 БЗ168. Фазовый переход при термоллизе оксида кальция. Паус К. Ф., Ключникова Н. В. «Высокотемператур. химия силикатов и оксидов. Тез. докл. 6 Всес. совещ., Ленинград, 19—21 апр., 1988». Л., 1988, 445—446

Методами ДТА, ДТГ и ЭПР-спектроскопии установлено существование двух модификаций CaO, имеющих одинаковый хим. состав. Первая (известная) модификация получается при прокаливании $\text{Ca}(\text{OH})_2$ при 833—873 К, при т-ре выше 1173 К происходит переход ко второй (ранее неизвестной) модификации CaO, что сопровождается глубоким эндотермич. эффектом на кривой ДТА с минимумом при 1593 К. Необычная хим. активность термолитического CaO, проявляющаяся в р-циях с ароматич. соединениями, объяснена необычной электронной структурой с 2-мя неспаренными электронами с одинаковыми спинами, находящимися в метастабильном триплетном состоянии. По резюме

фазов. перех.

✓ 1988. 19. №17

CaO

От. 42020 1988
Чеховской В.Я., Иргашов Х.
и др.,

Н-Но,

Тм, АНм

Температура и жидкие
окислы целочисленных ме-
таллов в твердом и жидком
состоянии, жидкие,
жидкие и металлы-растворы
жидкие.
XII Всесоюзная конференция
6-8

по химической термодинамике
и калориметрии.

Мезвуховский сборник.

Торский, стр. 6-8, 1988г.

1988

CaO

/ 110: 102168t Static compression and equation of state of calcium oxide to 1.35 Mbar. Richet, Pascal; Mao, Ho Kwang; Bell, Peter M. (Geophys. Lab., Carnegie Inst., Washington, DC 20008 USA). *J. Geophys. Res., Solid Earth Planets* 1988, 93(B12), 15279-88 (Eng). The room temp. static compression of CaO has been measured in a diamond anvil cell to 1.35 Mbar. The compression of the B1 phase and the vol. change at the B1 to B2 transition agree with previous diamond cell results. The B2 phase has been obsd. down to 527 kbar and seems slightly more compressible at room temp. than deduced from shock wave expts. Eulerian as well as semiempirical equations of state account well for the data and yield similar to bulk moduli for both phases as a function of pressure. Equation-of-state parameters are $K_0 = 1.11 \pm 0.01$ and 1.3 ± 0.2 Mbar and $K_0' = 4.2 \pm 0.2$ and 3.5 ± 0.5 for the B1 and B2 phases, resp., and $V_0 = 14.8 \pm 0.2$ cm³/mol for the B2 phase. For a pressure of 550 kbar, at which no data extrapolations are required, one finds $K = 3.04$ and 2.96 Mbar with K' values of about 3.0 and 2.5 for the B1 and B2 phases, resp. Recent theor. structure calcs. predict room temp. compressions in fair agreement with the static results.

yp - ue
COCMOLEHLL

C.A. 1989, 110, N/2

CaD

1988
Wolf G.H., Biekowin-
ski M.J.T.,

уп-ие
состоян.,
Do
Phys. Chem. Mines.
1988, 15(3), 209-20.
Variational stabilization

C.A. 1988, 108, N20, 173945p

of the ionic charge densities
in the electron-gas theory of
crystals: Applications to
magnesium oxide and calci-
um oxide.

CaO

1989

111: 181929p Thermodynamic calculation of the calcium oxide-magnesium oxide system. Hillert; Mats; Wang, Xizhen (Div. Phys. Metall., R. Inst. Technol., S-100 44 Stockholm, Swed.). CALPHAD: Comput. Coupling Phase Diagrams Thermochem. 1989, 13(3); 267-71. (Eng). The CaO-MgO phase diagram was assessed by using a two-sublattice model for the ionic liq. solns. and a regular-soln. model for the solid soln. phase. A set of parameters describing the Gibbs energy of the various phases in the system was obtained by a computer-operated optimization procedure called PARROT. The calcd. phase diagram is in good agreement with the exptl. data.

Δf ;

⑦ $\boxtimes$ MgO

C.A. 1989, 111, N20

Система Кластеры Ca_nO_x и Ba_nO_x

1989

Ca-O

111: 47594x Mass spectra of calcium-oxygen and barium-oxygen clusters. Martin, T. P.; Bergmann, T. (Max-Planck-Inst. Festkoerperforsch., 7000 Stuttgart, 80 Fed. Rep. Ger.). *J. Chem. Phys.* 1989, 90(11), 6664-7 (Eng). Mass spectra of metal-rich, singly and doubly ionized Ba_nO_x clusters are characterized by high peak intensities for $n = 13, 19, 23, 26, 29, 32$, and 35 independent of $x = 1-4$. These values are identical to the magic nos. found for Ar clusters. The mass spectra of Ca_nO show a similar behavior. Mass spectra of stoichiometric, $\text{Ca}(\text{CaO})_n^+$ clusters are characterized by low peak intensities for $n = 14, 24, 32, 38, 40, 50$, and 64. These values correspond to unstable clusters formed by the addn. of 1 Ca atom or 1 CaO mol. to a closed rectangular block of atoms with rock salt structure.

массспектр-
анализ

Система
(4) Ba-O



с.А.1989, III, № 6

CaO

1989

Vedishcheva N. M.,
Shakhmatkin B. A.

Glass' 89: 15 Int. Congr.

Δ H_{aq}, Glass, Leningrad, 1989:

Δ H_f; Proc. Vol. 16. L., 1989. C. 187-
-190.

(cor. ● MgO; I)

CaO

(Om 32144)

1989

111: 103410y Reevaluation of standard free energy of formation of calcium oxide. Wakasugi, T.; Sano, N. (Dep. Metall., Univ. Tokyo, Tokyo, Japan). *Metall. Trans. B* 1989, 20B(3), 431-3 (Eng). Exptl. and calcd. values for the std. free energy of formation of CaO are discussed and evaluated and a value of $-628,000 \pm 1137$ (J/mol) is suggested, with T in $^{\circ}\text{K}$.

($\Delta_f H$)

C.A. 1989, 111, N12

CaO Отт. 42020, ОМ 39484 1990

5 Е364. Термодинамические свойства оксидов щелочно-земельных металлов / Чеховской В. Я., Иргашов Х. // Ж. физ. химии.— 1990.— 64, № 1.— С. 2—16.

Проведен анализ имеющихся эксперим. данных об энтальпии и теплоемкости CaO, SrO, BaO и RaO выше 300 К. Приведены новые результаты эксперим. исследования: энтальпии и теплоемкости в твердом и жидком состояниях BaO до 2500 К, SrO до 3000 К, CaO до 3100 К, а также т-р плавления, теплот и энтропий плавления, теплоемкостей расплавов и энергий образования пары анионных и катионных вакансий. Для RaO сделаны оценки т-ры, теплоты и энтропии плавления, теплоемкости расплава, т-ры Дебая и энергии образования пары анионных и катионных вакансий, а для CaO — теплоты и энтропии плавления и теплоемкости расплава. На основании высокотемпературных данных об энтальпии и низкотемпературных литературных данных о теплоемкости рассчитаны таблицы термодинамич. ф-ций в диапазоне 0—2500 К для BaO, 0—3100 К для SrO и 0—3128 К для CaO.

Резюме

(43)

X

C_p , $H-H_0$,
 T_m , ΔH_m

ф. 1990, №5.

САО

Омн. 42020, 39484

1990

Ческовой В. Я.
Израилов, Х.

Обз. по теплоэнерг.
Свойствам. веществ.
Москва, 1990. 43 с.

термод.
св-ва

1-52.

(Сек. ВАО; Т)

CaO Отм. 42020 DM 39 484 1990

11 Б3011. Термодинамические свойства оксидов щелочно-земельных металлов / Чеховской В. Я., Иргашов Х. // Ж. физ. химии.— 1990.— 64, № 1.— С. 2—16.— Рус.

Проведен анализ лит. эксперим. данных об энтальпии и теплоемкости CaO, SrO, BaO и RaO выше 300 К. Приведены новые результаты эксперим. исследования энтальпии и теплоемкости в тв. и жидк. состояниях BaO до 2500 К, SrO до 3000 К, CaO до 3100 К, а также т. пл., теплот и энтропий плавления, теплоемкостей расплавов и энергии образования пары анионных и катионных вакансий. Для RaO оценены т-ры, теплоты и энтропии плавления, теплоемкости расплава, т-ры Дебая и энергии образования пары анионных и катионных вакансий, а для CaO — теплоты и энтропии плавления и теплоемкости расплава. На основании высокот-рных данных об энтальпии и низкот-рных лит. данных о теплоемкости рассчитаны таблицы термодинамич. ф-ций в диапазоне 0—2500 К для BaO, 0—3100 К для SrO и 0—3128 К для CaO. Библ. 49.

Резюме

М-Н₀, Cp,
Tm, ΔHm

(73)
IX

X. 1990, N 11

CalD(K)

[Om 33 443]

1990

Хартаев В.Ф.,

Д.Ф.Н;
Зл. фру. химии, 1990,
64, N 2, 566-568

CaO

1990

113: 30218w Heat of solution of samples of solid calcium oxide in the solvent liquid sodium metaphosphate. Julsrud, Stein (Inst. Inorg. Chem., Norweg. Inst. Technol., Norway). *Scand. J. Metall.* 1990, 19(2), 71 (Eng). The heat of soln. of various samples of CaO(s) in $\text{NaPO}_3(\text{liq.})$ was measured at 700° . Samples com. obtained and made by decompn. of CaCO_3 showed considerably different results from samples made by oxidn. of Ca metal.

ΔH ;

C.A. 1990, 113, N 4

CaO

Воронова

1990

6 И219. Молекулярно-динамическое моделирование
термодинамических свойств и структуры оксида каль-
ция / Воронова Л. И., Брухтояров О. И., Вяткин Г. В.
// Физ.-хим. исслед. металлург. процессов.— 1990.—
№ 18.— С. 73—76

термод.
св-ва

ф. 1992, № 6

Оксид Ca мелкодисперсный

1991

1 23 Б3118. Влияние фазового перехода в мелкодисперсном оксиде кальция на его возбуждение атомарным водородом / Беломестных В. Н., Измаилов Ш. Л., Лисецкая Т. А., Лисецкий В. Н., Харламов В. Ф. // Хим. физ.— 1991.— 10, № 7.— С. 1011—1016.— Рус.

Показано, что при изменении T -ры в кристалликах мелкодисперсного оксида кальция при 434 ± 5 К происходит фазовый переход, что приводит к скачкообразному изменению скорости и затуханию ультразвука, а также к изменению интенсивности поперхн. хемилюминесценции, интенсивности хеомэмиссии электронов и динамич. эффекта, возбуждаемых атомами водорода.

T_{t2}

Х. 1991, № 23

CaO

1991

115: 121331k Reevaluation of the thermodynamic stability of calcium oxide. Chrysanthou, A.; Grievson, P. (Imp. Coll. Sci. Technol., London, UK). *Scand. J. Metall.* 1991, 20(2), 165-7 (Eng). The reaction $\text{CaO} + 3\text{C} = \text{CaC}_2 + \text{CO}$ was studied under controlled atmospheres between 1580 and 1700°C. Reaction was obsd. to take place at CO pressures higher than those predicted by the available thermodyn. data. By reviewing and combining results of previous studies with those of the present one, a more accurate free energy of formation of CaO ($-179190 \pm 43.62\text{T}$) is proposed.

(Kp, 164)

C.A. 1991, 115, n12

Cal

1992

Howard R. A.,

CALPHAD: Comput. Coupling
Phase Diagrams Thermochem.
1992, 16 (1), 25-32

(smH)

(all. MgO; I)

CaO

1993

122 39511p Revision of the enthalpies and Gibbs energies of formation of calcium oxide and magnesium oxide. Gourishankar, K. V.; Ranjbar, M. Karaminezhad; St. Pierre, G. R. (Dep. Mater. Sci., Ohio State Univ., Columbus, OH 43210 USA). *J. Phase Equilib.* 1993, 14(5), 601-11 (Eng). A major revision is presented of the values for the heats and free energies of formation of CaO and MgO. The kinetics of evapn. was studied in free-evapn. expts. at 1830-2070 K and the conditions of local equil. were established. The significantly different new values result in a reversal of relative thermodyn. stabilities of CaO and MgO, with the latter now being as the more stable oxide at lower temps. on Ellingham diagrams.

($\Delta_f H$, $\Delta_f G$)

1830-2070K



C.A. 1994, 120, N4

CaO

1993

118: 155519e The melting properties of the earth alkaline oxides; thermodynamic analysis of the magnesia-calcia binary system $(1-x)\text{MgO} + x\text{CaO}$. Van der Kemp, Wybe J. M.; Van der Linde, Peter R.; Blok, Jacobus G.; Oonk, Harry A. J. (Dep. Interfaces Thermodyn., Utrecht Univ., 3584 CH Utrecht, Neth.). CALPHAD: Comput. Coupling Phase Diagrams Thermochem. 1993, 17(1), 57-65 (Eng). A crit. selection of the melting properties of the alk. earth oxides available in literature was made. For Mg oxide and Ca oxide this lead to melting temps. of 3105 and 3172 K and entropies of fusion of 35.4 and 37.0 J/mol.K, resp. By using this result and a selection of available phase diagram data, a thermodyn. anal. was made of the binary system $(1-x)\text{MgO} + x\text{CaO}$. For the solid state this gave rise to: $H^{\text{E(sol)}}(x)/\text{kJ/mol} = x(1-x)[90.50 + 7.00(1-2x)]$, $S^{\text{E(sol)}}(x)/\text{J/K.mol} = x(1-x)[13.62 - 2.09(1-2x)]$ and for the liq. state: $G^{\text{E(liq)}}(x)/\text{kJ/mol} = x(1-x)[-21.4 + 23.4(1-2x)]$.

(Tm)

④ MgO

C.A. 1993, 118, N16

1994

CaO
MgO
CaZrO₃
SrZrO₃
BaZrO₃

121: 93070c Thermodynamic properties and vaporization phenomena of oxide systems including CaO, MgO, CaZrO₃, SrZrO₃, and BaZrO₃. Gourishankar, Karthick V. (Ohio State Univ., Columbus, OH USA). 1993. 274 pp. (Eng). Avail. Univ. Microfilms Int., Order No. DA9411951. From *Diss. Abstr. Int. B* 1994, 54(11), 5883-4.

Размкнутка 5 в-в
(Кр, Терм. св-ва)

(+4)

Δ

C. A. 1994, 121, N 8.

CaO (K)

1995

123: 154018g · Thermodynamics of dissociation and sublimation of calcium oxide. Samoilova, I. O.; Kazenas, E. K. (Moscow, Russia). *Metally* 1995, (1), 33-5 (Russ). Thermodyn. of dissocn. and sublimation of calcium oxide was studied in the temp. range 1923-2227 K by high-temp. mass-spectrometry. In vapor phase over calcium oxide mols. of Ca(g), O₂(g), O(g) and CaO(g) were found. Partial pressures of the vapor phase components were detd. The heat of sublimation $\Delta H_{s,0}^{\circ}(\text{CaO})$ calcd. using the third law of thermodyn. was 159.44 ± 2.0 kcal/mol. The dissocn. energy $D_0^{\circ}(\text{CaO})$ was 91.92 ± 1.2 kcal/mol. Compn. of the vapor phase over calcium oxide at 2000 K was(%): CaO 0.48, Ca 60.02, O₂ 9.50, O 30.0.

$D_3 H_0^{\circ}$
 D_0°

C.A. 1995, 123, N 12

F: CaO

P: 3

10Б2219. Факторы, влияющие на сходимость в методе ЛМТО при расчете электронной структуры сложных кристаллов / Касьянов С. Л., Тапилин В. М., Белослудов В. Р. // Ж. структур. химии. - 1997. - 38, 4. - С. 616-624. - Рус.

Рассматриваются факторы, влияющие на сходимость метода линейных muffintin(МТ)-орбиталей в приближении атомных сфер (ЛМТО-ПАС) для случая многоатомных соединений. Приводятся рекомендации по выбору радиусов МТ-сфер,

начальных энергий - центров тяжести заполненных зон и начального распределения атомной плотности заряда. а примерах расчета соединений MgO и $NaCl$ предлагается возможность выделить правильный и отбросить ложный самосогласованный результат. Описанные подходы были опробованы и дали хорошие результаты для соединений $ScPd$, $ScRh$, LiH , WC , $TlBr$, CaO , MgO , KBr , $CuPd$, $NaCl$, LiF , CaS , ZnO , $Cu[2]O$, $TiO[2]$, $YBa[2]Cu[3]O[7]$, $Tl[2]CaBa[2]Cu[2]O[8]$.

Рассматриваются факторы, влияющие на сходимость метода линейных muffintin(MT)-орбиталей в приближении атомных сфер (ЛМТО-ПАС) для случая многоатомных соединений. Приводятся рекомендации по выбору радиусов MT-сфер, начальных энергий - центров тяжести заполненных зон и начального распределения атомной плотности заряда. а примерах расчета соединений MgO и $NaCl$ предлагается возможность выделить правильный и отбросить ложный самосогласованный результат. Описанные подходы были опробованы и дали хорошие результаты для соединений $ScPd$, $ScRh$, LiH , WC , $TlBr$, CaO , MgO , KBr , $CuPd$, $NaCl$, LiF , CaS , ZnO , $Cu[2]O$, $TiO[2]$, $YBa[2]Cu[3]O[7]$, $Tl[2]CaBa[2]Cu[2]O[8]$.

1994

F: CaO

P: 1

11B345. Система $\text{SrO}-\text{CaO}-\text{Bi}_2\text{O}_3$ в области $<\text{Bi}_2\text{O}_3>33,3$ мол.% / Слободин Б. В., Васильев В. Г., Солдатова Е. Е. // Ж. неорган. химии. 1997. - 42, 10. - С. 1740-1743. - Рус.

Изучен равновесный (830-850{°}С, воздух) фазовый состав системы $\text{SrO}-\text{CaO}-\text{Bi}_2\text{O}_3$ в области $\text{CaO}-\text{Ca}_2\text{Bi}_2\text{O}_5-\text{Sr}_9\text{Bi}_{11}\text{O}_{25,5}-\text{SrO}$. Показано

образование двух твердых растворов $\text{Sr}[3,5-x]\text{Ca}[0,5+x]\text{Bi}[2]\text{O}[7]$, $0' \leq x \leq 1,1$, и $\text{Sr}[3-x]\text{Ca}[x]\text{Bi}[2]\text{O}[6]$, $0' \leq x \leq 1,7$, которые по соотношению компонентов, перовскитоподобной структуре и температуре образования следует рассматривать как близкие предшественники Bi-содержащих сверхпроводников. Построена изотермическая диаграмма фазовых соотношений, состоящая из пятнадцати диаграмм вторичных тройных систем.

F: CaO

P: 1

Schulz

ON 40/26

1999

131:219750 Heats of Formation of Alkali and Alkaline
Earth Oxides and Hydroxides: Some Dramatic Failures of
the G2 Method. Schulz, Axel; Smith, J.; Radom, Leo

Research School of Chemistry, Australian
National University Canberra 0200, Australia

J. Phys. Chem. A, 103(37), 7522-7527

(English) 1999 High-level ab initio calcns.

with a variety of G2-based methods have been used to
determine the structures and heats of formation of the
alkali and alk. oxides and hydroxides (M_2O , MOH
with $M = Li, Na, \text{ and } K$; $M'O$, $M'(OH)_2$ with $Be, Mg,$
and Ca). Std. G2 theory, which is normally very
reliable for the prediction of mol. thermochem., is
shown to be quite unsuitable for the prediction of
the heats of formation of several of these highly

polar spe with errors greater than 100 kJ mol⁻¹ in some cases. Our calcns. confirm for systems contg. the third-row atoms K and Ca, it is essential to inclu 3s and 3p orbitals in the correlation space.

Interestingly, an analogous relaxed-inner-valence (denoted riv) procedure is more beneficial for the Be-contg. oxides and hydroxides than for the Na- and Mg-contg. mols. Inc of all orbitals in the correlation space (denoted full) generally provide a slight further improvement to the results. Removal of the additivity a of std. G2 theory through direct large basis set QCISD(T) calcns. [e.g., G2(dir,full)] has a large effect for the oxides CaO and K₂O. The QCISD(T) component of the G2 energy is poorly described for CaO, Na₂O, and K₂O, bu can be rectified through replacement of QCISD(T) with CCSD(T) [e.g., G2[CC](dir,full)]. For five mols. (CaO, Be(OH)₂, Mg(OH)₂, Ca(OH)₂, and K where significant discrepancies (10-30 kJ mol⁻¹) remain between the best heats of formation (i.e., G2[CC](dir,full)) and exptl. values, we suggest exptl. reexamn. is desirable. Structures detd. at the MP2/6-311+G(3df,2p) are in good agreement with available exptl. data. Structures obtained at std. MP2/6-31G(d) level of G2 theory are not as good, but the impact of u the simpler geometries on calcd. heats of formation is generally relative small.

F: CaO

P: 1

Schulz

DM 40126

1999

131:219750 Heats of Formation of Alkali and Alkaline Earth Oxides and Hydroxides: Some Dramatic Failures of the G2 Method. Schulz, Axel; Smith, J.; Radom, Leo (Research School of Chemistry, Australian National University Canberra 0200, Australia). J. Phys. Chem. A, 103(37), 7522-7527 (English) High-level ab initio calcns. with a variety of G2-based methods have been used to determine the structures and heats of formation of the alkali and alk. oxides and hydroxides (M_2O , MOH with $M = Li, Na, \text{ and } K$; $M'O$, $M'(OH)_2$ with $Be, Mg, \text{ and } Ca$). Std. G2 theory, which is normally very reliable for the prediction of mol. thermochem., is shown to be quite unsuitable for the prediction of the heats of formation of several of these highly polar species with errors, greater than 100 kJ mol^{-1} in some cases.

Our calcns. confirm for systems contg. the third-row atoms K and Ca, it is essential to inclu 3s and 3p orbitals in the correlation space. Interestingly, an analogous relaxed-inner-valence (denoted riv) procedure is more beneficial for the Be-contg. oxides and hydroxides than for the Na- and Mg-contg. mols. Inc of all orbitals in the correlation space (denoted full) generally provide a slight further improvement to the results. Removal of the additivity a of std. G2 theory through direct large basis set QCISD(T) calcns. [e.g., G2(dir,full)] has a large effect for the oxides CaO and K₂O. The QCISD(T) component of the G2 energy is poorly described for CaO, Na₂O, and K₂O, bu can be rectified through replacement of QCISD(T) with CCSD(T) [e.g., G2[CC](dir,full)]. For five mols. (CaO, Be(OH)₂, Mg(OH)₂, Ca(OH)₂, and K where significant discrepancies (10-30 kJ mol⁻¹) remain between the best heats of formation (i.e., G2[CC](dir,full)) and exptl. values, we suggest exptl. reexamn. is desirable. Structures detd. at the MP2/6-311+G(3df,2p) are in good agreement with available exptl. data. Structures obtained at std. MP2/6-31G(d) level of G2 theory are not as good, but the impact of u the simpler geometries on calcd. heats of formation is generally relative small.

Xu

1999

F: CaO

P: 1

131:302407 Relative stabilities of CaO and MgO. Xu,
Xiaoping; Schlesinger, Mark E. Department of
Metallurgical Engineering, University of Missouri-Rolla
Rolla, MO 65409-0340, USA High Temp. Mater.
Sci., Volume Date 1997, 38(2/3), 65-70 (English) 1999

Recent investigations have suggested that the
long-held belief that Ca oxide has a more neg. Gibbs
energy of formation than Mg oxide at lower temps. is
inaccurate. If these claims are valid, elemental Mg

should be effective reducing agent for CaO . To test this hypothesis, mixts. of elemental Mg and CaO and of elemental Ca and MgO were sealed under vacuum in molybdenum crucibles and equilibrated at 1398-1473 K for extended periods of time. Although anal. results suggest that true equil. was not established in these expts., the data do suggest that the needed correcti of the "traditional" thermodyn. data for CaO and MgO is not as great as claimed.

F: CaO MgO
P: 1

Xu

1999

131:302407 Relative stabilities of CaO and MgO. Xu,
Xiaoping; Schlesinger, Mark E. Department of
Metallurgical Engineering, University of Missouri-Rolla
Rolla, MO 65409-0340, USA High Temp. Mater.
Sci., Volume Date 1997, 38(2/3), 65-70 (English) 1999

Recent investigations have suggested that the long-held belief that Ca oxide has a more neg. Gibbs energy of formation than Mg oxide at lower temps. is inaccurate. If these claims are valid, elemental Mg should be an effective reducing agent for CaO. To test this hypothesis, mixts. of elemental Mg and CaO and of elemental Ca and MgO were sealed under vacuum in molybdenum crucibles and equilibrated at 1398-1473 K for extended periods of time. Although anal. results suggest that true equil. was not established in these expts., the data do suggest that the needed correction of the "traditional" thermodyn. data for CaO and MgO is not as great as claimed.

2000

F: CaO

P: 1

131:192022 Schottky defect enthalpies of
alkaline earth oxides. Sahariah, Munima B.;
Banhatti, Radha D.; Bharali, Usha; Kadolkar, C.;
Murti, Y. V. (Department of Physics, Indian
Institute of Technology, Guwahati 781 001, India).
Indian J. Pure Appl. Phys., 37(4), 306-312
(English) The Schottky defect formation
process in MgO, CaO, SrO, and BaO is investigated
using our recently introduced EPPI model. We find
that incl of quadrupolar interactions makes a

substantial contribution to the forma energy by values ranging from 1.2 eV to 2.9 eV. The EPPI values of the enthalpies (hsf) are 5.9, 5.8, 4.7 and 1.4 eV resp. for MgO, CaO, SrO, an The results of cation self diffusion expts. in MgO are reanalyzed to incl effects of impurity-vacancy assocn. reaction. The anal. suggests the pre interpretation of the exptl. data to be an oversimplification. Since the binding energy of an impurity-defect complex in MgO could be quite large, effects of the assocn. reaction on the defect densities are appreciable. basis of near complete assocn. of the dominant tetravalent cation impurit in MgO is found to be 5.8 eV which is in good agreement with the theor. v the present work.

2000

F: CaO

P: 1

133:340497 The valence band structures of BeO, MgO,
and CaO. Sashin, Vladimir A.; Dorsett, Helen E.;

Bolorizadeh, Mohammad A.; Ford, Michael J. School of
Chemistry, Physics and Earth Science, Flinders
University of South Australia Adelaide, SA 5001,
Australia J. Chem. Phys., 113(18), 8175-8182

(English) 2000 We have performed direct
measurements of the valence band structures of the light
alk. earth oxides BeO, MgO, and CaO using electron
momentum spectroscopy (EMS). From these measurements,

we have detd. the band dispersions, valence bandwidths, and O(2s)-O(2p) intervalence bandgaps at the .GAMMA. point. For comparison we have also performed Hartree-Fock (HF) and d.-functional (DFT) calcns. in the LCAO (LCAO) approxn. Intervalence bandgaps compare reasonably well with the DFT calcns. and previous exptl. and theor. studies. Our measured bandwidths, however, are significantly smaller. In particular, we find that contrary to conventional wisdom, the local d. approxn. of DFT overestimates the valence bandwidths of these ionic solids.

CalO

(DM. 41741)

2003

Michael B. Sullivan
et al.,

45H298.15

J. Phys. Chem., 2003,
A107, 5617-30